

راهنمای نگهداری · خزندگان · نسخه ۱

لاک‌پشت گوش‌قرمز

Trachemys scripta elegans — Red-eared slider

رایج‌ترین لاک‌پشت خانگی ایران؛ حیوانی که به‌صورت جوجه‌ی کف‌دستی و ارزان فروخته می‌شود، اما در عمل یک خزنده‌ی آبزیِ بزرگ، پرمصرف و بسیار پرعمر است. این راهنما کمک می‌کند از همان روز اول محیط درست را بسازید و نشانه‌های خطر را زود ببینید.

دکتر مهدیار رمزگویان — دامپزشک حیوانات اگزوتیک

Photo: “Red eared slider turtle basking at Taudaha Lake” — Shadow Ayush, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

۱ کارت اطلاعات سریع

نام فارسی / علمی	لاک‌پشت گوش‌قرمز (اسلایدر گوش‌قرمز) — *Trachemys scripta elegans*
خاستگاه	آب‌های آرام و گرم جنوب‌شرقی آمریکا (حوضه‌ی می‌سی‌سی‌پی)؛ امروزه در بسیاری از کشورها به‌عنوان گونه‌ی مهاجم در طبیعت رها شده است.
طول عمر	معمولاً ۲۰ تا ۳۰ سال با نگهداری درست؛ گزارش‌های بیش از ۴۰ سال هم وجود دارد.
اندازه‌ی بالغ (طول لاک)	ماده: حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر · نر: حدود ۱۵ تا ۲۲ سانتی‌متر. جوجه‌ی تازه‌خارج‌شده حدود ۲٫۵ تا ۳ سانتی‌متر است.
سطح دشواری	متوسط — نگهداری ساده به نظر می‌رسد، اما فیلتراسیون، فضا و نور درست هزینه و پیگیری می‌خواهد.
رژیم	همه‌چیزخوار؛ جوان‌ها گوشت‌خوارترند و بالغ‌ها به سمت گیاه‌خواری می‌روند.
دمای آب	حدود ۲۴ تا ۲۷ درجه‌ی سانتی‌گراد (با بخاری ترموستات‌دار و محافظ)
نقطه‌ی آفتاب‌گیری (basking)	سطح سکو حدود ۳۰ تا ۳۴ درجه؛ هوای محیط حدود ۲۴ تا ۲۹ درجه
نور	UVB ضروری (معمولاً لامپ خطی T5 با شدت ۱۰–۱۲٪ بالای سکو) + لامپ گرمایی؛ ۱۲ تا ۱۴ ساعت روشنایی در روز
رطوبت	به‌دلیل آبزی‌بودن، دغدغه‌ی جداگانه‌ای نیست؛ مهم خشک‌شدن کامل حیوان روی سکوست.
اجتماعی / تنها	تنها زندگی می‌کند و به هم‌نشین نیاز ندارد. نگهداری گروهی فقط در فضای بسیار بزرگ و با پایش درگیری ممکن است.

۲ مناسب چه کسی است؟ آیا انتخاب درستی است؟

بزرگ‌ترین سوءتفاهم درباره‌ی گوش‌قرمز این است که «کوچک می‌ماند» و در یک ظرف پلاستیکی با درخت پلاستیکی زندگی می‌کند. واقعیت این است که جوجه‌ی ۳ سانتی‌متری ظرف چند سال به لاک‌پشتی به اندازه‌ی یک بشقاب تبدیل می‌شود و تا دهه‌ها به آکواریوم بزرگ، فیلتر قوی و نور UVB نیاز دارد. اگر حیوان کوچک مانده، معمولاً نشانه‌ی بیماری و سوءتغذیه است، نه «نژاد کوچک».

انتخاب خوبی است اگر...

- برای ۲۰ تا ۳۰ سال آینده برنامه دارید (جابه‌جایی، سفر، ازدواج، مهاجرت).
- جا و بودجه‌ی یک آکواریوم بزرگ (برای ماده‌ی بالغ چند صد لیتر) را دارید.
- از دیدن و مراقبت لذت می‌برید، نه نوازش و بغل‌کردن.
- حاضرید هر هفته وقت برای تعویض آب و تمیزکاری بگذارید.

بهتر است صبر کنید اگر...

- حیوانی برای کودک خردسال می‌خواهید (خطر سالمونلا و نیاز به مراقبت بزرگسال).
- فقط فضای یک ظرف کوچک یا تُنگ دارید.
- در خانه فرد باردار، سالمند یا دارای نقص ایمنی زندگی می‌کند و رعایت بهداشت دشوار است.
- دنبال حیوانی کم‌هزینه و «بی‌دردسر» هستید.

هرگز در طبیعت رها نکنید

گوش‌قرمز در فهرست گونه‌های مهاجم بسیاری از کشورها قرار دارد و رهاشدن آن در حوض‌ها، پارک‌ها و رودخانه‌ها به لاک‌پشت‌های بومی و زیست‌بوم آسیب می‌زند؛ خود حیوان رهاشده هم اغلب در زمستان یا بر اثر بیماری تلف می‌شود. اگر دیگر نمی‌توانید نگهداری کنید، از طریق دامپزشک، باشگاه‌های نگهداری خزندگان یا مراکز پذیرش، سرپرست مسئول پیدا کنید.

۳ محل نگهداری و تجهیزات

اندازه‌ی آکواریوم

یک قاعده‌ی سرانگشتی رایج: **حدود ۴۰ لیتر آب به‌ازای هر ۲٫۵ سانتی‌متر طول لاک**. چرا این‌قدر؟ لاک‌پشت آبزی پرخور است و فضولات زیادی تولید می‌کند؛ حجم آب بیشتر آلودگی را رقیق‌تر می‌کند و نوسان دما کمتر می‌شود. عمق آب دست‌کم حدود ۱٫۵ تا ۲ برابر طول لاک باشد تا اگر حیوان به پشت برگشت، بتواند خودش را برگرداند.

مرحله	طول تقریبی لاک	حداقل حجم آب پیشنهادی
جوجه	۳ تا ۵ سانتی‌متر	حدود ۷۵ تا ۱۰۰ لیتر (از همین ابتدا بزرگ‌تر بهتر است)
نوجوان	۸ تا ۱۲ سانتی‌متر	حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر
نر بالغ	۱۵ تا ۲۲ سانتی‌متر	حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ لیتر
ماده‌ی بالغ	۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر	۳۰۰ تا ۴۵۰ لیتر یا بیشتر؛ تانک بزرگ کف‌پهن یا حوضچه‌ی ایمن

اعداد تقریبی‌اند و بسته به منبع کمی فرق می‌کنند؛ اصل مهم «هرچه آب بیشتر، بهتر» است.

سکوی آفتاب‌گیری (basking)

گوش‌قرمز باید بتواند **کاملاً** از آب بیرون بیاید و لاک و پوستش خشک شود. خشک‌شدن روزانه از رشد قارچ و باکتری روی لاک جلوگیری می‌کند و گرم‌شدن زیر لامپ برای هضم غذا و عملکرد ایمنی لازم است. سکو باید پایدار، با سطح شیب‌دار برای بالا رفتن آسان و به‌اندازه‌ی کافی بزرگ باشد. فاصله‌ی سکو تا لبه‌ی آکواریوم را طوری تنظیم کنید که حیوان نتواند از آن فرار کند.

نور و گرما

- **UVB:** بدون آن، ویتامین D3 ساخته نمی‌شود و کلسیم جذب نمی‌شود؛ نتیجه نرمی و تغییر شکل لاک است. لامپ را مستقیم (بدون شیشه یا پلاستیک بین لامپ و حیوان) بالای سکو نصب کنید و طبق توصیه‌ی سازنده

تعویض کنید، چون تابش UVB مدت‌ها پیش از خاموش‌شدن لامپ افت می‌کند.

- **لامپ گرمایی:** برای ایجاد نقطه‌ی گرم ۳۰ تا ۳۴ درجه روی سکو. دما را با دماسنج دیجیتال روی سطح سکو بسنجید، نه با حدس.
- **بخاری آب:** ترموستات‌دار، با محافظ پلاستیکی؛ لاک‌پشت‌ها بخاری بی‌محافظ را می‌شکنند یا رویش می‌سوزند.
- **شب:** همه‌ی چراغ‌ها خاموش؛ افت جزئی دمای هوا طبیعی است، اما آب نباید سرد شود.
- تایمر برای چرخه‌ی ثابت ۱۲ تا ۱۴ ساعت روشنایی بسیار کمک می‌کند.

فیلتر و کیفیت آب

فیلتر را برای حجمی **دو تا سه برابر** حجم واقعی آب انتخاب کنید (فیلترهای سطلی/کنیستر معمولاً بهترین گزینه‌اند)، چون بار آلودگی لاک‌پشت از ماهی‌هایی با همان حجم بسیار بیشتر است. آب لوله‌کشی را پیش از استفاده با کلرزدای مخصوص آکواریوم آماده کنید. بوی بد، کف، کدری یا لایه‌ی لزج یعنی فیلتراسیون یا تعویض آب کافی نیست.

بستر و تزئینات

- کف بدون بستر یا با سنگ‌های صاف **بزرگ‌تر از سر لاک‌پشت** بهترین است؛ ریگ و سنگ‌ریزه‌ی کوچک ممکن است بلعیده شود و انسداد گوارشی ایجاد کند.
- تزئینات تیز، اجسام شکستنی و فضاهای تنگی که حیوان در آن گیر کند و غرق شود را حذف کنید.
- برای ماده‌های بالغ، دسترسی به **جعبه‌ی تخم‌گذاری** (خاک/ماسه‌ی مرطوب و عمیق) در نظر بگیرید؛ ماده‌ها حتی بدون نر هم تخم می‌گذارند.

> **آکواریوم بیرون از خانه؟**
>
> حوضچه‌ی ایمن در فضای باز در فصل گرم برای نور طبیعی خورشید عالی است، به شرط حصار محکم (این لاک‌پشت‌ها بالا رفتن و فرار بلدند)، سایه، محافظت در برابر گربه، پرنده‌ی شکاری و دزد، و جمع‌آوری پیش از سرد شدن هوا. خواب زمستانی در خانه را بدون معاینه‌ی دامپزشک و برنامه‌ی دقیق انجام ندهید.

۴ تغذیه

جوجه‌ها و نوجوان‌ها پروتئین بیشتری نیاز دارند؛ با بالا رفتن سن، سهم گیاهان باید بیشتر شود. بیش‌خوراندن، به‌خصوص پروتئین، شایع‌ترین خطای تغذیه است و به رشد سریع و ناهموار لاک، چاقی و آلودگی آب منجر می‌شود.

سن	دفعات غذای اصلی	ترکیب تقریبی
جوجه (سال اول)	روزانه، مقدار کم	پلت مخصوص لاک‌پشت آبزی + بی‌مهرگان مناسب؛ گیاهان آبزی همیشه در دسترس
نوجوان	یک روز در میان	پلت + پروتئین متنوع + سهم رو به افزایش سبزیجات
بالغ	هر ۲ تا ۳ روز یک‌بار	بیشترِ حجم: گیاهان آبزی و سبزیجات برگی؛ پلت و پروتئین به‌مقدار کمتر

چه بدهیم

- پلت باکیفیت مخصوص لاک‌پشت آبزی (پایه‌ی متعادل)
- گیاهان آبزی: عدسک آبی، الودآ و گیاهان آکواریومی بی‌خطر
- سبزیجات برگی تیره: کاهوی رومی، برگ قاصدک، کاسنی
- پروتئین: کرم خاکی از منبع تمیز، حلزون آبزی پرورشی، جیرجیرک، و گاهی ماهی کامل کوچک مناسب (نه ماهی قرمز)
- منبع کلسیم مانند کاتل‌بون در آب، طبق نظر دامپزشک

چه ندهیم

- گوشت خام، مرغ، کالباس، سوسیس و غذای سگ و گربه (چربی و پروتئین نامتعادل)
- ماهی قرمز و ماهی طعمه‌ی ارزان به‌عنوان غذای اصلی (خطر کمبود تیامین)
- رژیم فقط «گاماروس/میگوی خشک» — پرکننده است و کمبود ویتامین A و کلسیم می‌سازد
- کاهوی پیچ (ارزش غذایی کم) و اسفناج زیاد
- نان، لبنیات و غذای انسانی

ترفند آب تمیز

غذا دادن در یک ظرف جداگانه‌ی آب‌دار (و برگرداندن حیوان پس از ۱۵ تا ۲۰ دقیقه) بخش بزرگی از آلودگی آکواریوم اصلی را حذف می‌کند. مقدار مناسب پلت برای هر وعده تقریباً به اندازه‌ای است که در چند دقیقه خورده شود؛ باقی‌مانده را بردارید.

۵ برنامه‌ی مراقبت (چک‌لیست)

روزانه

- ☐ کنترل دمای آب و سکو با دماسنج
- ☐ روشن/خاموش‌شدن درست چراغ‌ها (تایمر)
- ☐ غذا طبق برنامه‌ی سنی و برداشتن باقی‌مانده
- ☐ نگاه کوتاه: شنا، آفتاب‌گیری، چشم‌ها، تنفس
- ☐ برداشتن فضولات قابل‌مشاهده

هفتگی

- ☐ تعویض بخشی از آب (معمولاً ۲۵ تا ۵۰٪) با آب کلرزدایی‌شده‌ی هم‌دما
- ☐ سیفون کف و تمیز کردن سکو
- ☐ بررسی لاک و پوست زیر نور خوب
- ☐ تمیز کردن شیشه و ظرف غذا

ماهانه

- ☐ شستشوی مواد فیلتر در آب کهنه‌ی آکواریوم (نه آب شیر)
- ☐ وزن‌کردن با ترازوی آشپزخانه و ثبت در دفترچه
- ☐ اندازه‌گیری طول لاک (برای جوان‌ها)
- ☐ بررسی سالم‌بودن بخاری، محافظ و سیم‌کشی

سالانه

- ☐ معاینه‌ی دوره‌ای نزد دامپزشک اگزوتیک
- ☐ تعویض لامپ UVB طبق دستور سازنده
- ☐ بازبینی اندازه‌ی آکواریوم با رشد حیوان
- ☐ بررسی مدفوع از نظر انگل در صورت توصیه‌ی دامپزشک

بهداشت و سالمونلا

لاک‌پشت‌ها، حتی کاملاً سالم، می‌توانند *سالمونلا* را در روده و محیط آب خود حمل کنند. بعد از هر تماس با حیوان، آب یا تجهیزات دست‌ها را با آب و صابون بشویید؛ آکواریوم و وسایل را در سینک آشپزخانه یا حمام کودکان نشویید؛ اجازه ندهید کودکان زیر ۵ سال، افراد باردار، سالمندان و افراد دارای نقص ایمنی تماس مستقیم داشته باشند؛ و لاک‌پشت را هرگز نبوسید یا روی سطح آشپزخانه رها نکنید.

۶ رفتار، دست‌آموزی و هندلینگ

گوش‌قرمز حیوانی کنجکاو و فعال است و به‌سرعت صاحبش را با غذا مرتبط می‌کند و جلوی شیشه «گدایی» می‌کند؛ اما از بغل‌شدن لذت نمی‌برد. برای او بلند شدن از زمین شبیه گرفتار شدن توسط شکارچی است.

- **آفتاب‌گیری طولانی** با پاهای عقبی کشیده رفتاری طبیعی و نشانه‌ی رضایت است.
- **لرزاندن ناخن‌های بلند جلوی صورت** در نرها رفتار جفت‌یابی است؛ ناخن‌های بلند جلویی نر طبیعی‌اند و نباید کوتاه شوند.
- **پریدن سریع به آب** هنگام نزدیک‌شدن شما واکنش طبیعی ترس است و با گذشت زمان کمتر می‌شود.
- **کندنِ بستر و بی‌قراری ماده** ممکن است نشانه‌ی آماده‌شدن برای تخم‌گذاری باشد.

چگونه بلند کنیم

حیوان را با دو دست از دو طرف لاک، ترجیحاً از نیمه‌ی عقبی، نگه دارید تا سر به دست شما نرسد. لاک‌پشت‌های بزرگ می‌توانند گاز دردناک بگیرند و با ناخن‌های عقبی خراش بدهند. هندلینگ را کوتاه و فقط برای تمیزکاری، وزن‌کردن یا معاینه انجام دهید و همیشه نزدیک به سطح زمین یا میز نگه دارید؛ افتادن می‌تواند لاک را بشکند.

۷ مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

مشکل	علت رایج	نشانه‌هایی که باید ببینید
بیماری متابولیک استخوان / نرمی لاک	کمبود UVB، کلسیم ناکافی یا رژیم نامتعادل	لاک نرم یا کج، رشد کند، فک نرم، ضعف در شنا و بالا رفتن
کمبود ویتامین A	رژیم تک‌غذایی (به‌خصوص گاماروس خشک یا گوشت)	تورم پلک‌ها، چشم بسته، ترشح، بی‌اشتهایی
آبسه‌ی گوش	اغلب مرتبط با کمبود ویتامین A و آب آلوده	برجستگی سفت پشت چشم در کنار سر
عفونت تنفسی / پنومونی	آب یا هوای سرد، آب آلوده، استرس	حباب یا ترشح بینی، تنفس با دهان باز، شنای کج، شناور ماندن و ناتوانی در شیرجه
پوسیدگی و عفونت لاک	آب کثیف، نبود سکوی خشک، زخم	لکه‌ی سفید یا قرمز، حفره، لاک نرم موضعی، بوی بد، ترشح زیر سپرها
عفونت پوستی و قارچی	کیفیت پایین آب و خشک‌نشدن	لکه‌های سفید پنبه‌ای، زخم، پوسته‌ریزی غیرعادی (پوست‌اندازی طبیعی نازک و شفاف است)
احتباس تخم	نبود محل تخم‌گذاری، کمبود کلسیم، بیماری	بی‌قراری، حفاری بی‌نتیجه، زور زدن، بی‌اشتهایی در ماده

بیرون‌زدگی (پرولاپس)	زور زدن، عفونت، مشکل تخم‌گذاری یا گوارشی	بافت صورتی/قرمز یا تیره که از مخرج بیرون مانده است
سوختگی و شکستگی لاک	بخاری بی‌محافظ، لامپ نزدیک، افتادن، گاز سگ	تغییر رنگ لاک، تاول، ترک یا خونریزی

در خزندگان بیماری‌ها معمولاً آرام و پنهانی پیش می‌روند و وقتی نشانه آشکار می‌شود، مشکل اغلب چند هفته است که وجود دارد. تشخیص علت و درمان کار دامپزشک اگزوتیک است؛ از درمان خانگی با داروهای حیوانات دیگر یا توصیه‌های فروشگاهی پرهیز کنید، چون ممکن است بیماری را پنهان یا بدتر کند.

۸ چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

بدون معطلی مراجعه کنید اگر:

- تنفس با دهان باز، صدای خس‌خس یا حباب و ترشح از بینی دارد.
- کج شنا می‌کند، نمی‌تواند زیر آب برود یا روی آب سرگردان است.
- چشم‌ها متورم و بسته‌اند و غذا نمی‌خورد.
- بافتی از مخرج بیرون زده است (آن را مرطوب و تمیز نگه دارید و فوراً راه بیفتید).
- لاک ترک خورده، خونریزی دارد یا سوخته است.
- ماده زور می‌زند، بی‌قرار است و تخم نمی‌گذارد.
- با دمای درست، بی‌حال است، روی سکو یا در آب واکنش نمی‌دهد.
- بی‌اشتهایی همراه با هر نشانه‌ی دیگری، یا بی‌اشتهایی طولانی در دمای مناسب.

تا رسیدن به دامپزشک

حیوان را در یک جعبه‌ی تمیز با تهویه، روی حوله‌ی مرطوب (نه در آب عمیق) و در محیطی گرم و آرام منتقل کنید؛ حیوان بیمار ممکن است در آب عمیق غرق شود. اگر سفر طولانی است، دما را با کیسه‌ی آب گرم پیچیده در حوله حفظ کنید و تماس مستقیم با منبع گرما را ممنوع کنید. هیچ دارو یا پمادی خودسرانه استفاده نکنید و عکس از وضعیت آکواریوم، دماها و نوع غذا را همراه داشته باشید.

۹ چک‌لیست خرید و انتخاب لاک‌پشت سالم

پیش از خرید

- ☐ آکواریوم، فیلتر، بخاری، سکو، UVB و دماسنج را از قبل راه‌اندازی کنید.
- ☐ آب و دماها را دست‌کم چند روز پایدار کنید.
- ☐ یک دامپزشک اگزوتیک در نزدیکی خود پیدا کنید.
- ☐ از فروشنده درباره‌ی منشأ (پرورشی) و رژیم فعلی بپرسید.
- ☐ برای قرنطینه‌ی جداگانه اگر لاک‌پشت دیگری دارید برنامه بریزید.

نشانه‌های حیوان سالم

- ☐ چشم‌های باز، روشن و بدون تورم یا ترشح
- ☐ بینی خشک، تنفس بی‌صدا و دهان بسته
- ☐ شنای متعادل و توانایی شیرجه زدن
- ☐ لاک سفت و هموار بدون لکه‌ی سفید، حفره یا بوی بد
- ☐ پوست بدون زخم یا لکه‌ی پنبه‌ای؛ مخرج تمیز
- ☐ واکنش سریع، فعال و تمایل به غذا

پرچم قرمز در محل فروش

نگهداری ده‌ها جوجه در یک ظرف کوچک آب کدر بدون نور، جوجه‌هایی با لاک نرم یا چشم بسته، و فروشنده‌ای که «ظرف پلاستیکی و گاماروس» را کافی می‌داند. خرید از چنین منبعی معمولاً به معنی شروع با حیوانی بیمار است.

۱۰ پرسش‌های متداول

؟ آیا گوش‌قرمز در همان ظرف پلاستیکی کوچک می‌ماند؟

خیر. اندازه‌ی لاک‌پشت به ظرف بستگی ندارد؛ ظرف کوچک فقط آب را سریع‌تر آلوده و حیوان را بیمار می‌کند. کوچک ماندن غیرعادی معمولاً نشانه‌ی سوءتغذیه یا بیماری است.

؟ آیا نور پنجره جای لامپ UVB را می‌گیرد؟

خیر. شیشه‌ی پنجره بیشتر UVB را مسدود می‌کند. نور مستقیم خورشید در فضای باز (با سایه و ایمنی کامل) مفید است، اما در داخل خانه لامپ UVB لازم است.

؟ چطور نر و ماده را تشخیص بدهم؟

نرهای بالغ معمولاً کوچک‌ترند، ناخن‌های جلویی بسیار بلند و دُم بلندتر و ضخیم‌تری دارند که مخرج آن بیرون از لبه‌ی لاک قرار می‌گیرد. در جوجه‌ها تشخیص قابل‌اعتماد نیست و تا رسیدن به بلوغ باید صبر کرد.

؟ لاک‌پشت من در زمستان کم‌تحرک شده؛ خواب زمستانی است؟

در خانه‌ای با آب گرم و نور منظم نباید کاهش شدید فعالیت یا اشتها رخ دهد. کم‌تحرکی معمولاً نشانه‌ی سرد شدن آب یا بیماری است. ابتدا دماها را بسنجید و اگر درست بود، معاینه را عقب نیندازید.

؟ ماده‌ی من بدون نر تخم گذاشته؛ طبیعی است؟

بله، ماده‌های بالغ می‌توانند تخم بی‌نطفه بگذارند. مهم این است که محل تخم‌گذاری مناسب و کلسیم کافی داشته باشند و نشانه‌های احتباس تخم (زور زدن، بی‌قراری طولانی، بی‌اشتهایی) را جدی بگیرید.

هشدار پایانی: این راهنما برای آموزش صاحبان لاک‌پشت تهیه شده و **جایگزین معاینه، تشخیص و درمان توسط دامپزشک نیست**. هیچ دارو یا دوزی در این راهنما ذکر نشده است. هر حیوان شرایط خاص خود را دارد؛ در صورت مشاهده‌ی هر نشانه‌ی بیماری، به دامپزشک اگزوتیک آشنا با خزندگان مراجعه کنید.