

راهنمای نگهداری کانپور

گرین‌چیک کانپور و سان کانپور: قفس، تغذیه، برنامه‌ی مراقبت، رفتار و صدا، بیماری‌های مهم و نشانه‌هایی که نباید نادیده گرفت.

دکتر مهدیار رمزگویان – دامپزشک حیوانات اگزوتیک



عکس: گرین‌چیک کانپور (Pyrrhura molinae) – Eric Sonstroem، ویکی‌مدیا کامنز، CC BY 2.0

۱. کارت اطلاعات سریع

نام فارسی / علمی	گرین‌چیک کانپور (Pyrrhura molinae) و سان کانپور (Aratinga solstitialis)؛ «کانپور» نام عمومی چند جنس از طوطی‌های کوچک و میان‌اندازه‌ی آمریکای مرکزی و جنوبی است.
طول عمر	با نگهداری خوب معمولاً ۱۵ تا ۲۵ سال و گاهی بیشتر (سان کانپور اغلب کمی طولانی‌تر). این یک تعهد چندهای است.
اندازه‌ی بالغ	گرین‌چیک: حدود ۲۵-۲۶ سانتی‌متر (با دم)، ۶۰ تا ۸۰ گرم – سان کانپور: حدود ۳۰ سانتی‌متر، ۱۰۰ تا ۱۳۰ گرم
سطح دشواری	متوسط؛ از نظر تجهیزات ساده، اما از نظر وقت، توجه روزانه و تحمل صدا پرتوقع‌تر از مرغ عشق و عروس هلندی.
رژیم	پلت باکیفیت به‌عنوان پایه + سبزیجات تازه + مقدار کم میوه و دانه (به‌عنوان جایزه)
دما / نور	دمای معمول خانه (تقریباً ۱۸-۲۷ درجه) بدون کوران و تغییر ناگهانی؛ ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب در تاریکی و سکوت؛ نور روز طبیعی (پشت شیشه UVB عبور نمی‌کند)
اجتماعی / تنها	به‌شدت اجتماعی. تنها هم می‌توان نگه داشت به شرط چند ساعت تعامل واقعی در روز؛ در غیر این صورت جفت هم‌گونه بهتر است.
صدا	گرین‌چیک: متوسط؛ سان کانپور: بسیار بلند و تیز – از بلندصداترین طوطی‌های هم‌اندازه‌ی خود

۲. مناسب چه کسی است؟

کانپور برای کسی مناسب است که طوطی‌ای «درگیر» و بازیگوش می‌خواهد که روی شانه بنشیند، زیر یقه قایم شود و با صاحبش بازی کند – و آماده است هر روز برای او وقت بگذارد. کانپور وسیله‌ی تزئینی کنار پنجره نیست؛ پرنده‌ای است که اگر بی‌کار و تنها بماند، با جیغ، گاز گرفتن یا کندن پر اعتراض می‌کند.

انتخاب خوبی است اگر...

- هر روز حداقل ۱ تا ۲ ساعت وقت برای تعامل و بیرون از قفس دارید.
- بیشتر روز خانه نیستید و کسی هم جای شما نیست.
- در آپارتمانی با دیوارهای نازک زندگی می‌کنید و به سان کانپور فکر می‌کنید.

- با چند جیغ بلند صبح و غروب کنار می‌آیید (و همسایه‌ها • کودک خردسالی دارید که نمی‌توان بر تعاملش با پرنده (هم) نظارت کرد.
- برای ۲۰ سال آینده برنامه دارید یا کسی را برای مراقبت در • در خانه زیاد از تابه‌ی نچسب (تفلون) و اسپری استفاده می‌شود و نمی‌خواهید عادت‌ها را تغییر دهید.
- آماده‌اید رژیم را از دانه به پلت و سبزی تغییر دهید.

گرین‌چیک یا سان کانپور؟

برای بیشتر خانه‌ها و آپارتمان‌ها، **گرین‌چیک کانپور** انتخاب واقع‌بینانه‌تری است: کوچک‌تر، آرام‌تر و به همان اندازه بازیگوش. سان کانپور رنگ خیره‌کننده‌ای دارد، اما صدایش برای بسیاری از خانواده‌ها دلیل اصلی واگذاری پرنده است. پیش از خرید، صدای هر دو را از نزدیک بشنوید.

۳. محل نگهداری و تجهیزات

قفس

- **اندازه:** بزرگ‌ترین قفسی که جا و بودجه اجازه می‌دهد. به‌عنوان حداقل عملی، برای گرین‌چیک حدود $70 \times 50 \times 60$ سانتی‌متر (طول $\times$ عرض $\times$ ارتفاع) و برای سان کانپور حدود $90 \times 50 \times 80$ ؛ طول قفس مهم‌تر از ارتفاع است چون پرنده باید بتواند چند بال بزند.
- **فاصله‌ی میله‌ها:** حدود $1/3$ تا $1/9$ سانتی‌متر؛ میله‌ی بازتر خطر گیر کردن سر را دارد.
- **جنس:** فولاد ضدزنگ یا رنگ پودری سالم. از قفس‌های گالوانیزه‌ی ارزان یا رنگ‌پریده پرهیز کنید؛ کانپور میله‌ها را می‌جود و **مسمومیت با روی و سرب** در طوطی‌ها شایع است.
- **نشیمن:** ۳ تا ۴ نشیمن با قطرهای متفاوت از چوب طبیعی بی‌خطر؛ نشیمن سنباده‌ای پا را زخم می‌کند. یک نشیمن سیمانی/معدنی کوچک برای کوتاه ماندن ناخن کافی است.
- **کف:** کاغذ ساده یا روزنامه‌ی بدون جوهر زیاد زیر توری، تا بتوانید هر روز رنگ و شکل فضولات را ببینید.

اسباب‌بازی، پناه و خواب

- کانپورها عاشق جویدن و «قایم شدن» اند. اسباب‌بازی‌های جویدنی (چوب نرم، کاغذ، برگ خرما)، طناب کنفی کوتاه و اسباب‌بازی‌های جست‌وجوی غذا بگذارید و هر هفته چند تا را عوض کنید.
- بسیاری از کانپورها دوست دارند زیر پارچه یا داخل «چادر خواب» بخوابند. اگر استفاده می‌کنید، مرتب نخ‌کش‌شدن آن را بررسی کنید؛ نخ آزاد می‌تواند دور پا بپیچد و پرنده‌ای که پارچه را می‌جود ممکن است الیاف ببلعد. در پرنده‌ای که رفتار هورمونی (جفت‌گیری، تخم‌گذاری) دارد، فضای بسته‌ی لانه‌مانند را حذف کنید.
- آینه و عروسک‌هایی که پرنده با آن‌ها رفتار جفت‌گیری نشان می‌دهد را بردارید.

جای قفس، دما و نور

- در اتاقی که خانواده در آن رفت‌وآمد دارد، با یک طرف قفس به دیوار؛ دور از آشپزخانه، کولر و بخاری، و نه مستقیم جلوی پنجره‌ی آفتاب‌گیر.
- دمای معمول خانه مناسب است؛ مشکل اصلی **کوران و تغییرات ناگهانی** است، نه خنکی ملایم.
- ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب در تاریکی و سکوت؛ کم‌خوابی یکی از دلایل جیغ و رفتار هورمونی است. درباره‌ی نور طبیعی و لامپ‌های ویژه‌ی پرندگان، **نور، UVB و خواب در پرندگان** را ببینید.

خطرهای پنهان خانه

بخار تابه‌ها و وسایل نجسب (PTFE/تفلون) وقتی داغ شوند می‌تواند در چند دقیقه پرنده را بکشد. همچنین اسپری‌ها، خوشبوکننده‌ها، شمع معطر، دود سیگار و قلیان، پنکه‌ی سقفی روشن، پنجره‌ی باز، آب باز (سینک، توالت، قابلمه)، گربه و سگ، و سیم برق را جدی بگیرید. فهرست کامل: **مسمومیت‌های خانگی در پرندگان.**

۴. تغذیه

رژیم فقط دانه (حتی «مخلوط مخصوص طوطی») چرب و از نظر ویتامین A، کلسیم و پروتئین باکیفیت ناقص است و در درازمدت به چاقی، کبد چرب و مشکلات پوست و پر می‌انجامد. کانپور در حال تغییر رژیم را **تدریجی و با پایش وزن** جابه‌جا کنید؛ پرنده‌ای که دانه را نمی‌شناسد ممکن است ترجیح دهد گرسنه بماند.

گروه غذایی	سهم تقریبی از رژیم	توضیح
پلت باکیفیت	حدود ۶۰ تا ۷۰٪	پایه‌ی رژیم؛ پلت بدون رنگ و شکر افزوده ترجیح دارد.
سبزیجات تازه	حدود ۲۰ تا ۳۰٪	لفل دلمه‌ای، هویج، کدو، بروکلی، کلم‌برگ، جعفری (کم)، نخود فرنگی، جوانه‌ها – شسته و روزانه.
میوه	حدود ۵ تا ۱۰٪	سیب و گلابی (بدون هسته)، انار، توت‌ها، انبه، پاپایا – به‌عنوان تنقلات.
دانه و مغزها	کم، به‌عنوان جایزه	برای آموزش و جست‌وجوی غذا عالی‌اند، نه به‌عنوان غذای اصلی.

هرگز ندهید

آووکادو، شکلات، قهوه و چای، نوشابه و الکل، غذای شور یا چرب و سرخ‌کرده، پیاز و سیر، هسته‌ی میوه‌ها (هلو، زردآلو، گیلان) و دانه‌ی سیب، آدامس و شیرینی بدون قند (زایلیتول)، غذای کپک‌زده یا مانده. درباره‌ی خطر دانه و بادام‌زمینی کپک‌زده: **آفلاتوکسین در پرندگان.**

دفعات و آب

پلت و آب را همیشه در دسترس بگذارید؛ سبزی را صبح بدهید و بعد از چند ساعت (و در هوای گرم زودتر) جمع کنید. آب و ظرف آب را **هر روز** بشوید – کانپورها غذا را در آب «خیس می‌کنند» و آب سریع آلوده می‌شود. مکمل ویتامین را بدون نظر دامپزشک به آب اضافه نکنید.

جزئیات بیشتر و روش تغییر رژیم: **اصول تغذیه‌ی طوطی‌سانان.**

۵. برنامه‌ی مراقبت (چک‌لیست)

روزانه	هفتگی	ماهانه / سالانه
☐ تعویض آب و شستن ظرف آب و غذا	☐ وزن‌کشی با ترازوی گرمی و ثبت در دفترچه	☐ شست‌وشو و ضدعفونی کامل قفس (و آب‌کشی کامل)
☐ سبزی تازه صبح، جمع‌کردن باقی‌مانده	☐ تمیز کردن کامل کف، نشیمن‌ها و میله‌ها	☐ بررسی طول ناخن و منقار
☐ نگاه به فضولات: رنگ، مقدار، شکل	☐ جابه‌جایی و عوض‌کردن چند اسباب‌بازی	☐ بررسی زنگ‌زدگی و رنگ‌پریدگی قفس

- بررسی اشتها، تنفس، وضعیت پر و رفتار
- حمام: اسپری آب ولرم یا ظرف کم عمق
- معاینه‌ی سالانه نزد دامپزشک پرندگان
- حداقل ۱ تا ۲ ساعت بیرون از قفس
- بررسی اسباب‌بازی‌ها و پارچه‌ها از مرور مواد خطرناک تازه در خانه
- با نظارت نظر نخ‌کش و قطعات شل
- چند جلسه‌ی کوتاه آموزش یا بازی
- ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب در تاریکی

چرا وزن‌کشی این‌قدر مهم است؟

پرندگان به‌طور غریزی بیماری را پنهان می‌کنند. کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی وزن (مثلاً ۵ تا ۸ گرم در یک گرین‌چیک) اغلب پیش از هر نشانه‌ی دیگری ظاهر می‌شود و یکی از مطمئن‌ترین هشدارهای زودهنگام است.

۶. رفتار، صدا و هندلینگ

- **بازیگوشی:** کانیورها به پشت دراز می‌کشند، از اسباب‌بازی آویزان می‌شوند و زیر پارچه می‌خزند – این‌ها طبیعی‌اند. یادگیری حرف محدود است (به‌ویژه در گرین‌چیک)، اما ترفند و فرمان را خیلی خوب یاد می‌گیرند.
- **صدا:** صدای بلند صبح و غروب غریزی است. فریاد زدن یا سر پرنده داد کشیدن جیغ را بیشتر می‌کند (از نظر پرنده، شما هم «همراهش جیغ می‌زنید»). وقتی آرام است توجه کنید، و به جیغ توجه‌طلبانه واکنش نشان ندهید. بیشتر: جیغ
- **بیش‌ازحد در طوطی‌ها.**
- **گاز گرفتن:** معمولاً از ترس، خستگی، محافظت از قلمرو یا هورمون‌هاست؛ «بدذاتی» نیست. نشانه‌های بدن (پر سیخ، سر پایین، منقار باز) را بخوانید و پیش از گاز عقب بکشید. تنبیه فیزیکی و فوت‌کردن به صورت پرنده اعتماد را خراب می‌کند.
- **آموزش:** با جایزه‌ی کوچک (یک دانه‌ی آفتابگردان یا تکه‌ی ارزن) و جلسات ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای، اول «بالا» (سوارشدن روی دست)، بعد برگشتن به قفس و آمدن با صدا. تمرین با کلیکر برای کانیورها عالی جواب می‌دهد.
- **نوازش:** نوازش سر و گردن را محدود کنید؛ نوازش پشت، زیر بال و نزدیک دم رفتار جفت‌گیری را تحریک می‌کند و می‌تواند به پرخاشگری هورمونی یا تخم‌گذاری مزمن در ماده‌ها منجر شود.
- **شانه:** تا وقتی پرنده قابل‌اعتماد و رام نشده، شانه جای مناسبی نیست؛ گاز نزدیک صورت و چشم آسیب جدی می‌زند.
- **چیدن بال:** تصمیمی فردی است که باید با دامپزشک گرفته شود؛ بال‌چیده هم می‌تواند از در باز فرار کند. ببینید: چیدن بال در پرندگان خانگی.
- کمبود سرگرمی ریشه‌ی بسیاری از مشکلات رفتاری است؛ ایده‌های عملی را در غنی‌سازی محیط و جست‌وجوی غذا در طوطی‌ها ببینید.

۷. مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

تشخیص و درمان همه‌ی موارد زیر کار دامپزشک پرندگان است؛ این جدول فقط برای شناختن زودهنگام نشانه‌هاست. هیچ دارویی را خودسرانه یا به توصیه‌ی فروشنده به پرنده ندهید.

مشکل	نشانه‌های هشدار	پیشگیری / نکته
کندن پر و آسیب به خود	پره‌های جویده، نواحی بی‌پر روی سینه و پا، پره‌های ریخته‌ی زیاد کف قفس	هم علت پزشکی دارد و هم رفتاری؛ پیش از «رفتاری» دانستن، معاینه لازم است.
PBFD و پولیوماویروس	پره‌های بدشکل یا ناقص، منقار و ناخن غیرطبیعی، ضعف، مرگ ناگهانی در جوجه‌ها	خرید از پرورش‌دهنده‌ی سالم، قرنطینه، آزمایش پرنده‌ی جدید. ببینید: PBFD و پولیوما
پسپتاکوز (کلامیدیوز)	ترشح چشم و بینی، فضولات سبز آبکی، بی‌حالی؛ گاهی پرنده ناقل بی‌علامت است	مشترک انسان و پرنده. قرنطینه، تمیزی قفس، و اطلاع به پزشک اگر علائم شبه‌آنفلانزا دارید.
بیماری‌های تنفسی و آسپرزیلوز	تنفس با دهان باز، تکان خوردن دم با هر نفس، تغییر صدا، عطسه و ترشح	تهویه‌ی خوب، دوری از دود و گردوغبار، غذای خشک و بدون کپک
مسمومیت با فلزات سنگین	استفراغ، فضولات خونی یا سبز تیره، ضعف، تشنج	قفس سالم، دوری از وسایل سربی / گالوانیزه، کلید، زیورآلات و پرده‌های وزنه‌دار
چاقی و کبد چرب	وزن رو به افزایش، سینه‌ی گرد و پرچربی، رشد بیش‌ازحد منقار و ناخن، پره‌های کم‌رنگ	رژیم پلت و سبزی، دانه فقط به‌عنوان جایزه، تحرک روزانه
تخم‌گذاری مزمن و گیرکردن تخم	ماده‌ای که پشت سر هم تخم می‌گذارد؛ زور زدن، نشستن کف قفس، دم پایین و تکان‌خور	کنترل محرک‌های هورمونی (نور طولانی، لانه، نوازش پشت). گیرکردن تخم اورژانس است.
«سندروم خون‌ریزی کانپور»	خون‌ریزی غیرعادی، خون در فضولات، کبودی، ضعف – بیشتر در کانپورهای جنس <i>Aratinga</i> (مثل سان کانپور) گزارش شده	علت دقیقش روشن نیست؛ هر خون‌ریزی غیرعادی نیاز به مراجعه‌ی فوری دارد.
آسیب‌ها	شکستگی پر خونی ، زخم منقار، گاز گربه، برخورد با شیشه، سوختگی	نظارت در زمان آزادی، پوشاندن پنجره‌ها و آینه‌ها، دوری از اجاق

پرنده‌ی بیمار تا آخرین لحظه «خوب» به نظر می‌رسد

پرنده‌ای که پره‌ایش را پف کرده، بیشتر می‌خوابد، روی دو پا می‌خوابد یا کف قفس می‌نشیند، اغلب بیماری‌اش از چند روز پیش شروع شده است. «صبر کنیم ببینیم خوب می‌شود یا نه» در پرندگان معمولاً وقت از دست دادن است. **فهرست کامل: نشانه‌های بیماری و خواندن فضولات پرنده.**

۸. چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

- تنفس با دهان باز، تکان خوردن شدید دم با هر نفس، یا صدای خس خس
 - خونریزی (از پر، منقار، ناخن، کلوک یا در فضولات) که با فشار ملایم بند نمی‌آید
 - نشستن کف قفس، افتادن از نشیمن، تعادل نداشتن یا تشنج
 - نخوردن غذا بیش از ۲۴ ساعت یا نبودن فضولات
 - زور زدن مداوم در ماده (احتمال گیرکردن تخم) یا بیرون زدگی بافت از کلوک
 - استفراغ مکرر، فضولات خونی، سیاه یا سبز تیره و آبکی
 - تماس با بخار تفلون، دود، مواد شیمیایی، یا جویدن فلز، دارو و گیاه ناشناخته
 - هر حمله‌ی گربه یا سگ – حتی اگر زخمی دیده نشود
- تا رسیدن به دامپزشک:** پرنده را در جعبه‌ی حمل کوچک، گرم (نه داغ)، تاریک و آرام بگذارید؛ آب و غذای همیشگی را در دسترس بگذارید؛ نمونه‌ی فضولات تازه و هر ماده‌ی مشکوک را همراه ببرید؛ هیچ دارو، روغن یا مایعی به‌زور به دهانش نریزید.

آمادگی پیش از بحران: جعبه‌ی کمک‌های اولیه، مراقبت حمایتی از پرنده‌ی بیمار در خانه و پیدا کردن دامپزشک اگزوتیک خوب – همین امروز شماره‌ی یک دامپزشک پرندگان را ذخیره کنید.

۹. چک‌لیست خرید و انتخاب کانپور سالم

فروشنده و مدارک

پرنده

- | | |
|--|---|
| ☐ پرورش‌یافته در اسارت، نه صیدشده از طبیعت؛ بسیاری از کانپورها در پیوست CITES هستند و تجارت غیرقانونی گونه‌های وحشی را تغذیه می‌کند | ☐ هوشیار، کنجکاو و فعال؛ نه پف‌کرده و خواب‌آلود |
| ☐ حلقه‌ی بسته‌ی پا (نشانه‌ی پرورش از جوجگی) و تاریخ تولد | ☐ چشم‌ها روشن و بدون ترشح؛ سوراخ‌های بینی تمیز و قرینه |
| ☐ جوجه‌ی کاملاً از شیر گرفته‌شده که خودش غذا می‌خورد؛ <u>دست‌خوراک کردن جوجه</u> کار تازه‌کار نیست | ☐ پرها صاف و کامل، بدون نواحی بی‌پر یا پر بدشکل |
| ☐ در صورت امکان، تعیین جنسیت DNA و آزمایش‌های PBFD/پسیتاکوز | ☐ منقار و ناخن‌ها بدون ترک، کج‌شدگی یا رشد زیاد |
| ☐ محیط تمیز، قفس‌های غیرشلوغ، پرنده‌های سالم دیگر | ☐ کلوک تمیز و بدون فضولات چسبیده |
| ☐ آمادگی برای <u>قرنطینه‌ی ۳۰ تا ۴۵ روزه</u> اگر پرنده‌ی دیگری دارید | ☐ سینه پر و گوشتی؛ استخوان جناغ تیز و برجسته نباشد |
| ☐ معاینه‌ی دامپزشک در هفته‌ی اول خرید | ☐ تنفس آرام و بی‌صدا، بدون تکان خوردن دم |
| | ☐ فضولات طبیعی کف قفس محل فروش |

۱۰. پرسش‌های متداول

آیا کانپور حرف می‌زند؟

چند کلمه را می‌تواند یاد بگیرد، اما صدایش زبر است و حرف‌زدن نقطه‌ی قوتش نیست. اگر تکرار کلمه برایتان اولویت است،

کانیور را با این انتظار نخرید؛ نقطه‌ی قوتش بازی، ترفند و وابستگی عاطفی است.

یک کانیور بگیرم یا دو تا؟

یک کانیور با صاحبی که زیاد خانه است و وقت می‌گذارد، معمولاً با انسان‌ها پیوند نزدیک‌تری می‌گیرد. اگر ساعت‌های طولانی بیرون‌اید، یک هم‌گونه‌ی دیگر (پس از قرنطینه و آشنایی تدریجی، ترجیحاً در قفس جدا در ابتدا) کمک بزرگی است. کانیور را با طوطی‌های کوچک‌تر مثل مرغ عشق در یک قفس نگذارید.

چرا کانیورم پشت سر هم جیغ می‌زند؟

شایع‌ترین دلایل: بی‌حوصلگی، کم‌خوابی، الگوی یادگرفته‌شده (جیغ زده و جواب گرفته)، و ساعت‌های طبیعی صبح و غروب. جیغ ناگهانی و غیرعادی در پرنده‌ای که قبلاً آرام بود را هم پزشکی بررسی کنید.

چرا کانیورم در آب «غذا خیس می‌کند»؟

رفتار طبیعی و رایجی است؛ فقط آب را بیشتر از یک بار در روز عوض کنید، چون آب غذاآلود محیط رشد سریع باکتری است.

نر و ماده را از ظاهر می‌شود تشخیص داد؟

در گرین‌چیک و سان کانیور تقریباً نه؛ تعیین جنسیت مطمئن با آزمایش DNA است. ببینید: تعیین جنسیت پرندگان.

آیا کانیور با بچه‌ها خوب کنار می‌آید؟

با کودکان بزرگ‌تر و آرام، با نظارت، بله. منقار کانیور می‌تواند گاز دردناکی بگیرد و کودک خردسال ممکن است ناخواسته پرنده را فشار دهد یا رها کند.

۱۱. هشدار پایانی

این راهنما برای آموزش صاحبان پرنده تهیه شده و **جایگزین معاینه، تشخیص و درمان توسط دامپزشک نیست**. هیچ دارو یا دوزی در آن ذکر نشده و نباید بر اساس آن به پرنده دارو داد. اعداد ذکرشده (ابعاد، وزن، طول عمر) محدوده‌های رایج‌اند و بسته به گونه، فرد و منبع کمی متفاوت‌اند. با بروز هر نشانه‌ی بیماری، به دامپزشک پرندگان و حیوانات اگزوتیک مراجعه کنید.

بهداشت: بعد از تمیز کردن قفس و دست زدن به پرنده دست‌هایتان را بشویید؛ افراد باردار، سالمند یا دارای نقص ایمنی در تمیز کردن قفس احتیاط بیشتری کنند.

راهنمای کامل آنلاین: نگهداری کانیور (سان کانیور و گرین‌چیک) – exoticsbymahdiyar.ir

دکتر مهدیار رمزگویان – exoticsbymahdiyar.ir

نسخه ۱ – ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (۸ اکتبر ۲۰۲۶)