



کتابخانه‌ی اگزوتیکس · راهنمای نگهداری · پرندگان

راهنمای نگهداری مرغ عشق

(بادجریگار – *Melopsittacus undulatus*)

از انتخاب پرنده‌ی سالم و چیدمان قفس تا تغذیه‌ی درست، برنامه‌ی مراقبت روزانه، دست‌آموزی و نشانه‌های هشدار بیماری – یک مرجع کاربردی برای کنار قفس.

دکتر مهدیار رمزگویان، دامپزشک حیوانات اگزوتیک · exoticsbymahdiyar.ir

Photo: NasserHalaweh, "Psittaculidae Melopsittacus undulatus 4", Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

مرغ عشق کوچک است، اما «حیوان ساده» نیست. با قفس مناسب، رژیم متعادل و هم‌صحبت کافی ده سال یا بیشتر سرحال می‌ماند؛ با یک ظرف دانه در قفسی کوچک، معمولاً خیلی زودتر با چاقی، کبد چرب یا مشکلات تیروئید به مطب می‌رسد. هدف این راهنما این است که بدانید چه کار کنید و مهم‌تر از آن، چرا.

۱ کارت اطلاعات سریع

مرغ عشق، بادجریگار (<i>Melopsittacus undulatus</i> – Budgerigar)؛ بومی مناطق خشک استرالیا	نام فارسی / علمی
معمولاً ۷ تا ۱۰ سال؛ با تغذیه و مراقبت خوب گاهی ۱۲ تا ۱۵ سال	طول عمر
طول حدود ۱۸ سانتی‌متر (با دم)؛ وزن معمولاً ۳۰ تا ۴۰ گرم. نژادهای نمایشی («انگلیسی») درشت‌ترند و ممکن است ۴۵ تا ۶۰ گرم باشند	اندازه‌ی بالغ
مبتدی تا متوسط – نگهداری ساده است، اما تغذیه‌ی درست و تشخیص زودهنگام بیماری دقت می‌خواهد	سطح دشواری
دانه‌خوار (گیاه‌خوار)؛ پایه‌ی پیشنهادی: پلت باکیفیت + سبزیجات تازه + مقدار محدود دانه	رژیم غذایی
دمای معمول اتاق (حدود ۱۸ تا ۲۷ درجه‌ی سانتی‌گراد) بدون کوران و تغییرات ناگهانی؛ گرمای بالای حدود ۳۰ درجه را خوب تحمل نمی‌کند	دما
رطوبت معمول خانه کافی است؛ هوای خیلی خشک را با حمام آب جبران کنید	رطوبت
نور طبیعی روز (نه پشت شیشه‌ی بسته به‌تنهایی) یا لامپ فول‌اسپکتروم مخصوص پرنده؛ ۱۰ تا ۱۲ ساعت تاریکی و سکوت شبانه	نور و خواب
به‌شدت گروه‌زی؛ نگهداری دوتایی معمولاً بهتر است. تک‌نگهداری فقط اگر چند ساعت تعامل روزانه دارید	اجتماعی / تنها

۲ مناسب چه کسی است؟ آیا انتخاب درستی است؟

انتخاب خوبی است اگر...

- اولین پرنده‌تان است و پرنده‌ای کوچک و نسبتاً آرام می‌خواهید.
- هر روز وقت تعامل، پرواز آزاد و تمیزکاری دارید.

شاید انتخاب درستی نباشد اگر...

- پرنده‌ای «بی‌صدا» و «بی‌ریخت‌وپاش» می‌خواهید.
- گربه‌ی آزاد دارید و اتاق پرنده جدا نمی‌شود.
- در خانه سیگار/قلیان کشیده می‌شود.

- آماده‌اید رژیم را از «فقط دانه» به رژیم متعادل تغییر دهید.
- در شهرتان دامپزشک پرندگان/اگزوتیک در دسترس است.
- فقط برای سرگرمی کوتاه‌مدت کودک می‌خواهید؛ تعهد ۱۰ ساله است.

چرا دو تا بهتر از یکی است؟

مرغ عشق در طبیعت در دسته‌های بزرگ زندگی می‌کند؛ تنهایی برایش یعنی استرس. هم‌قفس هم‌نوع بسیاری از رفتارهای ناشی از کسالت را کم می‌کند و دو پرنده هنوز هم دست‌آموز می‌شوند، فقط با صبر بیشتر. جفت نر-ماده ممکن است به تخم‌گذاری مکرر برسد؛ اگر قصد جوجه‌کشی ندارید، دو نر معمولاً سازگارترین ترکیب است.

۳ محل نگهداری و تجهیزات

قفس

- **عرض مهم‌تر از ارتفاع است.** مرغ عشق افقی پرواز می‌کند؛ قفس مستطیلی و پهن بهتر از قفس‌های بلند و گرد است. برای یک یا دو پرنده، حداقل حدود ۶۰ سانتی‌متر طول (و هرچه بزرگ‌تر، بهتر) در نظر بگیرید.
- **فاصله‌ی میله‌ها** حدود ۱ تا ۱/۲ سانتی‌متر باشد تا سر پرنده گیر نکند.
- **جنس قفس:** فلز ضدزنگ یا قفس استاندارد با رنگ سالم. از قفس‌ها و اسباب‌بازی‌های ارزان با رنگ پوسته‌شده، سیم گالوانیزه‌ی کهنه یا لحیم سربی پرهیز کنید؛ پرنده میله‌ها را می‌جود و **مسمومیت با فلزات سنگین (روی/سرب)** یکی از علل مهم بیماری است.
- **جای قفس:** اتاق پررفت‌وآمد خانواده، یک طرف چسبیده به دیوار (حس امنیت)، دور از آشپزخانه، کوران، کولر/بخاری و آفتاب بی‌سایه.

داخل قفس

- **سیخ (پرچ):** چند سیخ چوب طبیعی با قطرهای مختلف (حدود ۱ تا ۱/۵ سانتی‌متر)؛ سیخ یک‌اندازه فشار را روی یک نقطه‌ی کف پا متمرکز می‌کند. سیخ سمباده‌ای نه.
- **ظرف غذا و آب:** زیر سیخ‌ها نباشند تا با فضله آلوده نشوند.
- **بستر کف:** کاغذ ساده یا دستمال کاغذی بی‌بو؛ بهترین امکان را برای دیدن **فضله‌ها** – مهم‌ترین «آزمایش» روزانه‌ی خانگی – می‌دهد. از پوشال، خاک‌اره‌ی معطر و ماسه‌ی کف قفس پرهیز کنید.
- **اسباب‌بازی:** ۳ تا ۴ اسباب‌بازی جویدنی و کاوشی با چرخش هفتگی؛ قفس را آن‌قدر شلوغ نکنید که جای پرواز کوتاه نماند.
- **حمام:** ظرف کم‌عمق آب ولرم یا اسپری مه‌پاش، چند بار در هفته، برای سلامت پر و پوست.

نور، دما و خواب

پرنده برای ساخت ویتامین D₃، جذب کلسیم و تنظیم هورمون‌ها به نور خوب نیاز دارد. شیشه‌ی پنجره بیشتر UVB را فیلتر می‌کند؛ پس زمان کوتاه و ایمن در نور مستقیم (با سایه و بدون خطر گرما) یا لامپ فول‌اسپکتروم مخصوص پرنده را در نظر بگیرید. کم‌خوابی مزمن با تحریک‌پذیری، کندن پر و فعالیت هورمونی بیش از حد مرتبط است. جزئیات بیشتر در **نور، UVB و خواب در پرندگان.**

خطرهای پنهان هوای خانه

دستگاه تنفس پرنده بسیار حساس‌تر از ماست (کیسه‌های هوایی). دود و بخار ظروف نچسب تفلونی (PTFE) که بیش از حد داغ شوند، دود سیگار و قلیان، اسپری‌ها، خوشبوکننده‌ها، شمع معطر، سفیدکننده و بخارات رنگ می‌توانند در زمان کوتاه کشنده باشند. قفس را هرگز در آشپزخانه نگذارید. فهرست کامل در **سموم خانگی و مسمومیت در پرندگان**.

زمان بیرون از قفس

روزانه یک تا دو ساعت پرواز آزاد در اتاقی امن (پنجره بسته، پنکه خاموش، آینه‌ی بزرگ پوشیده، بدون ظرف آب باز و حیوان دیگر، همیشه تحت نظر) برای قلب، ماهیچه و کنترل وزن ارزشمند است. درباره‌ی کوتاه‌کردن بال، پیش از هر تصمیم **این راهنما** را بخوانید.

۴ تغذیه

شایع‌ترین اشتباه در نگهداری مرغ عشق، رژیم «فقط ارزن و دانه‌ی مخلوط» است. دانه‌ها پرچرب‌اند و در ویتامین A، کلسیم، ید و برخی اسیدهای آمینه کمبود دارند؛ نتیجه‌ی بلندمدت‌شان چاقی، کبد چرب، مشکلات پوست و پر، و در مرغ عشق به‌طور خاص **گواتر ناشی از کمبود ید** است. هدف، رژیمی متعادل است – اما تغییر باید **تدریجی** باشد.

جزء رژیم	سهم تقریبی	توضیح
پلت (غذای فرموله) مخصوص طوطی‌سانان کوچک	بخش اصلی رژیم (هدف: حدود نیمی تا بیشتر)	متعادل‌ترین منبع ویتامین و مواد معدنی. انتقال از دانه به پلت ممکن است هفته‌ها طول بکشد.
سبزیجات تازه	روزانه، مقدار قابل‌توجه	برگ‌های تیره (کاهوی رومی، کلم پیچ برگ تیره، اسفناج به مقدار کم)، هویج رنده‌شده، کلم بروکلی، فلفل دلمه‌ای، کدو، ساقه و برگ سبزیجات تازه. شسته‌شده و بدون نمک.
دانه‌ی مخلوط / ارزن	مقدار محدود	به‌عنوان بخش کوچکی از رژیم و ابزار پاداش در آموزش؛ خوشه‌ی ارزن «تشویقی» است نه غذای اصلی.
میوه	گاهی، مقدار کم	سیب (بدون هسته)، گلابی، انواع توت، پرتقال؛ میوه قند زیادی دارد.
مکمل‌های معدنی	در دسترس	استخوان ماهی مرکب (کاتل‌بون) و بلوک معدنی، به‌خصوص در رژیم‌های دانه‌محور. نیاز به ید را با دامپزشک بررسی کنید.

هرگز ندهید

آووکادو (بسیار سمی برای پرندگان) · شکلات، قهوه، چای، نوشابه‌ی کافئین‌دار و الکل · غذاهای شور، سرخ‌کرده، چرب و شیرینی · پیاز و سیر · هسته‌ی سیب، هلو، زردآلو و گیلاس · غذای کپک‌زده یا دانه‌ی مانده و نم‌کشیده

چطور رژیم را عوض کنیم؟

پلت را کنار دانه‌ی همیشگی بگذارید و طی چند هفته کم‌کم سهم دانه را کم کنید؛ هم‌زمان سبزی را هر روز در ساعتی ثابت (صبح که گرسنه‌تر است) ارائه دهید. **هر روز وزن را با ترازوی گرمی چک کنید**؛ کاهش وزن بیش از حدود ۱۰٪ یعنی سرعت تغییر زیاد است. مرغ عشق را هرگز «گرسنه نگه ندارید تا مجبور به خوردن شود». جزئیات در **مبانی تغذیه‌ی طوطی‌سانان**.

شن (گریت): طوطی‌سانان دانه را پوست می‌کنند و معمولاً به شن نیاز ندارند؛ مصرف زیاد آن حتی می‌تواند انسداد گوارشی بدهد. آب: هر روز تعویض شود؛ افزودن ویتامین به آب را بدون نظر دامپزشک انجام ندهید.

۵ برنامه‌ی مراقبت: روزانه، هفتگی، ماهانه

هر روز

- ☐ تعویض آب و شستن ظرف آب
- ☐ غذای تازه؛ برداشتن سبزی و میوه‌ی مانده بعد از چند ساعت
- ☐ وزن‌کشی با ترازوی گرمی و ثبت در دفترچه
- ☐ شست‌وشوی ظرف‌ها با آب داغ و صابون، آب‌کشی کامل
- ☐ فوت‌کردن پوسته‌ها (ظرف «پر» از پوسته ممکن است خالی باشد!)
- ☐ تمیزکردن سیخ‌ها و کف کشویی
- ☐ چرخش اسباب‌بازی‌ها
- ☐ نگاه به فضله‌ها: تعداد، رنگ، شکل
- ☐ بررسی ناخن، منقار، پاها و پره‌های اطراف مقعد
- ☐ چک رفتار: اشتها، صدا، پف‌کردن، تنفس
- ☐ حمام آب (چند بار در هفته)
- ☐ تعویض کاغذ کف قفس

هر ماه / سالانه

- ☐ ۱۰ تا ۱۲ ساعت تاریکی شبانه
- ☐ شست‌وشو و ضدعفونی کامل قفس با مواد بی‌خطر و آب‌کشی
- ☐ زمان پرواز و تعامل
- ☐ بررسی زنگ‌زدگی میله‌ها، سیخ و اسباب‌بازی‌های فرسوده
- ☐ معاینه‌ی سالانه نزد دامپزشک پرندگان

چرا وزن‌کشی هفتگی این‌قدر مهم است؟

پرندگان بیماری را غریزی پنهان می‌کنند؛ وقتی مرغ عشق «ظاهراً» مریض می‌شود، اغلب بیماری روزها پیش شروع شده. کاهش وزن در ترازو معمولاً زودتر از هر نشانه‌ی ظاهری دیده می‌شود. ترازوی آشپزخانه‌ی دیجیتال با دقت ۱ گرم کافی است.

۶ رفتار، دست‌آموزی و هندلینگ

مرغ عشق‌ها کنجکاو، اجتماعی و بسیار حساس به حرکات ناگهانی‌اند. دست‌آموزی بر پایه‌ی **اعتماد** است، نه زور.

- **روزهای اول:** فقط کنار قفس بنشینید و آرام حرف بزنید. بعد دست بی‌حرکت را با یک تکه ارزن نزدیک و سپس داخل قفس نگه دارید؛ گرفتن آرام غذا از دست یعنی یک گام جلو رفته‌اید.
- **«بالا بیا» (Step-up):** انگشت را به‌صورت افقی، کمی بالاتر از سیخ، جلوی سینه‌ی پرنده بگیرید و بگویید «بالا». هر بار که بالا آمد، پاداش بدهید.
- **جلسه‌های کوتاه:** ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، چند بار در روز، بهتر از یک جلسه‌ی طولانی است. با اولین نشانه‌ی ترس (پره‌های چسبیده به بدن، فرار، نفس‌نفس زدن) متوقف شوید.
- **گرفتن پرنده:** هرگز قفسه‌ی سینه را فشار ندهید – پرنده دیافراگم ندارد و برای تنفس به حرکت آزاد سینه نیاز دارد. در صورت لزوم با حوله‌ی سبک بگیرید.

- **صحبت کردن:** نرها معمولاً بیشتر یاد می‌گیرند؛ تکرار کلمات کوتاه با لحن ثابت بهترین روش است. اما هر مرغ عشقی حرف نمی‌زند و این معیار «خوب بودن» پرنده نیست.

رفتارهای طبیعی که نگران‌کننده نیستند

پف کردن کوتاه و بعد مرتب کردن پرها، ساییدن منقار پیش از خواب، کش و قوس بال و پا و جوییدن. اما برگرداندن مکرر غذا به آینه نشانه‌ی تحریک هورمونی است؛ آینه را بردارید. ترس شبانه و بال‌زدن ناگهانی در تاریکی را در **ترس شبانه در مرغ عشق و عروس هلندی** بخوانید.

تشخیص جنسیت: در اغلب مرغ عشق‌های بالغ با رنگ‌بندی معمولی، سره (پوست بالای منقار) در نر آبی و در ماده قهوه‌ای یا کرم‌رنگ است؛ اما در جوجه‌ها و برخی جهش‌های رنگی (مثل لوتینو و آلبینو) قابل‌اعتماد نیست. جزئیات در **تشخیص جنسیت پرندگان**.

۷ مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

جدول زیر برای آشنایی است، نه تشخیص؛ نشانه‌ها اغلب مشترک‌اند و تشخیص قطعی و درمان با دامپزشک پرندگان است.

مشکل	نشانه‌هایی که ممکن است ببینید	نکته
چاقی و کبد چرب	شکم برآمده، چربی زیر پوست، کم‌تحركی، رشد بیش از حد منقار یا ناخن	معمولاً از رژیم پردهانه و تحرک کم. بیشتر بخوانید
گواتر (بزرگی تیروئید)	تغییر صدا، صدای خس‌خس یا «تیک‌تیک» در تنفس، برگرداندن غذا	در مرغ عشق شایع‌تر از بسیاری گونه‌ها؛ مرتبط با کمبود ید
جرب صورت و پا (کنمیدوکوپتس)	پوسته‌ی سفید، اسفنجی و لانه‌زنبوری روی سره، گوشه‌ی منقار، اطراف چشم یا پاها؛ تغییر شکل منقار	درمان‌پذیر است اما با تأخیر منقار دائماً بدشکل می‌شود. بیشتر بخوانید
تومور کلیه یا گناد	لنگش یا فلجی یک پا (به‌خصوص پای چپ)، بزرگی شکم، کاهش وزن؛ در نر گاهی قهوه‌ای‌شدن سره	در مرغ عشق‌های میان‌سال شایع است
لیپوما و تومورهای پوستی	توده‌ی نرم و زرد زیر پوست، اغلب روی سینه یا شکم	بیشتر در پرندگان چاق
مگابا (مخمر معده)	لاغری تدریجی با وجود اشتها، دانه‌ی هضم‌نشده در فضله، برگرداندن غذا	با آزمایش فضله قابل‌تشخیص است
بیماری‌های تنفسی	تکان‌خوردن دم با هر نفس، تنفس با دهان باز، ترشح بینی، عطسه‌ی مکرر، صدای تنفس	نشانه‌ی جدی؛ دود و بخارات هم نقش دارند
تخم‌گذاری مزمن / گیرکردن تخم	ماده‌ای که کف قفس نشسته، زور می‌زند، دمش پایین می‌افتد یا شکمش متورم است	اورژانس. گیرکردن تخم
بیماری‌های ویروسی پر	ریزش یا شکستگی پرهای پرواز و دم در جوجه‌ها (پرنده‌ای که نمی‌پرد و «دونده» است)، پرهای بدشکل	ویروسی و مسری است؛ قرنطینه و آزمایش مهم است
نقرس و مشکلات کلیه	تورم سفید یا زرد مفاصل پا، اکراه از نشستن روی سیخ، پرنشوی	در مرغ عشق نسبتاً شایع گزارش شده
کلامیدیوز (پسیتاکوز)	بی‌حالی، ترشح چشم و بینی، فضله‌ی سبز روشن آبکی؛ برخی پرندگان حامل بی‌علامت‌اند	قابل انتقال به انسان – پایین را ببینید

نشانه‌های کلی «پرنده‌ی بیمار»

پف کردن طولانی در روز، خواب زیاد روی دو پا، چشم نیمه‌بسته، کاهش صدا و اشتها، نشستن کف قفس، تغییر فضله، کثیفی اطراف مقعد و تکان خوردن دم با تنفس. فهرست کامل در **نشانه‌های بیماری در حیوانات اگزوتیک**.

بهداشت و بیماری‌های مشترک انسان و پرنده

کلامیدوز (پسیتاکوز) از گرد فضله‌ی خشک و پر به انسان منتقل می‌شود و می‌تواند بیماری شبیه آنفلوانزا یا ذات‌الریه بدهد. قفس را مرطوب تمیز کنید (نه جاروی خشک)، بعد از آن دست‌ها را بشویید؛ افراد باردار، سالمند یا با نقص ایمنی احتیاط بیشتری کنند. اگر تب و علائم تنفسی گرفتید، به پزشک بگویید پرنده دارید. بیشتر بخوانید: **پسیتاکوز و بیماری‌های مشترک**.

۸ چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

پرنده‌ای ۳۵ گرمی با متابولیسم سریع ذخیره‌ی انرژی کمی دارد و «فردا صبح ببینیم» گاهی خیلی دیر است. در این موارد **همان روز اقدام کنید**:

اورژانس – معطل نکنید

- تنفس با دهان باز یا تکان شدید دم با هر نفس
- نشستن پف‌کرده کف قفس یا ناتوانی در نشستن روی سیخ
- خونریزی (از جمله شکستن **پر خون‌دار**، ناخن یا منقار)
- نخوردن غذا یا فضله‌ی بسیار کم برای بیش از چند ساعت تا یک روز
- ماده‌ای که زور می‌زند و تخم نمی‌گذارد
- تشنج، افتادن، سر کج یا عدم تعادل
- فضله‌ی خونی یا سیاه و قیری
- استفراغ یا برگرداندن غذای مکرر
- تماس با گربه – حتی بدون زخم دیدنی (**چرا؟**)
- تماس با دود، بخار تفلون، سم یا جویدن فلز/رنگ؛ سوختگی یا ضربه

تا رسیدن به **دامپزشک**: پرنده را در قفس کوچک، گرم (نه داغ)، نیمه‌تاریک و آرام با ظرف آب کم‌عمق نگه دارید و نمونه‌ی تازه‌ی فضله را همراه ببرید. به هیچ‌وجه دارو، روغن، الکل یا داروی انسانی خودسرانه ندهید. برای پرنده‌ی بیمار در خانه، **مراقبت حمایتی و جعبه‌ی کمک‌های اولیه** را از قبل آماده داشته باشید، و پیش از روز بحران، **یک دامپزشک اگزوتیک خوب** پیدا کنید.

۹ چک‌لیست خرید و انتخاب پرنده‌ی سالم

خود پرنده

محل خرید و شرایط

- | | |
|---|---|
| ☐ هوشیار و فعال؛ وسط روز پف‌کرده و خواب‌آلود نیست | ☐ قفس‌ها تمیز و کم‌جمعیت، با آب و غذای تازه |
| ☐ چشم‌ها روشن، گرد و بدون ترشح یا تورم | ☐ پرنده‌ی دیگری در همان قفس بیمار یا مرده دیده نمی‌شود |
| ☐ سوراخ‌های بینی تمیز و قرینه؛ سره بدون پوسته‌ی سفید | ☐ جوجه کاملاً مستقل غذا می‌خورد |
| ☐ منقار صاف و هم‌تراز، بدون رشد اضافه یا ترک | ☐ تجهیزات و قفس پیش از آوردن پرنده آماده است |

- ☐ برنامه‌ی **قرنطینه** (حداقل ۳۰ روز جدا از پرنده‌های دیگر) دارید
- ☐ معاینه‌ی اولیه نزد دامپزشک در هفته‌ی اول برنامه‌ریزی شده است

سرنخ سن

در رنگ‌بندی معمولی، جوان‌ها (تا حدود ۳-۴ ماهگی) خط‌های موج‌دار تا روی پیشانی و چشم کاملاً تیره دارند؛ بعد از اولین پرریزی حلقه‌ی روشن دور مردمک ظاهر می‌شود. در جهش‌های رنگی ملاک دقیق نیست.

- ☐ پرها صاف، کامل و براق؛ همه‌ی پرهای پرواز و دم سالم‌اند
- ☐ اطراف مقعد تمیز و خشک
- ☐ تنفس آرام و بی‌صدا؛ دم با نفس تکان نمی‌خورد
- ☐ هر دو پا را به‌خوبی استفاده می‌کند؛ ناخن‌ها و انگشتان کامل
- ☐ فضله‌های داخل قفس طبیعی (بخش سبز/تیره، سفید و مایع شفاف)

۱۰ پرسش‌های متداول

♦ مرغ عشق تنها می‌تواند خوشحال باشد؟

ممکن است، به شرطی که شما «دسته‌ی» او باشید: چند ساعت تعامل روزانه و قفس در اتاق پررفت‌وآمد. اگر بیشتر روز بیرون از خانه‌اید، دو مرغ عشق منصفانه‌تر است.

♦ می‌توانم مرغ عشق را با برزیلی (لاوبرد) یا عروس هلندی در یک قفس نگه دارم؟

توصیه نمی‌شود. برزیلی‌ها می‌توانند بسیار پرخاشگر باشند و به پا و انگشتان مرغ عشق آسیب جدی بزنند. عروس هلندی درشت‌تر است؛ پرواز مشترک تحت نظارت شاید، قفس مشترک نه. هر پرنده‌ی تازه ابتدا قرنطینه شود.

♦ ناخن و منقار را خودم کوتاه کنم؟

با سیخ‌های طبیعی و اسباب‌بازی جویذنی معمولاً لازم نمی‌شود. منقاری که بیش از حد رشد می‌کند اغلب نشانه‌ی مشکلی زمینه‌ای (کبد، جرب، تغذیه) است و باید معاینه شود؛ کوتاه‌کردن ناخن بدون آموزش ممکن است به خونریزی برسد.

♦ از کجا بفهمم رژیمش کافی است؟

وزن ثابت، پرهای براق، منقار و ناخن با رشد عادی و فضله‌ی طبیعی نشانه‌های خوبی‌اند؛ معاینه‌ی سالانه تصویر دقیق‌تری می‌دهد.

۱۱ هشدار پایانی

این راهنما برای آموزش صاحبان پرنده است و جایگزین معاینه و تشخیص دامپزشک نیست. اعداد ذکرشده محدوده‌های رایج‌اند و بسته به نژاد، سن و شرایط هر پرنده فرق می‌کنند. بدون معاینه‌ی دامپزشک پرندگان هیچ دارویی به پرنده ندهید. مطالعه‌ی بیشتر: **مرغ عشق: بهترین پرنده‌ی زینتی برای شروع** در سایت.