

راهنمای کاربردی نگهداری خزندگان

راهنمای نگهداری مار کینگ و میلک

کینگ اسنیک و میلک اسنیک (جنس Lampropeltis): مارهایی بی‌زهر، رنگارنگ و پراشتها که برای مبتدی هم مناسب‌اند؛ به یک شرط مهم: هر مار، محفظه‌ی جداگانه‌ی خودش را می‌خواهد.

Photo: Riley Stanton, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

۱. کارت اطلاعات سریع

نام فارسی و علمی	مار کینگ (کینگ اسنیک) و مار میلک (میلک اسنیک) — جنس *Lampropeltis*؛ رایج‌ترین در اسارت: کینگ اسنیک کالیفرنیایی *L. californiae* و انواع میلک اسنیک (مثل هندوراسی، پوئبلا و سینالوآ)
زیستگاه طبیعی	آمریکای شمالی تا شمال آمریکای جنوبی؛ از بیابان و بوته‌زار تا جنگل، بیشتر روی زمین و زیر پناه
طول عمر	معمولاً ۱۵ تا ۲۰ سال با مراقبت خوب؛ برخی بیشتر هم عمر می‌کنند
اندازه‌ی بالغ	بسته به گونه حدود ۶۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر؛ بیشتر مارهای خانگی ۹۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر
سطح دشواری	مبتدی؛ به شرط محفظه‌ی ضدفرار، کنترل دما و نگهداری **کاملاً تکی**
رژیم	گوشت‌خوار؛ موش کامل یخ‌زدایی‌شده، هر ۵ تا ۱۴ روز بسته به سن
دما	نقطه‌ی گرم ۲۹ تا ۳۱، سمت خنک ۲۴ تا ۲۶، شب بالای حدود ۲۰ درجه
رطوبت	حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد (میلک‌های مناطق گرمسیری کمی بیشتر)، به‌همراه باکس مرطوب
نور	چرخه‌ی ۱۲ ساعته‌ی روز و شب؛ UVB ضروری نیست، ولی ملایمش می‌تواند مفید باشد
اجتماعی یا تنها	**کاملاً تنهازی**؛ این مارها مارهای دیگر، حتی هم‌نوع خود، را می‌خورند

۲. مناسب چه کسی است؟ آیا انتخاب درستی است؟

نام «کینگ» از رفتار طبیعی این مار می‌آید: در طبیعت مارهای دیگر، حتی گونه‌های سمی، بخشی از غذای آن‌هاست. همین ویژگی، مهم‌ترین قانون نگهداری‌شان را می‌سازد. میلک اسنیک هم از همین جنس است و رنگ‌بندی حلقه‌ای قرمز، سیاه و زرد یا سفیدش تقلیدی دفاعی از مارهای مرجانی سمی است؛ خودش کاملاً بی‌زهر است. هر دو مقاوم، خوش‌اشتها و فعال‌اند و انتخاب خوبی برای اولین مار به‌حساب می‌آیند.

انتخاب خوبی است اگر...

- ماری فعال و پرجنب‌وجوش می‌خواهید که تماشایش جذاب باشد.
- فقط یک مار نگه می‌دارید، یا برای هر مار محفظه‌ی جدا دارید.
- با نگهداری موش منجمد در فریزر مشکلی ندارید.
- حاضرید دما را با ترموستات کنترل کنید و قفل را جدی بگیرید.
- برای ۱۵ تا ۲۰ سال برنامه دارید.

بهتر است صبر کنید اگر...

- می‌خواهید چند مار را در یک محفظه نگه دارید.
- حیوانی آرام و کم‌تحرک برای در آغوش گرفتن می‌خواهید؛ نوزادها اغلب عصبی و فرز هستند.
- مراقب اصلی کودک است و بزرگسال مسئولی بالای سرش نیست.
- دامپزشک آشنا با خزندگان در دسترس ندارید.

نکته‌ی قانونی و اخلاقی: این مارها بومی ایران نیستند. پیش از خرید، مقررات روز را از مراجع رسمی مانند سازمان حفاظت محیط زیست بپرسید، مدارک منشأ حیوان را بخواهید و مار پرورش‌یافته در اسارت را به صید طبیعت ترجیح دهید. **هرگز مار خانگی را در طبیعت رها نکنید**؛ هم ممکن است بیماری را به حیات‌وحش منتقل کند و هم گونه‌ی مهاجم بسازد.

رنگ زیبا، معیار بی‌خطری نیست: شباهت میلک اسنیک به مارهای سمی، قاعده‌ای برای تشخیص مار در طبیعت نمی‌دهد. ایران مارهای سمی بومی متعددی دارد؛ هیچ مار وحشی را به گمان «بی‌خطر بودن» برندارید و صید مارهای بومی را به‌کلی کنار بگذارید.

۳. محل نگهداری و تجهیزات

اندازه و نوع محفظه

مرحله	طول × عرض × ارتفاع	نکته
نوزاد	حدود ۴۵ × ۳۰ × ۳۰ سانتی‌متر	با پناهگاه و پوشش پر کنید؛ نوزاد در فضای خالی و باز ناامن و عصبی می‌شود
نوجوان	حدود ۷۵ × ۴۵ × ۴۵ سانتی‌متر	طول محفظه کمتر از طول مار نباشد
بالغ	حداقل ۹۰×۴۵×۴۵؛ بهتر ۱۲۰×۶۰×۶۰	برای گونه‌های بزرگ‌تر از ۱۲۰ سانتی‌متر، محفظه‌ی بزرگ‌تر؛ این مارها از فضا واقعاً استفاده می‌کنند

قانون شماره‌ی یک: یک مار، یک محفظه. کینگ و میلک اسنیک به‌طور طبیعی مار می‌خورند و حمله به هم‌قفس، حتی هم‌گونه و هم‌اندازه، بارها گزارش شده و می‌تواند به مرگ یکی منجر شود. «سال‌ها با هم بودند و مشکلی نبود» تضمینی برای فردا نیست. حتی هنگام تمیزکاری، دو مار را موقتاً در یک ظرف نگذارید.

استاد فرار: کینگ اسنیک‌ها قوی و کنجکاوند و درِ بی‌قفل را با پوزه هل می‌دهند. قفل واقعی بگذارید، سوراخ کابل‌ها را ببندید و بعد از هر بار تمیزکاری بسته‌بودن در را امتحان کنید. مار فراری در خانه‌ای که مار دیگری هم دارد، خطر جدی برای آن مار است.

دما و گرما

دمای **سطحی که مار رویش می‌خوابد** را با دماسنج پروب‌دار یا لیزری بسنجید. مار خون‌سرد برای هضم و ایمنی به گرادیان دما وابسته است و خودش بین سمت گرم و خنک جابه‌جا می‌شود. مار سرد طعمه را رد می‌کند یا پس می‌دهد و دمای بالای حدود ۳۵ درجه هم خطرناک است. منبع گرما (تشک گرمایی، پنل تابشی، لامپ سرامیکی یا

لامپ حرارتی مناسب) را **حتماً به ترموستات** وصل کنید و جلوی لامپ و المنت حفاظ بگذارید. سنگ گرمایی علت کلاسیک سوختگی است. برای گرمای تابستان و قطعی برق هم از پیش برنامه داشته باشید.

رطوبت و بستر

- **رطوبت هدف ۴۰ تا ۶۰ درصد** است. کینگ اسنیک‌های مناطق خشک به رطوبت بالای پیوسته نیاز ندارند؛ میلک اسنیک‌های گرمسیری (مثل هندوراسی) کمی رطوبت بیشتر را بهتر تحمل می‌کنند. بستر همیشه‌خیس، در هر دو، به بیماری پوست می‌انجامد.
- **باکس مرطوب:** پناهگاهی با خزه‌ی نم‌دار، به‌ویژه نزدیک پوست‌اندازی، برای پوست‌اندازی یک‌تکه بسیار کمک می‌کند. خزه را مرتب عوض کنید.
- **بستر مناسب:** پوشال آسپن، کوکوپیت یا مالچ مناسب خزندگان، چند سانتی‌متر عمق؛ هر دو گونه کندن و پنهان‌شدن زیر بستر را دوست دارند. در قرنطینه دستمال کاغذی بهتر است. از پوشال کاج و سدر و بستر کپک‌زده بپرهیزید.

پناهگاه، چیدمان و نور

دست‌کم دو پناهگاه تنگ، یکی در سمت گرم و یکی در سمت خنک، بگذارید تا مار مجبور نباشد میان امنیت و دمای درست یکی را انتخاب کند. شاخه، تکه‌چوب‌پنبه و برگ مصنوعی پوشش و سرگرمی می‌دهند و یک سطح زبر به شروع پوست‌اندازی کمک می‌کند. ظرف آب سنگین و به اندازه‌ای باشد که مار بتواند در آن خیس بخورد. چرخه‌ی ثابت حدود ۱۲ ساعته‌ی روز و شب برقرار کنید و از نور شبانه بپرهیزید؛ UVB ملایم اختیاری است و اگر نصب می‌کنید، پناهگاه سایه‌دار و فاصله‌ی درست طبق دستور سازنده ضروری است.

۴. تغذیه

مرحله (وزن تقریبی مار)	نوع طعمه‌ی تقریبی	فاصله‌ی وعده‌ها
نوزاد (زیر ۲۰ گرم)	پینکی کوچک (موش نوزاد بی‌مو)	هر ۵ تا ۷ روز
نوجوان (۲۰ تا ۱۰۰ گرم)	پینکی بزرگ تا موش کرک‌دار	هر ۷ روز
نیمه‌بالغ (۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم)	موش جوان	هر ۷ تا ۱۰ روز
بالغ (بیش از ۳۰۰ گرم)	موش بالغ، متناسب با بدن	هر ۱۰ تا ۱۴ روز

- **اندازه‌ی طعمه:** پهنای طعمه تقریباً برابر یا کمی بیشتر از پهن‌ترین بخش بدن مار باشد. طعمه‌ی خیلی بزرگ خطر برگرداندن غذا را بالا می‌برد.
- **آماده‌سازی:** طعمه را در یخچال یا در کیسه‌ی دربسته داخل آب ولرم کامل یخ‌زدایی کنید و تا نزدیک دمای بدن گرم کنید. مرکز طعمه نباید سرد بماند. مایکروویو نه، و طعمه‌ی یخ‌زدایی‌شده را دوباره فریز نکنید.
- **ارائه با انبر بلند:** پاسخ تغذیه‌ای این مارها بسیار قوی است و ممکن است دست بوی‌موش‌گرفته را با غذا اشتباه بگیرند. هرگز طعمه را با دست ندهید و بعد از دست‌زدن به طعمه، پیش از برداشتن مار دست‌ها را بشویید. طعمه را روی کاشی یا ظرف تخت بگذارید تا بستر بلعیده نشود.
- **بعد از غذا:** ۴۸ تا ۷۲ ساعت مار را برندارید؛ دست‌کاری زودهنگام از علت‌های شایع برگرداندن غذاست.

- **مکمل و آب:** طعمه‌ی کامل و سالم معمولاً تمام نیازها را تأمین می‌کند و مکمل روتین لازم نیست. آب تمیز همیشه در دسترس باشد و هر روز یا هنگام آلودگی عوض شود.

چه ندهیم؟

- مار یا مارمولک صیدشده از طبیعت، حتی اگر «غذای طبیعی» این جنس باشد: خطر انگل و بیماری.
- طعمه‌ی زنده‌ی بدون نظارت: موش می‌تواند زخم عمیق ایجاد کند.
- جونده‌ی صیدشده از شهر یا طبیعت: خطر سم و انگل.
- تکه‌گوشت، جگر یا غذای انسان؛ طعمه‌ی فاسد یا چندبار یخ‌زده.
- وعده‌های پشت‌سرهم برای «زودتر بزرگ‌شدن».

وضعیت بدن سالم

- مقطع بدن شبیه نان قالبی با قوس ملایم، نه مثلث تیز و نه گرد کامل.
- ستون مهره‌ها برجسته نیست.
- چین چربی پشت سر و دور دم دیده نمی‌شود.
- این مارها همیشه گرسنه به نظر می‌رسند؛ «التماس غذا» نشانه‌ی کم‌غذایی نیست. چاقی در بالغ‌ها شایع است.

کاهش اشتها در زمستان: اگر مار پراشتهایی ناگهان طعمه را رد کرد، نخست دما را بسنجید؛ در خانه‌ی سرد ممکن است رفتاری شبیه برومیشن (رکود زمستانی) دیده شود. مار خانگی برای سلامت به برومیشن نیاز ندارد و سردکردن عمدی فقط برای مار سالم و با نظر دامپزشک انجام می‌شود. وزن را ثبت کنید و هرگز در خانه به زور غذا ندهید.

۵. برنامه‌ی مراقبت: چک‌لیست

روزانه

- ☐ دمای نقطه‌ی گرم و سمت خنک و رطوبت را بخوانید؛ کارکرد ترموستات را بررسی کنید.
- ☐ آب را ببینید و در صورت کثیفی عوض کنید.
- ☐ مدفوع، اورات و پوست کنده‌شده را جمع کنید؛ بسته‌بودن قفل را نگاه کنید.

هفتگی

- ☐ ظرف آب را بشویید و ضدعفونی کنید.
- ☐ تاریخ وعده، قبول یا رد طعمه و پوست‌اندازی را بنویسید؛ مار جوان را وزن کنید.
- ☐ بستر، پناهگاه و باکس مرطوب را از نظر کپک و بو بررسی کنید.
- ☐ ظرف آب و پوست مار را از نظر نقطه‌های ریز متحرک (کنه) نگاه کنید.

ماهانه و سالانه

- ☐ ماهانه: مار بالغ را وزن کنید و بستر را در صورت نیاز عوض کنید.
- ☐ ماهانه: اتصالات برق، حفاظ لامپ و قفل‌ها را بررسی کنید.
- ☐ هر چند ماه: دماسنج‌ها را با هم مقایسه کنید و محفظه را کامل تمیز و ضدعفونی کنید.
- ☐ سالانه: معاینه‌ی دامپزشک خزندگان و آزمایش مدفوع طبق نظر او.

بهداشت: خزندگان می‌توانند بدون علامت سالمونلا حمل کنند و طعمه‌ی منجمد هم می‌تواند آلوده باشد. پیش و بعد از دست‌زدن به مار، طعمه، بستر یا ظرف‌ها دست‌ها را با آب و صابون بشویید. طعمه را جدا از غذای خانواده نگه دارید و ظرف‌های مار را در سینک آشپزخانه نشویید. کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار و افراد دارای نقص ایمنی باید به‌ویژه مراقب باشند. اگر چند مار دارید، برای هر محفظه ابزار جدا داشته باشید یا بین آن‌ها دست‌ها را بشویید.

۶. رفتار و دست‌آموزی

رفتار	معنای احتمالی
لرزاندن سریع نوک دم	هشدار دفاعی رایج، به‌ویژه در نوزادان؛ مار ترسیده است، سرعت خود را کم کنید
دفع بوی تند (مَسک) یا مدفوع هنگام برداشتن	واکنش دفاعی بسیار رایج در این جنس؛ معمولاً با عادت‌کردن کمتر می‌شود
حرکت سریع و «فرار» در دست (به‌ویژه میلک‌های جوان)	عصبی‌بودن طبیعی نوزادان؛ جلسه را کوتاه کنید، نزدیک سطح کار کنید
ضربه‌ی سریع با دهان باز و گازگرفتن و جویدن	اغلب پاسخ تغذیه‌ای، نه پرخاشگری؛ دست‌ها بوی طعمه می‌دهند یا مار گرسنه است
گشت‌زنی زیاد و بالا رفتن از شیشه	کاوش طبیعی، گرسنگی، فصل جفت‌گیری، یا کمبود فضا، پناهگاه یا گرادیان دما
چشم آبی و پوست مات	آماده‌شدن برای پوست‌اندازی؛ کمتر دست بزنید و افت موقت اشتها طبیعی است

عادت‌دادن و هندلینگ درست

- مار تازه‌وارد را **حدود یک هفته** به حال خود بگذارید و فقط برای مراقبت ضروری سراغش بروید. دست‌کاری را بعد از چند وعده‌ی موفق شروع کنید.
- برای اینکه مار «دست» را با «غذا» یکی نداند، پیش از برداشتن با یک قلاب مار یا وسیله‌ی بی‌بو آرام لمسش کنید؛ این علامت می‌دهد که حالا وقت غذا نیست.
- جلسه‌ها را حدود ۵ تا ۱۵ دقیقه و چند بار در هفته نگه دارید؛ بعد از غذا و هنگام پوست‌اندازی دست نزنید. مار را از وسط بدن بردارید، وزنش را در دو نقطه حمایت کنید و از بالای سر و ناگهانی سراغش نروید.
- این مارها معمولاً نمی‌خواهند ساکن بمانند و «از دستی به دست دیگر» حرکت می‌کنند؛ بگذارید از میان دست‌هایتان عبور کند و محکم نگیرید.

اگر گاز گرفت: مار بی‌زهر است و زخم معمولاً سطحی است، ولی کینگ اسنیک ممکن است در پاسخ تغذیه‌ای محکم نگه دارد و بجود. دست را نکشید، چون دندان‌های رو به عقب پوست را پاره می‌کنند و به دهان مار آسیب می‌زنند. مار را آرام پایین بیاورید و صبر کنید تا رها کند. زخم را با آب و صابون بشویید و اگر عمیق شد یا نشانه‌ی عفونت دیدید، به پزشک مراجعه کنید.

۷. مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

مشکل	نشانه‌ها	علت یا زمینه‌ی رایج

آسیب از هم‌قفس	زخم و گازگرفتگی، ناپدیدشدن مار کوچک‌تر، مار بلعیده‌شده‌ی نیمه‌کاره	نگهداری مشترک؛ کاملاً قابل‌پیشگیری
برگرداندن غذا	طعمه‌ی نیمه‌هضم چند ساعت تا چند روز بعد از تغذیه	دست‌کاری زودهنگام، سرما، طعمه‌ی بزرگ یا بیماری؛ هیچ‌وقت «عادی» نیست
کریپتوسپوریدیوز	برگرداندن غذا چند روز بعد از تغذیه، تورم سفت میانه‌ی بدن، کاهش وزن تدریجی	انگل تک‌یاخته‌ای مسری در مارهای کلوبرید؛ قرنطینه کلید پیشگیری است
عفونت تنفسی	خس‌خس، دهان باز، حباب یا مخاط در دهان و بینی، بالا نگه‌داشتن سر	دمای پایین، رطوبت نامتعادل، استرس یا عامل عفونی
التهاب دهان (استوماتیت)	قرمزی یا لکه در لثه، بزاق غلیظ، بی‌اشتهایی، ورم پوزه	سرکوب ایمنی، محیط نادرست یا آسیب دهانی
پوست‌اندازی ناقص	پوست تکه‌تکه، باقی‌ماندن پوشش چشم، حلقه‌ی پوست روی نوک دم	رطوبت پایین، نبود سطح زبر یا باکس مرطوب، بیماری زمینه‌ای
کنه‌ی مار	نقطه‌های ریز متحرک، کنه‌ی مرده در ظرف آب، خیس‌خوردن طولانی، بی‌قراری	تماس با مار یا لوازم آلوده؛ مسری و نیازمند درمان کل محیط
بیماری تاول و عفونت پوستی	تاول، لکه‌های قرمز یا تیره روی فلس‌های شکمی، زخم	بستر همیشه‌خیس، کثیف یا بدون تهویه
سوختگی حرارتی	لکه‌ی قرمز یا قهوه‌ای، تاول و پوسته‌ی زخمی	منبع گرمای بدون ترموستات یا بدون حفاظ
انگل‌های داخلی	کاهش وزن، مدفوع بدبو یا آبکی، برگرداندن غذا	مار صید طبیعت یا طعمه‌ی نامطمئن؛ آزمایش مدفوع لازم است
چاقی	بدن گرد، چین‌های چربی، بی‌تحرکی	وعده‌های زیاد در گونه‌ای که همیشه گرسنه به نظر می‌رسد
زخم طعمه و بلعیدن بستر	زخم عمیق روی سر و چشم؛ بی‌اشتهایی یا یبوست بعد از بلعیدن بستر	رها کردن موش زنده در محفظه؛ حمله‌ی پرشتاب به طعمه روی بستر ریز
مشکلات تخم‌گذاری	تورم انتهای بدن، زور زدن، تخم‌گذاری ناتمام	در ماده‌های بالغ، حتی گاهی بدون جفت‌گیری اخیر
نشانه‌های عصبی	لرزش سر، پیچ‌خوردن بدن، ناتوانی در برگشتن به حالت عادی	عفونت ویروسی، مسمومیت یا گرمازدگی؛ تشخیص با دامپزشک است

۸. چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

مراجعه‌ی فوری:

- هر گازگرفتگی یا زخم ناشی از مار دیگر، حتی اگر کوچک به نظر برسد.
- تنفس با دهان باز، خس‌خس شدید یا مخاط فراوان در دهان.
- لرزش، پیچ‌خوردن بدن، از دست رفتن تعادل یا ناتوانی در برگشتن به حالت عادی.
- زخم عمیق، خونریزی، سوختگی شدید یا آسیب چشم.
- بیرون‌زدگی بافت از مقعد، یا زور زدن طولانی.
- حلقه‌ی پوست روی نوک دم که رنگ بافت را تغییر داده است.
- تورم ناگهانی بدن، برگرداندن تکراری غذا، بی‌حالی شدید یا بدن کاملاً شل.
- افت وزن حدود ۱۰ درصد یا بیشتر، دیده‌شدن ستون مهره‌ها، یا مار جوانی که چند هفته غذا نخورده است.

تا رسیدن به دامپزشک: اگر مار غذا را برگرداند، تا صحبت با دامپزشک دوباره طعمه ندهید. مار را در جعبه‌ی امن، کوچک و تهویه‌دار که از سرمای مسیر محافظت می‌شود قرار دهید. او را داغ نکنید، به زور غذا و آب ندهید و هیچ داروی خانگی یا انسانی به‌کار نبرید. یادداشت دما و رطوبت، تاریخ وعده‌ها، وزن‌ها، نمونه‌ی تازه‌ی مدفوع و عکس محفظه را همراه ببرید.

۹. چک‌لیست خرید و انتخاب مار سالم

- ☐ محفظه را پیش از خرید راه بیندازید و چند روز دما و رطوبت را بسنجید.
- ☐ مار پرورش‌یافته در اسارت را ترجیح دهید و گونه‌ی دقیق، منشأ و تاریخ تولد را بپرسید؛ اندازه‌ی بالغ بین گونه‌ها خیلی فرق می‌کند.
- ☐ بپرسید مار تکی نگهداری شده است یا نه، و زخم یا جای گازگرفتگی روی بدنش هست یا نه.
- ☐ سابقه‌ی تغذیه را بخواهید: آخرین وعده، و اینکه طعمه‌ی منجمد را خودش می‌خورد یا نه. چند وعده‌ی موفق پیاپی نشانه‌ی خوبی است.
- ☐ بدن پر و بدون برآمدگی غیرعادی و ستون مهره‌ی برجسته؛ چشم روشن و تمیز (جز دوره‌ی چشم آبی)؛ تنفس بی‌صدا، دهان بدون حباب و مخاط، لثه‌ی صورتی.
- ☐ پوست بدون کنه، زخم و پوسته‌ی چسبیده؛ مقعد تمیز؛ حرکت سر و بدن بدون لرزش و پیچ‌خوردگی.
- ☐ دامپزشک را از پیش پیدا کنید؛ معاینه و آزمایش مدفوع در هفته‌ی اول. مار جدید را دور از مارهای دیگر و در اتاق جدا قرنطینه کنید: حداقل ۶۰ روز، یا طولانی‌تر طبق نظر دامپزشک.

۱۰. پرسش‌های متداول

کینگ اسنیک زهر دارد یا برای انسان خطرناک است؟

نه؛ هم کینگ و هم میلک اسنیک بی‌زهرند و طعمه را با فشردن (کنستریکشن) می‌گیرند. کودک را با مار تنها نگذارید و بهداشت را رعایت کنید.

آیا می‌توانم کینگ اسنیک را با مار کورن یا یک کینگ دیگر نگه دارم؟

نه. این جنس مارخوار است و حمله به هم‌قفس، حتی هم‌گونه، رایج است. هر مار محفظه‌ی جدا لازم دارد.

چرا مارم موقع برداشتن بوی بد می‌دهد؟

مَسک، مایعی بدبو از غدد نزدیک مقعد است و دفاعی طبیعی است، نه نشانه‌ی بیماری. با عادت‌کردن مار و هندلینگ آرام معمولاً کمتر می‌شود. دست‌ها را با آب و صابون بشویید.

میلک اسنیک جوانم خیلی عصبی است؛ آرام می‌شود؟

معمولاً بله؛ با بزرگ‌شدن و هندلینگ کوتاه و منظم آرام‌تر می‌شود، به شرط پناهگاه کافی و دست‌نزدن بعد از غذا.

هشدار پایانی: این راهنما برای آموزش نگهدارندگان تهیه شده و جایگزین معاینه و تشخیص دامپزشک نیست. اعداد، محدوده‌های عمومی‌اند و بسته به گونه و منبع متفاوت‌اند. برای هر نشانه‌ی بیماری به دامپزشک اگزوتیک آشنا با خزندگان مراجعه کنید و از هیچ دارویی بدون تجویز او استفاده نکنید.