

راهنمای نگهداری ماکائو

ماکائوی آبی‌طلایی، اسکارلت، بال‌سبز و مینی‌ماکائوها – قفس و فضا، تغذیه‌ی درست، رفتار و آموزش، بیماری‌های مهم و نشانه‌های اورژانسی

دکتر مهدیار رمزگویان · دامپزشک حیوانات اگزوتیک



عکس: CC BY-SA 4.0 مجوز، Red-and-green macaw (Ara chloropterus) – Charles J. Sharp, Wikimedia Commons

۱. کارت اطلاعات سریع

نام فارسی / علمی	ماکائو؛ گونه‌های رایج: آبی‌طلایی (<i>Ara ararauna</i>)، اسکارلت یا قرمز (<i>Ara macao</i>)، بال‌سبز یا قرمزوسبز (<i>Ara chloropterus</i>)، نظامی (<i>Ara militaris</i>)؛ مینی‌ماکائوها مثل ماکائوی هان (<i>Diopsittaca nobilis</i>) و سیور (<i>Ara severus</i>)
طول عمر	ماکائوهای بزرگ با مراقبت خوب معمولاً ۳۵ تا ۵۰ سال و گاهی بیشتر؛ مینی‌ماکائوها معمولاً ۲۰ تا ۳۰ سال. یعنی احتمالاً پرنده از صاحبش بیشتر عمر می‌کند.
اندازه‌ی بالغ	گونه‌های بزرگ حدود ۸۰ تا ۹۵ سانتی‌متر (بیش از نیمی از آن دم) و حدود ۹۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم، بسته به گونه و فرد؛ مینی‌ماکائوها حدود ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر و چندصد گرم
سطح دشواری	بسیار بالا – فضا، صدا، قدرت منقار، هزینه و تعهد زمانی؛ مناسب اولین پرنده‌ی زندگی نیست
رژیم	پلت فرموله‌شده‌ی طوطی‌های بزرگ + سبزیجات متنوع + میوه‌ی محدود + مغزها به‌اندازه (ماکائوها نسبت به بسیاری از طوطی‌ها چربی بیشتری تحمل می‌کنند، ولی «ظرف پر از مغز» نه)
دما / رطوبت	دمای معمولی خانه (حدود ۱۸ تا ۲۷ درجه) بدون کوران و تغییر ناگهانی؛ رطوبت متوسط و حمام یا اسپری آب منظم برای سلامت پر و پوست
نور و خواب	نور طبیعی روز (پنجره‌ی شیشه‌ای UVB را عبور نمی‌دهد) یا لامپ تمام‌طیف مخصوص پرنده؛ ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب تاریک و آرام
اجتماعی / تنها	به‌شدت اجتماعی؛ روزانه چند ساعت تعامل و زمان بیرون از قفس لازم دارد. تنها ماندن طولانی = فریاد، کندن پر، رفتار تخریبی
صدا	بسیار بلند، به‌خصوص صبح زود و غروب؛ برای آپارتمان حساس به صدا مناسب نیست
بلوغ جنسی	معمولاً بین ۳ تا ۶ سالگی بسته به گونه (مینی‌ماکائوها زودتر)؛ تغییرات رفتاری هورمونی از این سن شروع می‌شود
وضعیت قانونی	همه‌ی ماکائوها در فهرست CITES هستند؛ برخی گونه‌ها (مثل اسکارلت، نظامی و هیاسینت) در پیوست ۱. فقط پرنده‌ی پرورش‌یافته در اسارت با مدارک معتبر

۲. مناسب چه کسی است؟ آیا ماکائو انتخاب درستی است؟

ماکائو یکی از زیباترین و باهوش‌ترین پرندگان خانگی است، اما «یک طوطی بزرگ‌تر» نیست. هوش و نیاز اجتماعی‌اش در حد یک کودک خردسال پرانرژی است، صدایش از چند خانه آن‌طرف‌تر شنیده می‌شود و منقارش می‌تواند چوب مبل، کابل برق و قفس ضعیف را در چند دقیقه از بین ببرد. بیشتر ماکائوهایی که دست‌به‌دست می‌شوند یا به پناهگاه می‌رسند، قربانی تصمیم عجولانه‌اند – نه «بدذاتی» پرنده.

انتخاب خوبی است اگر...

بهتر است صبر کنید اگر...

- خانه‌ی مستقل یا فضای داری که صدای بلند روزانه برای همسایه‌ها مشکل نمی‌سازد.
- هر روز چند ساعت وقت برای بازی، آموزش و حضور در کنار پرنده دارید.
- جای یک قفس بسیار بزرگ (یا اتاق/پرنده‌خانه‌ی ایمن) و بودجه‌ی پلت، اسباب‌بازی مصرفی و ویزیت دامپزشک دارید.
- برای چند دهه آینده برنامه دارید، از جمله اینکه اگر شما نبودید چه کسی از او مراقبت می‌کند.
- در آپارتمان با دیوار مشترک زندگی می‌کنید یا خانه بیشتر روز خالی است.
- کودک کوچک دارید و نمی‌توانید نظارت دائمی داشته باشید.
- اولین پرنده‌ی شماست – شروع با طوطی کوچک‌تر یا مینی‌ماکائو منطقی‌تر است.
- جابه‌جایی‌های مکرر، سفرهای طولانی یا آینده‌ی نامعلوم دارید.

نکته‌ی قانونی و اخلاقی

تجارت ماکائوها تحت کنوانسیون CITES کنترل می‌شود و برخی گونه‌ها در طبیعت در معرض خطرند. پرنده‌ی صیدشده از طبیعت را نخرید: علاوه بر غیرقانونی‌بودن، استرس و بیماری‌های حمل‌ونقل قاچاق بسیار شایع است و چنین پرنده‌ای معمولاً اهلی نمی‌شود. پرنده‌ی پرورش‌یافته در اسارت را با پلاک یا میکروچیپ و مدارک معتبر مبدأ تهیه کنید و درباره‌ی مقررات فعلی از مراجع رسمی (مثل سازمان حفاظت محیط زیست) استعلام بگیرید.

۳. محل نگهداری و تجهیزات

قفس

مورد	توصیه	چرا؟
ابعاد	برای ماکائوی بزرگ حداقل حدود ۹۰ × ۱۲۰ سانتی‌متر کف و ۱۵۰ سانتی‌متر ارتفاع؛ هرچه بزرگ‌تر بهتر. پرنده‌خانه یا اتاق ایمن ایده‌آل است.	پرنده باید بدون برخورد بال‌ها را کامل باز کند و دم بلندش به میله‌ها نسابد.
میله و جنس	فولاد ضخیم با رنگ پودری مرغوب یا استیل؛ فاصله‌ی میله‌ها حدود ۲/۵ تا ۳/۸ سانتی‌متر؛ قفل مقاوم (ماکائو قفل ساده را باز می‌کند).	سیم گالوانیزه، رنگ پوسته‌شونده و جوش‌های زنگ‌زده منبع روی و سرب‌اند و مسمومیت با فلزات سنگین در طوطی‌های بزرگ شایع است.
نشیمن	چند نشیمن چوب طبیعی بی‌خطر با قطرهای متفاوت (ضخیم، متناسب با پنجه‌ی بزرگ)؛ یک نشیمن زیر برای سایش، نه همه.	تنوع قطر و جنس از زخم کف پا (بامبل‌فوت) و ساییدگی یکنواخت جلوگیری می‌کند.
اسباب‌بازی	اسباب‌بازی‌های بزرگ قابل‌جویدن (چوب نرم و سخت، چرم گیاهی، طناب سیسال کوتاه)، اسباب‌بازی جستجوی غذا و پازل؛ چرخشی تعویض شوند.	جویدن نیاز طبیعی است؛ اگر مجاز نباشد، مبل و پره‌ای خود پرنده جای آن را می‌گیرند.
کف قفس	کاغذ ساده یا روزنامه‌ی بی‌رنگ زیر توری؛ روزانه تعویض.	دیدن مدفوع هر روز مهم‌ترین ابزار پایش سلامت است؛ بسترهای خاکی و ذرت قالب‌زده (آسپرژیلوس) ریسک دارند.
ظرف‌ها	استیل، سنگین یا پیچ‌شونده؛ جدا برای آب، پلت و غذای تازه.	ماکائو ظرف سبک را برمی‌گرداند یا پرتاب می‌کند.

جای قفس، نور و خواب

- در اتاقی که خانواده وقت می‌گذرانند، یک ضلع قفس به دیوار، دور از آشپزخانه، کولر/بخاری مستقیم، پنجره‌ی آفتاب‌گیر بی‌سایه و کوران.
- نور طبیعی روز یا لامپ تمام‌طیف پرنده که طبق دستور سازنده تعویض شود؛ شیشه‌ی پنجره بیشتر UVB را فیلتر می‌کند. جزئیات را در مقاله‌ی نور، UVB و خواب پرندگان سایت ببینید.
- شب: ۱۰ تا ۱۲ ساعت تاریکی و سکوت؛ در صورت نیاز یک قفس خواب کوچک‌تر در اتاق آرام. کم‌خوابی مزمن پرنده را تحریک‌پذیر و هورمونی می‌کند.
- حمام: اسپری آب ولرم یا ظرف کم‌عمق چند بار در هفته؛ دوش همراه صاحب هم برای بسیاری از ماکائوها خوشایند است.

خطرهای پنهان خانه

بخار ظروف نجسب (تفلون/PTFE) در دمای بالا می‌تواند ظرف چند دقیقه پرنده را بکشد؛ همین‌طور دود سیگار و قلیان، اسپری‌ها، خوشبوکننده‌ها و شمع معطر. پنکه‌ی سقفی، پنجره و در باز، آینه و شیشه‌ی بزرگ، کابل برق، گیاهان سمی، سگ و گربه (حتی بازیگوش) و سرب و روی در کلید، زیورآلات، پرده‌ی وزنه‌دار و وسایل قدیمی همگی خطرند. زمان بیرون از قفس همیشه تحت نظارت.

۴. تغذیه

تغذیه‌ی نادرست – به‌ویژه رژیم دانه و تخمه – ریشه‌ی بخش بزرگی از بیماری‌هایی است که در ماکائوها می‌بینیم: چاقی، کبد چرب، کمبود ویتامین A و کلسیم، مشکلات پوست و پر. هدف، رژیمی متنوع و متعادل است که پرنده را برای غذاخوردن به «کار» هم وادارد.

جزء	سهم تقریبی	توضیح
پلت فرموله‌شده	حدود نیمی تا دوسوم رژیم	پلت مخصوص طوطی‌های بزرگ، بدون رنگ و شکر افزوده ترجیحاً. پایه‌ی تأمین ویتامین و مواد معدنی.
سبزیجات	بخش بزرگ باقیمانده	سبزی‌های برگ‌تیره، فلفل دلمه‌ای، هویج، کدو حلوائی، بروکلی، لوبیا سبز؛ منابع نارنجی و سبز تیره برای ویتامین A. خام یا کمی بخارپز.
میوه	کم	سیب و گلابی بدون هسته، انار، انواع توت، انبه، پاپایا؛ قند بالا دارند.
مغزها و دانه‌ها	محدود، برای آموزش و جستجو	گردو، بادام، فندق، ماکادامیا در پوسته (برای جویدن عالی‌اند). ماکائوها به چربی بیشتری از بسیاری از طوطی‌ها نیاز دارند (ماکائوی هیاسپنت بسیار بیشتر)، اما زیاده‌روی چاقی می‌آورد. بادام‌زمینی و مغز کپک‌زده یا مانده خطر آفلاتوکسین دارد.
آب	همیشه	آب تمیز، روزی دست‌کم یک بار تعویض و شستشوی ظرف؛ ماکائو غذا را در آب «خیس» می‌کند، پس گاهی بیشتر.

غذاهای ممنوع

آووکادو (همه‌ی اجزا)، شکلات و کاکائو، قهوه، چای و نوشابه‌ی کافئین‌دار، الکل، غذای شور، چرب و سرخ‌شده، پیاز و سیر، هسته‌ی میوه‌هایی مثل زردآلو، گیلان و هلو و دانه‌ی سیب، قارچ خام، غذای کپک‌زده و هر خوراکی که دست انسان در آن بوده و ادویه و نمک دارد.

- **تغییر رژیم از دانه به پلت** را تدریجی و طی چند هفته انجام دهید، با وزن‌کشی منظم؛ هیچ‌وقت پرنده را برای پذیرفتن غذای جدید گرسنه نگه ندارید. برنامه‌ی کامل در مقاله‌ی اصول تغذیه‌ی طوطی‌سانان آمده است.
- **وعده‌ها:** پلت در دسترس طی روز، غذای تازه صبح و عصر؛ غذای تازه را بعد از چند ساعت (در هوای گرم زودتر) جمع کنید.

- **جستجوی غذا:** بخشی از غذا را در جعبه‌ی کاغذی، کاغذ لوله‌شده یا اسباب‌بازی مخصوص پنهان کنید؛ ماکائو در طبیعت بخش بزرگی از روز را صرف یافتن و بازکردن غذا می‌کند.
- **وزن:** هفته‌ای یک بار با ترازوی گرمی وزن کنید؛ کاهش پیوسته‌ی حدود ۱۰٪ از وزن معمول پرنده دلیل کافی برای مراجعه به دامپزشک است.

۵. برنامه‌ی مراقبت

روزانه	هفتگی	ماهانه و سالانه
□ آب تازه و شستن ظرف آب و غذای تازه	□ وزن‌کشی و ثبت در دفترچه	□ شستشوی کامل و ضدعفونی قفس با محلول بی‌خطر و آبکشی کامل
□ غذای تازه و جمع‌کردن باقیمانده	□ شستن نشیمن‌ها و توری کف	□ بررسی تاریخ انقضا و نگهداری پلت در ظرف دربسته
□ نگاه به مدفوع: رنگ، مقدار، شکل	□ چرخاندن اسباب‌بازی‌ها و دورانداختن خرابه‌ها	□ تعویض لامپ تمام‌طیف طبق دستور سازنده
□ بررسی اشتها، حالت پر و انرژی	□ بازبینی قفل، جوش‌ها و رنگ قفس	□ معاینه‌ی سالانه‌ی دامپزشک پرندگان (و آزمایش‌هایی که او لازم بداند)
□ چند ساعت زمان بیرون از قفس با نظارت	□ حمام یا اسپری چند بار در هفته	□ بازنگری برنامه‌ی غذا و غنی‌سازی
□ جلسه‌ی کوتاه آموزش با تشویق	□ بررسی منقار، ناخن و کف پاها	
□ تعویض کاغذ کف قفس		
□ ۱۰ تا ۱۲ ساعت خواب تاریک		

۶. رفتار، آموزش و هندلینگ

قدرت منقار ماکائو به معنی «سلطه‌جو بودن» نیست. گازگرفتن تقریباً همیشه یک پیام است: ترس، هیجان بیش از حد، خستگی، هشدارهایی که نادیده گرفته شده‌اند یا رفتار هورمونی. پاسخ درست، آموزش با تشویق مثبت و خواندن زبان بدن است — نه تنبیه، فریاد زدن یا «زورآزمایی».

نشانه	معنای معمول
سرخ‌شدن پوست بی‌پر صورت	هیجان یا برانگیختگی (مثبت یا منفی)؛ ویژگی طبیعی ماکائو، نه بیماری — به بقیه‌ی زبان بدن هم نگاه کنید
تنگ و گشادشدن مردمک (پین‌کردن چشم)	تمرکز و هیجان شدید؛ همراه با بدن خشک و پره‌ای گردن سیخ = احتمال گاز
پره‌ای سیخ پشت گردن، بال‌های نیمه‌باز، دم بادبزنی	برانگیختگی یا حالت دفاعی؛ فاصله بدهید
سائیدن منقار هنگام استراحت	آرامش و رضایت، معمولاً پیش از خواب
پف‌کردن کوتاه و تکاندن پر	طبیعی؛ اما پف مداوم و چشم نیمه‌بسته = احتمال بیماری
برگرداندن غذا برای صاحب، مالیدن بدن، گشتن دنبال کمد و جای تاریک	رفتار جفت‌یابی و هورمونی؛ آن را تشویق نکنید

- **آموزش پایه:** «بالا» (روی دست یا نشیمن دستی)، «پایین»، برگشتن به قفس، رهاکردن اشیا و آموزش با تارگت. جلسه‌های ۵ تا ۱۰ دقیقه‌ای، چند بار در روز، با یک خوراکی کوچک مورد علاقه.
- **فریاد زدن:** فریادهای صبح و غروب طبیعی‌اند. فریاد «جلب توجه» را با واکنش (حتی دعوا) تقویت نکنید؛ به صدای آرام‌تر و بازی مستقل پاداش بدهید.

- **فصل هورمونی:** نوازش فقط روی سر و گردن، حذف لانه‌های احتمالی (جعبه، کمد، زیر پتو)، خواب کافی و کاهش غذاهای پرانرژی کمک می‌کند. اگر پرخاشگری یا تخم‌گذاری مکرر دارید، با دامپزشک مشورت کنید.
- **کودکان و مهمان‌ها:** بدون نظارت نزدیک منقار ماکائو نباشند. صورت را به منقار نزدیک نکنید.
- **چیدن بال:** تصمیمی است که باید با دامپزشک گرفته شود؛ جایگزین ایمن‌سازی خانه نیست و چیدن نادرست خطر سقوط و شکستگی منقار و جناغ دارد.

۷. مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

پرنندگان به‌طور غریزی بیماری را پنهان می‌کنند؛ وقتی نشانه‌ها آشکار می‌شوند، بیماری اغلب پیشرفته است. این جدول برای شناخت زودهنگام است – تشخیص و درمان هر مورد کار دامپزشک پرنندگان است.

مشکل	نشانه‌های هشدار	نکته‌ی پیشگیری
بیماری اتساع پیش‌معه (PDD)، با ارتباط به بورناویروس پرنندگان	کاهش وزن با وجود اشتها، دانه‌ی هضم‌نشده در مدفوع، برگرداندن غذا، گاهی نشانه‌های عصبی	قرنطینه‌ی پرنده‌ی جدید؛ ماکائوها از گروه‌هایی‌اند که این بیماری در آن‌ها زیاد گزارش شده
بیماری‌های ویروسی (پولیوماویروس، PBFD، بیماری پاچکو)	در جوجه‌ها ضعف و مرگ ناگهانی؛ ناهنجاری پر و منقار؛ بی‌حالی شدید و مدفوع زرد-سبز	خرید از پرورش‌دهنده‌ی سالم، قرنطینه، آزمایش‌های توصیه‌شده‌ی دامپزشک
مسمومیت با فلزات سنگین (روی، سرب)	بی‌حالی، تشنگی و ادرار زیاد، مدفوع غیرعادی، استفراغ، لرزش یا تشنج	قفس و اسباب‌بازی استاندارد، حذف گالوانیزه و وسایل قدیمی
چاقی، کبد چرب و آترواسکلروز	وزن بالا، رشد بیش از حد منقار و ناخن، تنگی نفس، کم‌حرکی	رژیم پلت‌محور، مغز محدود، جستجوی غذا و پرواز یا ورزش
بیماری تنفسی و آسپرژیلوزیس	تغییر صدا، دم‌جنباندن با هر نفس، نفس با دهان باز، ترشح یا گرفتگی سوراخ بینی، عطسه‌ی مکرر	تهویه‌ی خوب، غذای بدون کپک، بستر خشک، پرهیز از دود و اسپری
پسیتاکوز (کلامیدوز)	بی‌حالی، ترشح چشم و بینی، مدفوع سبز آبکی؛ گاهی بدون علامت	قرنطینه و آزمایش؛ قابل انتقال به انسان
پاپیلوماتوز کلوآکی	بافت توت‌فرنگی‌مانند در مخرج، خون در مدفوع، زورزدن، بوی بد	معاینه‌ی منظم؛ به دامپزشک خبر دهید
کندن پر و خودآزاری	پره‌ای جویده یا کنده‌شده روی سینه، پا و بال؛ گاهی زخم پوست	رد بیماری پزشکی توسط دامپزشک + اصلاح محیط، خواب، غذا و غنی‌سازی
ناهنجاری منقار (به‌ویژه در جوجه‌ها)	منقار کج یا قیچی‌مانند، رشد بیش از حد یا ترک	کوتاه‌کردن یا اصلاح منقار فقط توسط دامپزشک
بامبل‌فوت	قرمزی، صافی یا زخم کف پا، لنگیدن	نشیمن‌های متنوع، وزن مناسب، نظافت

بهداشت برای انسان‌ها

پسیتاکوز می‌تواند از پرنده به انسان منتقل شود و در انسان علائمی شبیه آنفلوانزا یا ذات‌الریه ایجاد کند. بعد از تمیزکردن قفس دست‌ها را بشویید، هنگام تمیزکردن کف قفس گردوغبار ایجاد نکنید و اگر کسی در خانه علائم تنفسی پیدا کرد، به پزشک بگویید که پرنده‌ی خانگی دارید. افراد باردار، سالمند یا دچار ضعف ایمنی باید احتیاط بیشتری داشته باشند.

۸. چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

اورژانس – همان روز مراجعه کنید

- تنفس با دهان باز، دم‌جنباندن شدید با هر نفس، صدای خس‌خس
- نشستن کف قفس، پف شدید و چشم‌های بسته، ناتوانی در گرفتن نشیمن
- خونریزی (از جمله پر خونی شکسته یا شکستگی منقار)
- تشنج، لرزش، سرگیجه یا کج‌شدن سر
- استفراغ مکرر، اسهال شدید یا خون در مدفوع
- زورزدن مکرر یا بیرون‌زدگی بافت از مخرج، ماده‌ای که تخم نمی‌گذارد
- خوردن یا جوییدن احتمالی فلز، سم، دارو یا استنشاق بخار تفلون یا دود
- هر سقوط یا ضربه‌ی شدید، گازگرفتگی توسط سگ یا گربه – حتی بدون زخم آشکار
- نخوردن غذا بیش از یک روز

تا رسیدن به دامپزشک: پرنده را در جعبه‌ی حمل یا قفس کوچک، گرم (نه داغ)، تاریک و آرام نگه دارید؛ نشیمن را پایین بگذارید. یک نمونه‌ی تازه‌ی مدفوع، نام غذاها و هر چیزی که احتمالاً خورده را همراه ببرید.

کارهایی که نباید انجام دهید: داروی انسانی یا داروی «توصیه‌شده در اینترنت» ندهید، به زور در منقار آب یا غذا نریزید، پرنده‌ی بی‌حال را حمام نکنید و منتظر «خودش خوب می‌شود» نمانید.

۹. چک‌لیست خرید و انتخاب ماکائوی سالم

خود پرنده

- چشم‌های روشن و تمیز، بدون ترشح و تورم
- سوراخ‌های بینی تمیز و قرینه
- منقار صاف و قرینه، بدون ترک و کجی
- پرهای مرتب، بدون ناحیه‌ی بی‌پر و پرهای جویده
- مخرج تمیز، بدون مدفوع چسبیده
- هوشیار، کنجکاو، با غذاخوردن فعال
- تنفس آرام و بی‌صدا، بدون جنبیدن دم
- پاها و انگشتان سالم، گرفتن محکم نشیمن
- جوجه کاملاً از شیر گرفته‌شده (غذاخوردن مستقل)

فروشنده و مدارک

- پرورش‌دهنده‌ی شناخته‌شده؛ نه پرنده‌ی بدون مبدأ
- پلاک بسته یا میکروچیپ و مدارک قانونی (CITES/ مجوزهای لازم)
- سن، گونه و تاریخچه‌ی تغذیه‌ی مکتوب
- سابقه‌ی آزمایش‌ها (در صورت وجود)
- آمادگی برای معاینه‌ی پیش از خرید توسط دامپزشک شما
- محیط نگهداری تمیز و پرندگان سالم دیگر
- هیچ فشاری برای خرید فوری یا «جوجه‌ی دستی که هنوز سرلوله می‌خورد»

قرنطینه

پرنده‌ی جدید را حداقل حدود ۳۰ تا ۴۵ روز (یا طبق نظر دامپزشک) در اتاقی جدا از پرندگان دیگر نگه دارید و ابتدا معاینه کنید.

۱۰. پرسش‌های متداول

آیا ماکائو حرف می‌زند؟

بسیاری از ماکائوها چند کلمه و جمله‌ی کوتاه یاد می‌گیرند، اما معمولاً در حد کاسکو یا آمازون نیستند و تضمینی وجود ندارد. ماکائو را برای حرف‌زدن نخرید؛ برای شخصیت و تعاملش بخرید.

نر یا ماده؟ از ظاهر می‌شود فهمید؟

در ماکائوها نر و ماده تقریباً هم‌شکل‌اند. تعیین جنسیت با آزمایش DNA (پر یا خون) یا روش‌های دامپزشکی انجام می‌شود.

مینی‌ماکائو جایگزین مناسبی است؟

برای خانه‌ی کوچک‌تر، بله تا حدی: فضای کمتر و منقار ضعیف‌تری دارد، ولی هنوز پرخاش، باهوش و پرنیاز به تعامل است.

می‌توانم ماکائو را در بالکن یا حیاط نگه دارم؟

فقط در پرندۀ خانۀ استاندارد، ایمن از گربه، پرندگان شکاری، دزد، آفتاب مستقیم بی‌سایه و سرما و گرمای شدید – و با حضور روزانه‌ی شما. نگهداری دائمی در بالکن بدون تعامل، پرندۀ را منزوی و بیمار می‌کند.

هر چند وقت یک بار باید ناخن و منقار را کوتاه کرد؟

با نشیمن‌های متنوع و جویدن کافی، منقار معمولاً نیاز به کوتاه‌کردن ندارد؛ رشد بیش از حد منقار خودش ممکن است نشانه‌ی بیماری کبد یا تغذیه باشد. ناخن را دامپزشک یا فرد آموزش‌دیده کوتاه کند.

ماکائو را با طوطی‌های دیگر نگه دارم؟

فقط بعد از قرنطینه و با معرفی تدریجی و نظارت. منقار ماکائو برای پرندگان کوچک‌تر خطرناک است؛ هرگز پرندۀ کوچک را بدون نظارت کنار ماکائو نگذارید.

۱۱. هشدار پایانی

این راهنما برای آموزش صاحبان پرندۀ تهیه شده و جایگزین معاینه، تشخیص و درمان توسط دامپزشک نیست. هیچ دارو یا دوزی در آن ذکر نشده است و نباید خودسرانه به پرندۀ دارو داد. اعداد ذکرشده (دما، ابعاد، سهم غذاها) محدوده‌های رایج‌اند و بسته به گونه، فرد و شرایط شما ممکن است تغییر کنند. در هر تردید، با یک دامپزشک پرندگان و حیوانات اگزوتیک مشورت کنید.

برای مطالعه‌ی بیشتر در سایت: راهنمای کامل نگهداری ماکائو، اصول تغذیه‌ی طوطی‌سانان، غنی‌سازی محیط و جستجوی غذا، بیماری PDD، پولیوماویروس و PBFD، بیماری پاچکو، پسیதாகوز، مسمومیت با فلزات سنگین، کندن پر، فریاد زدن طوطی‌ها، قرنطینه‌ی حیوان جدید و نشانه‌های بیماری – همه در exoticsbymahdiyar.ir/articles