

راهنمای نگهداری · خزندگان

مار بوآ

یک مار آرام و باشکوه، اما با جثه‌ی بزرگ و تعهدی چند دهه‌ای: محفظه، گرما، تغذیه، ایمنی و نشانه‌های بیماری، در یک مرجع جمع‌وجور برای پیش از خرید و بعد از آن.

دکتر مهدیار رمزگویان — دامپزشک حیوانات اگزوتیک

۱. کارت اطلاعات سریع

نام فارسی	مار بوآ، بوآ کانستریکتور، «رد تیل»
نام علمی	*Boa constrictor* و *Boa imperator* (بوآی آمریکای مرکزی، رایج‌ترین شکل در نگهداری خانگی؛ رده‌بندی این گروه هنوز بین منابع یکسان نیست)
زیستگاه طبیعی	آمریکای مرکزی و جنوبی؛ از جنگل بارانی تا مناطق نیمه‌خشک
طول عمر	معمولاً ۲۰ تا ۳۰ سال در اسارت، گاهی بیشتر
اندازه‌ی بالغ	نر: حدود ۱٫۲ تا ۱٫۸ متر. ماده: حدود ۱٫۸ تا ۲٫۵ متر و سنگین‌تر. برخی بوآهای آمریکای جنوبی بلندتر می‌شوند و جمعیت‌های جزیره‌ای کوتاه‌ترند؛ اندازه به منشأ بستگی دارد.
سطح دشواری	متوسط تا زیاد؛ رفتارش آرام است، ولی جثه، فضا و هزینه‌ی طعمه چالش اصلی‌اند.
رژیم	گوشت‌خوار؛ جونده‌ی کامل منجمد و یخ‌زدایی‌شده (موش، رت و برای بزرگ‌ترها گاهی خرگوش کوچک)
دما	نقطه‌ی گرم ۳۱ تا ۳۳°C، سمت خنک ۲۴ تا ۲۷°C، شب نه پایین‌تر از حدود ۲۳°C
رطوبت	۵۵ تا ۷۰٪؛ در دوره‌ی پوست‌اندازی کمی بالاتر
نور	چرخه‌ی روز و شب حدود ۱۲ ساعته؛ UVB ضعیف الزامی نیست، ولی می‌تواند مفید باشد
اجتماعی/تنها	انفرادی؛ هر مار در محفظه‌ی خودش. بی‌زهر است و طعمه را با فشردن می‌کشد.

۲. مناسب چه کسی است؟ آیا انتخاب درستی است؟

انتخاب خوبی است اگر...

- می‌توانید ۲۰ سال یا بیشتر متعهد بمانید.
- فضای محفظه‌ای حدود ۱٫۸ تا ۲٫۴ متری را دارید.
- به طعمه‌ی منجمد مناسب دسترسی پایدار دارید.
- پیش‌تر مار کوچک‌تری نگه داشته‌اید.
- برای جابه‌جایی یک ماده‌ی بالغ، نفر دوم در دسترس دارید.
- به دامپزشک آشنا با خزندگان دسترسی دارید.

بهتر است صبر کنید اگر...

- فقط نوزاد بامزه را دیده‌اید و فکر بوآی ۲ متری را نکرده‌اید.
- خانه‌تان اجاره‌ای است یا مدام جابه‌جا می‌شوید.
- کودک خردسال یا حیوان کوچک آزاد در خانه دارید و محفظه را نمی‌توانید قفل کنید.
- اولین مار شماست؛ کورن اسنیک یا کینگ اسنیک شروع ساده‌تری است.
- از نگهداری جونده‌ی منجمد در فریزر خانه ناراحت می‌شوید.

نکته‌ی قانونی و اخلاقی

بوآ در فهرست‌های CITES قرار دارد و تجارت بین‌المللی آن مجوز می‌خواهد؛ زیرگونه‌ی *B. c. occidentalis* سخت‌گیرانه‌تر حفاظت می‌شود. پیش از خرید، مدارک منشأ حیوان را بخواهید و مقررات روز را از سازمان حفاظت محیط زیست بپرسید. مار پرورش‌یافته در اسارت (نه صیدشده از طبیعت) سالم‌تر و اخلاقی‌تر است. **هرگز بوآ را در طبیعت رها نکنید:** این کار غیرمسئولانه است، خود مار معمولاً دوام نمی‌آورد و گونه‌ی غیربومی می‌تواند به حیات‌وحش آسیب بزند.

۳. محل نگهداری و تجهیزات

اندازه‌ی محفظه

مرحله	طول تقریبی مار	حداقل پیشنهادی (طول × عمق × ارتفاع)
نوزاد و سال اول	تا حدود ۹۰ سانتی‌متر	۹۰ × ۴۵ × ۴۵ سانتی‌متر، با پناهگاه و پوشش فراوان
جوان	۰٫۹ تا ۱٫۵ متر	۱۲۰ × ۶۰ × ۶۰ سانتی‌متر
نر بالغ و بوآی کوچک	۱٫۵ تا ۱٫۸ متر	۱۸۰ × ۶۰ × ۶۰ سانتی‌متر
ماده‌ی بالغ بزرگ	۲ متر و بیشتر	۲۴۰ × ۹۰ × ۹۰ سانتی‌متر؛ بزرگ‌تر بهتر است

این اعداد کف پیشنهادی‌اند. بوآ با وجود آرامش ظاهری به جای کشیدن بدن و بالا رفتن نیاز دارد و نوجوان‌هایش به‌خوبی از شاخه استفاده می‌کنند. دیواره‌ی مقاوم مهم است؛ بوآی بالغ قوی است و با فشار بدن درب کشویی بدون قفل را باز می‌کند، پس **قفل واقعی** بگذارید.

گرما: مهم‌ترین تجهیزات

- **گرادیان حرارتی** بسازید، نه یک دمای یکسان؛ مار با جابه‌جایی بین گرم و خنک دمای بدنش را تنظیم می‌کند و بدون این کار هضم و ایمنی‌اش مختل می‌شود.
- هر منبع گرما حتماً به **ترموستات** وصل باشد. پنل تابشی یا لامپ حرارتی گزینه‌های رایج‌اند.
- **روی لامپ و المنت حتماً محافظ بگذارید.** مارهای بزرگ دور منبع گرما حلقه می‌زنند و سوختگی عمیق در بوآ بسیار دیده می‌شود، چون مار اغلب خودش را کنار نمی‌کشد.
- سنگ گرم و المنت بدون کنترل ممنوع است.
- دما را با دو دماسنج دیجیتال (سمت گرم و خنک) بسنجید؛ برای دمای سطح، دماسنج لیزری مفید است. عقربه‌ای‌ها قابل اعتماد نیستند.
- برای **قطعی برق** برنامه داشته باشید: پتو روی محفظه و بسته‌ی گرمایی عایق‌شده بیرون از تماس مستقیم با مار. بوآی سالم چند ساعت افت دما را تحمل می‌کند، ولی بعد از غذا این افت خطرناک‌تر است.

رطوبت، بستر و وسایل

- **رطوبت:** در هوای خشک بسیاری از شهرهای ایران، توری بالای محفظه را تا حدی بپوشانید و بستر نگهدارنده‌ی رطوبت به‌کار ببرید. هدف، هوای نسبتاً مرطوب با **تهویه‌ی خوب** است؛ محیط خیس و بی‌هوا به عفونت پوست و تنفس می‌انجامد.
- **بستر:** پوسته‌ی نارگیل، خرده‌چوب سرو مخصوص خزندگان (cypress) یا کاغذ ساده (برای قرنطینه بهترین است). **چوب کاج و سدر ممنوع**؛ ترکیبات معطرشان راه تنفس را تحریک می‌کند.

- **پناهگاه:** حداقل یکی در سمت گرم و یکی در سمت خنک، آن‌قدر تنگ که مار در آن احساس امنیت کند.
- **ظرف آب:** سنگین، واژگون‌نشدنی و بزرگ که مار بتواند در آن خیس بخورد. خیس‌خوردن مداوم می‌تواند نشانه‌ی کنه، گرمای زیاد یا پوست‌اندازی باشد.
- **شاخه و سکو:** کلفت و کاملاً محکم؛ حداقل هم‌قطر بدن مار. شاخه‌ی لرزان، مار سنگین را زمین می‌زند.
- **نور:** چرخه‌ی روز و شب منظم. UVB ضعیف الزامی مطلق نیست، اما گزینه‌ی معقولی است؛ در این صورت مار باید همیشه به سایه و پناهگاه دسترسی داشته باشد.

۴. تغذیه

بوآ متابولیسم کندی دارد و **بسیار مستعد چاقی** است. رایج‌ترین خطای صاحبان بوآ، کمبود غذا نیست؛ پرخوراندن است. رشد آهسته‌تر، سالم‌تر است.

مرحله	طعمه (راهنمای کلی)	فاصله‌ی وعده‌ها
نوزاد	موش نیمه‌بالغ یا موش بالغ کوچک	هر ۷ تا ۱۰ روز
جوان (سال اول به بعد)	موش بالغ یا رت جوان	هر ۱۰ تا ۱۴ روز
نیمه‌بالغ	رت کوچک تا متوسط	هر ۱۴ تا ۲۱ روز
بالغ	رت متوسط تا بزرگ؛ ماده‌ی بزرگ گاهی خرگوش کوچک	هر ۳ تا ۴ هفته

- **اندازه‌ی طعمه:** حدوداً هم‌قطر پهن‌ترین بخش بدن مار، یا کمی بیشتر. طعمه‌ی بزرگ‌تر خطر برگرداندن و آسیب دارد؛ طعمه‌ی متوسط با فاصله‌ی منطقی بهتر از طعمه‌ی عظیم است.
- **تعداد و فاصله را با وزن مار تنظیم کنید،** نه از روی گرسنه‌نمایی. بوآ تقریباً همیشه به غذا واکنش نشان می‌دهد و این واکنش به معنی گرسنگی واقعی نیست.
- **طعمه‌ی منجمد** را در یخچال یا داخل کیسه‌ی بسته و آب گرم یخ‌زدایی کنید و تا دمای حدود بدن گرم کنید. مایکروویو نقاط داغ می‌سازد و طعمه را می‌ترکاند.
- همیشه با **پنس بلند** طعمه بدهید و با دستی که بوی جونده می‌دهد مار را لمس نکنید.
- تا دست‌کم **۴۸ ساعت** بعد از غذا (بعد از وعده‌ی بزرگ بیشتر) مار را بلند نکنید.

چه بدهیم

- جونده‌ی کامل منجمد از منبع مطمئن
- تنوع در نوع طعمه‌ی کامل، با مشورت دامپزشک
- آب تازه‌ی همیشگی

چه ندهیم

- طعمه‌ی زنده: جونده می‌تواند زخم عمیق بزند
- جونده‌ی گرفته‌شده از طبیعت یا خیابان: سم موش و انگل
- تکه‌ی گوشت، جگر یا مرغ بدون استخوان: جیره‌ی کامل نیست
- مکمل و دارو بدون نظر دامپزشک

وضعیت بدن سالم

بوآی سالم بدن عضلانی و کمی مثلثی دارد؛ نه ستون فقرات برجسته و نه شکلی لوله‌ای با چین‌های چربی کنار کلوآک. بین فلس‌ها در حالت استراحت نباید پوست زیادی پیدا باشد. **وزن‌کشی ماهانه** بهترین ابزار شماست؛ در دفتر یا تلفن ثبت کنید. اگر مار چاق شده، کاهش ناگهانی غذا نکنید و برنامه را با دامپزشک تنظیم کنید.

امتناع کوتاه از غذا هنگام پوست‌اندازی، در فصل جفت‌گیری (به‌خصوص نرها) یا بعد از جابه‌جایی رایج است و اگر وزن ثابت بماند معمولاً اورژانس نیست. **کاهش وزن همراه با بی‌اشتهایی** موضوع دیگری است و باید بررسی شود.

۵. برنامه‌ی مراقبت (چک‌لیست)

روزانه

- ☐ کنترل دما و رطوبت
- ☐ بررسی قفل و درب محفظه
- ☐ نگاه به مار: وضعیت، تنفس، دهان
- ☐ تمیزکردن مدفوع و اوره
- ☐ آب تازه در صورت آلودگی

هفتگی

- ☐ شستن و ضدعفونی ظرف آب
- ☐ تعویض تکه‌های خیس بستر
- ☐ بررسی کنه (به‌خصوص دور چشم و داخل ظرف آب)

ماهانه

- ☐ وزن‌کشی و ثبت در دفتر
- ☐ ثبت وعده‌ها و پوست‌اندازی‌ها
- ☐ تست ترموستات و دماسنج‌ها
- ☐ بررسی محافظ لامپ و سیم‌ها
- ☐ نظافت کامل محفظه، با آبکشی و خشک‌کردن

سالانه

- ☐ معاینه‌ی عمومی نزد دامپزشک خزندگان
- ☐ آزمایش مدفوع، در صورت نیاز
- ☐ تعویض کامل بستر و لامپ‌های مصرف‌شده

بهداشت و سالمونلا

خزندگان می‌توانند بدون علامت ناقل سالمونلا باشند. بعد از لمس مار، طعمه یا وسایل، دست‌ها را با آب و صابون بشویید؛ وسایل مار را در سینک آشپزخانه نشویید و طعمه را جدا از غذای خانواده نگه دارید. کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار، سالمندان و افراد با نقص ایمنی باید بیشتر مراقب باشند.

۶. رفتار، دست‌آموزی و هندلینگ

بوآ معمولاً از آرام‌ترین مارهای بزرگ است، ولی این آرامش خودبه‌خود نمی‌آید. نوزادان و جوان‌ها ممکن است فش‌فش کنند یا عصبی باشند؛ با هندلینگ کوتاه، آرام و منظم معمولاً رام‌تر می‌شوند.

رفتار	معنای احتمالی	کار درست
فش‌فش بلند، بدن جمع‌شده	ترس یا احساس خطر	عقب بروید، بعداً دوباره و کوتاه تلاش کنید.
حمله‌ی سریع با دهان باز	واکنش تغذیه‌ای یا دفاعی	دست بوی طعمه ندهد؛ از قلاب نرم استفاده کنید.
چشم‌های کدر و آبی‌رنگ	آماده‌شدن برای پوست‌اندازی	هندلینگ نکنید و رطوبت را کمی بالا ببرید.
حلقه‌زدن همیشگی روی منبع گرما	کمبود گرما یا منبع نامناسب	دما و محافظ را بررسی کنید.

- **مار تازه‌وارد:** یک هفته تا ده روز فقط غذا و آرامش؛ اول چند وعده‌ی موفق، بعد هندلینگ.
- **نحوه‌ی گرفتن:** از زیر بدن و حداقل در دو یا چند نقطه تکیه بدهید. مار را از سر یا دم بلند نکنید.

- **تمایز زمان غذا و هندلینگ:** لمس آرام با قلاب نرم پیش از دست‌زدن، به مار می‌فهماند که زمان غذا نیست.
- یکی دو جلسه‌ی کوتاه در هفته برای شروع کافی است؛ هدف، عادت به لمس و ساده‌شدن معاینه است.
- **خار لگنی** کوچک کنار کلوآک طبیعی است و بقایای لگن و پا است؛ در نرها معمولاً بزرگ‌تر است و نشانه‌ی زخم نیست.

قوانین ایمنی برای مار بزرگ

- **مار بالای حدود ۲ متر را تنها جابه‌جا نکنید** و هنگام غذادادن کسی در خانه باشد.
- مار را هرگز دور گردن نگذارید. کودک و حیوان خانگی نباید بدون نظارت کنار مار باشند.
- **اگر مار حلقه زد:** آرام بمانید و از سمت دم باز کنید، نه از سر. کشیدن سر یا بدن فشار را بیشتر می‌کند.
- **اگر گاز گرفت:** نکشید؛ دندان‌ها به عقب خمیده‌اند و کشیدن زخم را بدتر می‌کند. معمولاً خودش رها می‌کند. زخم را با آب و صابون بشویید و در صورت عمیق بودن یا احتمال جاماندن دندان، به پزشک مراجعه کنید.

۷. مشکلات شایع سلامت و نشانه‌های هشدار

مشکل	نشانه‌ها	علت‌های رایج
بیماری انکلوژن بدنی (IBD)	برگرداندن مکرر غذا، کاهش وزن، بعدها سر بالا گرفتن غیرعادی، گیجی و افتادن به پشت	ویروس آرنا؛ انتقال با کنه و تماس. بوآ می‌تواند مدت‌ها بدون علامت ناقل باشد.
عفونت تنفسی	دهان باز، خس‌خس، ترشح حباب‌دار از بینی، بالا گرفتن سر	دمای پایین، رطوبت نادرست، تهویه‌ی بد، استرس یا بیماری زمینه‌ای
برگرداندن غذا	طعمه‌ی کم‌هضم‌شده چند ساعت تا چند روز بعد از تغذیه	طعمه‌ی بزرگ، سرما، هندلینگ زودهنگام، انگل یا ویروس
چاقی و کبد چرب	بدن لوله‌ای، چین‌های چربی، بی‌حالی	تغذیه‌ی پرتکرار، طعمه‌ی چرب، تحرک کم
کنه‌ی مار	نقطه‌های سیاه ریز روی فلس، خیس‌خوردن طولانی، بی‌قراری	مار یا وسیله‌ی آلوده‌ی تازه‌وارد؛ می‌تواند ناقل بیماری هم باشد.
پوست‌اندازی ناقص	پوست تکه‌تکه، باقی‌ماندن پوست چشم	رطوبت کم، نبود سطح زبر، کم‌آبی، بیماری
سوختگی حرارتی	فلس تیره یا تاول‌زده، پوست مرده، زخم عمیق	تماس با منبع گرمای بدون محافظ یا ترموستات
عفونت دهان (استوماتیت)	تورم لثه، لکه‌ی کرم‌رنگ، بزاق غلیظ، بی‌اشتهایی	مدیریت ناصحیح، آسیب دهان، ضعف ایمنی
بیماری پوستی و تاول	تاول یا قرمزی شکم، فلس سست و لکه‌ی تیره	بستر مدام خیس و کثیف؛ گاهی عفونت قارچی
کریپتوسپوریدیوز	بی‌اشتهایی، برگرداندن غذا، کاهش وزن، تورم میانه‌ی بدن	انگل تک‌یاخته‌ای؛ رعایت بهداشت و قرنطینه ضروری است.

این جدول برای **شناسایی زودهنگام** است، نه تشخیص خانگی. درمان هر کدام از این‌ها به معاینه و گاهی آزمایش نیاز دارد.

چرا قرنطینه برای بوآ این‌قدر مهم است؟

چون IBD می‌تواند ماه‌ها یا سال‌ها پنهان بماند، مار جدید را **چند ماه** در اتاق دیگر با وسایل جدا نگه دارید و پیش از پایان قرنطینه، آزمایش PCR را با دامپزشک مطرح کنید؛ به‌خصوص اگر بوآ یا پیتون دیگری در خانه دارید.

۸. چه زمانی فوراً به دامپزشک اگزوتیک مراجعه کنیم؟

این موارد را جدی بگیرید و همان روز مراجعه کنید:

- تنفس با دهان باز، خس‌خس یا ترشح کف‌آلود از بینی و دهان
- سر بالا گرفتن غیرعادی، چرخش بدن، از دست‌دادن تعادل یا ناتوانی در برگشتن به حالت عادی
- بیرون‌زدگی بافت از کلوآک؛ بافت را با گاز تمیز مرطوب بپوشانید و به‌زور جا نیندازید
- سوختگی، زخم گازگرفتگی یا آسیب شدید
- تورم صورت و دهان، چرک یا خونریزی از دهان
- برگرداندن غذا بیش از یک بار، یا برگرداندن همراه با کاهش وزن
- بی‌حالی شدید و بدن شل

تا رسیدن به دامپزشک

- مار را در کیسه‌ی پارچه‌ای تمیز و گره‌خورده، داخل جعبه‌ی محکم با تهویه قرار دهید.
- دمای مناسب و ملایم حفظ کنید، بدون تماس مستقیم با منبع گرما.
- **به‌زور غذا ندهید و خودسرانه دارو ندهید.** داروی نامناسب یا دوز اشتباه در خزندگان می‌تواند مرگبار باشد.
- دما و رطوبت اخیر، سابقه‌ی غذا، وزن و عکس یا ویدیوی مشکل را همراه ببرید.
- بعد از برگرداندن غذا، حدود دو هفته غذا ندهید مگر دامپزشک چیز دیگری بگوید.

۹. چک‌لیست خرید و انتخاب بوآی سالم

- ☐ مار پرورش‌یافته در اسارت از پرورش‌دهنده‌ی شناخته‌شده، همراه با مدارک منشأ قانونی
- ☐ تأیید چند وعده‌ی موفق **طعمه‌ی منجمد** و سوابق غذا و پوست‌اندازی
- ☐ پرسش درباره‌ی سابقه‌ی IBD، کنه و مارهای بیمار در مجموعه‌ی فروشنده
- ☐ بدن سفت و عضلانی؛ نه استخوانی، نه لوله‌ای
- ☐ زبان‌کشیدن فعال و هوشیار بودن هنگام نگهداشتن
- ☐ چشم شفاف (جز دوره‌ی پوست‌اندازی)، بینی تمیز، دهان بدون تورم یا بزاق غلیظ
- ☐ تنفس بی‌صدا با دهان بسته
- ☐ پوست بدون زخم و سوختگی و بدون نقطه‌ی سیاه متحرک (کنه)
- ☐ هماهنگی حرکت طبیعی: سر را صاف نگه می‌دارد و به پشت نمی‌افتد
- ☐ محفظه و وسایل **پیش از خرید** آماده و چند روز تست‌شده
- ☐ طعمه‌ی منجمد با اندازه‌ی مناسب و نزدیک‌ترین دامپزشک خزندگان از قبل مشخص باشد

۱۰. پرسش‌های متداول

بوآ می‌تواند انسان را خفه کند؟

بوآی خانگی معمولاً نسبت به انسان آرام است و خطر اصلی با رعایت قوانین ایمنی کم می‌شود. با این حال، حیوان قوی‌ای است؛ به همین دلیل مار بزرگ را دور گردن نگذارید و برای مار بالای حدود ۲ متر نفر دوم داشته باشید.

چرا مارم همیشه گرسنه به نظر می‌رسد؟

واکنش تغذیه‌ای بوآ قوی است و نشانه‌ی کمبود غذا نیست. از روی وزن و وضعیت بدن تصمیم بگیرید، نه از روی التماس ظاهری.

چند ماه است غذا نخورده، خطرناک است؟

اگر وزن ثابت است و نشانه‌ی دیگری ندارد، معمولاً جای نگرانی فوری نیست؛ اما کاهش وزن، برگرداندن غذا یا نشانه‌ی تنفسی یا عصبی، مراجعه به دامپزشک را لازم می‌کند. دما و رطوبت را اول بررسی کنید.

می‌شود نر و ماده را با هم نگه داشت؟

توصیه نمی‌شود. بوآ به هم‌نشین نیاز ندارد و هم‌قفسی خطر استرس، حادثه‌ی تغذیه‌ای و انتقال بیماری دارد. بوآ زنده‌زا است و هم‌قفسی نر و ماده می‌تواند به ده‌ها نوزاد ناخواسته برسد.

«رد تیل» با بوآی معمولی فرق دارد؟

نام بازاری است و همیشه دقیق نیست. منشأ و گونه را از فروشنده بپرسید؛ نیاز اصلی نگهداری مشابه است، ولی اندازه‌ی نهایی می‌تواند متفاوت باشد. رنگ و مورف هم معیار سلامت نیست.

۱۱. هشدار پایانی

این راهنما جایگزین معاینه‌ی دامپزشک نیست. مرجعی آموزشی برای نگهداری بهتر است و هیچ دارو یا دوزی در آن ذکر نشده. نیازها می‌توانند بر اساس منشأ، سن و وضعیت سلامت هر مار فرق کنند. در صورت بروز هر نشانه‌ی بیماری، به دامپزشک اگزوتیک آشنا با خزندگان مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید در exoticsbymahdiyar.ir: اصول پایه‌ی نگهداری مار · بیماری IBD در بوآ و پیتون · مار غذا نمی‌خورد · برگرداندن غذا در مار · راه‌اندازی تراریوم · ترموستات و دماسنج · نور UVB خزندگان · سوختگی حرارتی · کنه‌ی مار · علائم بیماری · قرنطینه‌ی حیوان جدید · جعبه‌ی کمک‌های اولیه · پیدا کردن دامپزشک اگزوتیک خوب

دکتر مهدیار رمزگویان — exoticsbymahdiyar.ir · آبان ۱۴۰۵ (نوامبر ۲۰۲۶) · نسخه ۱

عکس: Diego Tirira، از ویکی‌مدیا کامنز، با مجوز CC BY-SA 2.0