

## Drugs Used in Pet Animal treatment

### ( A ) Antibiotic

|          | <b>Active Ingredient &amp; Dose</b>   |  | <b>Note</b>   |
|----------|---|--|---|
| <b>1</b> | <b>Amoxicillin + Clavulanic acid ( 12.5 - 25 mg/kg q 8-12 h)</b>            |  |   |
|          | Trade Name  | Augmantin® Suspension 156 - 312 - 457 - 600<br>Tablets 625 - 1000<br>Curam® Suspension 156 - 228 - 312 - 457 - 642<br>Tablets 625 - 1000 | ده بقى الباشا بتاعنا ... ممتد المفعول و ممكن استخدمه في كل حاجة<br>و فيه منه منتج بيطري اسمه <b>Synlox</b> تحفة بس خذ بالك ان من اعراضه الجانبية الأسهال ... و ده معناه اني اتجنبه في الأسهال |
| <b>2</b> | <b>Cefotaxime (40 - 50 mg/kg q8h)</b>                                       |  |   |
|          | Trade Name  | Xorin® Cefotax®<br>Vials 250 - 500 - 1000  | حلو جدا و ممتد المفعول استخداماته كتير و بيستخدم اكثر بعد العمليات  |
| <b>3</b> | <b>Ceftriaxone (dog 15 - 50 mg/kg , cat: 25 - 50 mg/kg q12-24h)</b>         |  |   |
|          | Trade Name  | Ceftriaxone® Wintriaxone® Xoraxon®<br>Vials 250 - 500 - 1000   | زي السيفوتاكس بالظبط بس ممتد المفعول عنه  |
| <b>4</b> | <b>Azithromycine (5 - 10 mg/kg q24h )</b>                                   |  |   |
|          | Trade Name  | Xithrone®<br>200mg suspension  | ممتاز جدا في الحالات التنفسية بس بياثر جامد على الكبد علشان كده افحص الحيوان كويس و متستخدموش في الحيوانات الصغيرة في العمر   |
| <b>5</b> | <b>Clarithromycin (Dogs : 4 - 12 mg/kg q12h , Cats : 5 - 10 mg/kg q12h)</b> |  |   |
|          | Trade Name  | Klacid® Klarimix®<br>• Suspension 125 - 250  | ممتاز اوي في التنفسي برضه و الاثار الجانبية بتاعته اخف كتير من الأثروميكن .... بس برضه اتأكد ان الحيوان كبد سليم الأول  |
| <b>6</b> | <b>Cefalexin (15 mg/kg q8-12h p.o., 10 mg/kg q24h i.m.,s.c.)</b>            |  |   |
|          | Trade Name  | Ceporex® Cephalexin®<br>• Suspension 125 - 250<br>• Tablet 250 - 500 - 1000  | حلو اوي على البكتيريا الجلدية علشان بياثر على الـ <b>staph.</b>   |
| <b>7</b> | <b>Ciprofloxacin ( 20 - 25 mg/kg once or divided)</b>                       |  |   |
|          | Trade Name  | Ciprofloxacin® Cipropay®<br>• Tablet 250 - 500   | حلو أوي في حالات الجهاز البولي لأنه بيفرز عن طريق الكلى   |
| <b>8</b> | <b>Doxycycline (10 mg/kg q24h)</b>  |  |   |
|          | Trade Name  | Vibramycin® Doxymycin®<br>• Capsule 100  | مش بيستخدم غير في حالة الأصابة بطفيليات الدم فقط  |

( B ) Anti-inflammatory & Anti-pyretics

|   | Active Ingredient  | Dose   | Trade Name   | Note   |
|---|--------------------|--|--|--|
| 1 | Dexamethasone      | 0.01 - 0.16 mg/kg q24h<br>i.m., s.c, p.o.  | Dexamethasone®   | دول بقى corticosteroids<br>و حلوين أوي في حالات الالتهابات<br>بأنوعها و الحساسية و ال shock<br>بس لازم استخدمهم بجرعة تناقصية<br>و ببسموها<br>(3 day system)<br>أول 3 أيام بتدي الجرعة كاملة<br>مرتتين في اليوم<br>تاني 3 أيام بتدي نص الجرعة<br>مرتتين في اليوم<br>تالت 3 أيام بتدي نص الجرعة مرة<br>واحدة في اليوم<br>وده طبعاً علشان اتجنب أثارها<br>الجانبية |
| 2 | Prednisolone       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allergy<br/>0.5 - 1 mg/kg</li> <li>Immunosuppression<br/>1 - 2 mg/kg</li> <li>Anti-inflammatory<br/>( dog 0.5mg/kg ,<br/>cat 0.5 - 1 mg/kg )</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Syrup :<br/>Predsol® Xilone®<br/>5mg<br/>Predsol forte®<br/>15mg<br/>Xilone forte®<br/>15mg</li> <li>Tablets<br/>Solupred 20mg<br/>Histacortin-H 5mg</li> </ul> |  |
| 3 | Alpha-chemotrypsin | 1 tab ( twice or triple )  | Alphentirn®<br>Ambezim-G®  | دول بقى عبارة عن أنزيمات و ليهم<br>تأثير مضاد للالتهاب خفيف<br>و بنستخدمهم في الحالات الي مش<br>هينفع استخدم فيها NSAIDs<br>و لازم يتأخذوا قبل الأكل بساعة<br>علشان حمض المعدة ميكسرهمش  |
| 4 | Alpha-amylase      | 1 - 5 ml/animal q 8 - 12h  | Maxilase®  | ده NSAIDs .. هو حلو أوي كا<br>خافض حرارة<br>و بيستخدم كا جرعة واحدة في<br>العيادة علشان أنزل الحرارة العالية<br>أوي<br>ميفضلش أستخدامه عن طريق الفم<br>أبدا علشان معدتهم حساسة ليه جدا<br>و بيحصلهم منه قرح  |
| 5 | Ketoprofen         | 2mg/kg s.c, i.v. i.m. q24h<br>1mg/kg p.o.q24h  | Ketofen® <ul style="list-style-type: none"> <li>Cap : 25, 50, 75,<br/>100, 200</li> <li>Amp : 100mg</li> <li>Syrup : 12.5mg</li> </ul>   | ده NSAIDs ... هو حلو أوي كا<br>مضاد التهاب في حالات التهابات<br>العظم و الكدمات<br>برضه نفس التحذير يتأخذ حقن<br>أفضل علشان المعدة و لو أخذه عن<br>طريق الفم يبقى بعد الأكل و لمدة<br>متعديش الأسبوع   |
| 6 | Meloxicam          | Initial dose 0.2mg/kg<br>Maintenance dose<br>0.1mg/kg  | Mobic® Mobitil® <ul style="list-style-type: none"> <li>Tab : 7.5, 15 mg</li> <li>Amp : 15 mg</li> </ul>  |  |
| 7 | Paracetamol        | Dog : 10mg/kg p.o., i.v.<br>q12h<br>Cat : don't use  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paracetamol®<br/>syrup 250mg</li> <li>Perfalgan 500®<br/>vial</li> </ul>  |  |
| 8 | Piroxicam          | Dog : 0.3 mg/kg p.o.q24h   | Feldene ® <ul style="list-style-type: none"> <li>Tab. : 10, 20 mg</li> <li>Amp. : 20 mg</li> </ul>   |  |

( C ) Anti-histaminic

|   | Active Ingredient | Dose  | Trade Name                                      | Note               |
|---|-------------------|---|---|--------------------|
| 1 | Chlorphenamine    | Dog : 4-8mg/dog p.o.q8h<br>2.5-10mg/dog i.m,iv.q8h<br>Cat : 2-4mg/cat p.o.q8-12h<br>2-5mg/cat i.m,iv.q8-12h                   | Allergyl®<br>• Tab. : 4mg<br>• Syrup : 2mg      |                    |
| 2 | Clemastine        | 0.1 mg/kg p.o.q12h  | Tavagyl®<br>Tab. 1mg ,syrup 0.5mg ,<br>Amp. 2mg |                    |
| 3 | Loratadine        | 5 - 15 mg p.o.q24h  | Claritine®<br>Tab. : 10mg - Syrup : 5mg         | القطط<br>بتريل منه |
| 4 | Cetirizine        | Have 3 protocol :<br>1) 0.25mg/kg q12h<br>2) 5-10mg/animal q12h<br>3) 5mg/7kg q24h<br>10mg/7.1-17.5kg q24h<br>10mg/>18Kg q12h | Zyrtec®<br>• Tab. 10mg<br>• Syrup 5mg           |                    |

( D ) Anti-emetic

|   | Active Ingredient | Dose   | Trade Name  | Note  |
|---|-------------------|--|---|---|
| 1 | B. complex        | 1 amp. i.m.q12h                              | Cortigen B6® amp.   | و ده بقى بيستخدم في الحيوانات الصغيرة<br>اوي و الضعيفة ..... هو دواء تأثيره<br>ضعيف و نادر أستخدامة   |
| 2 | Domperidone       | 2-5mg/animal q8h                             | Motilium®<br>Motinourm®<br>• Syrup 5mg<br>• Tablet 10mg     | الدواء ده بيشتغل على ال CNS علشان كده<br>تأثيره قوي .... من عيوبه انم فيش منه حقن<br>و احنا في حالات الترجيع يفضل ندي حقن<br>علشان الحيوان ميرجعش الدواء .....<br>علشان كده انت ممكن تدي حقن في العيادة<br>و صاحب الحيوان يكمل بده في البيت ...<br>كمان تجنب استخدامه في الحيوانات المسنة<br>و الي عندها مشاكل في القلب |
| 3 | Metoclopramide    | 0.25-0.5mg/kg q12h<br>i.m., s.c., i.v., p.o. | Primpran®<br>• Syrup 5mg<br>• Tablet 10mg<br>• Ampoule 10mg | الدواء ده برضه بيشتغل على ال CNS....<br>ال Receptor بتاعته موجودة في الكلاب<br>اكثر علشان كده تأثيره أحلى في الكلاب ....<br>من عيوبه انه مبيتخدش في السن الصغير و<br>كمان بيعمل أعراض عصبية لو اتاخذ<br>بجرعة عالية   |
| 4 | Ondansetron       | 0.5mg/kg i.v.<br>0.5-1 mg/kg p.o.q12h        | Zofran® Dansit®<br>• Amp. 4mg & 8mg<br>• Tab. 8mg           | الدواء ده شغال CNS ... بس هنا بقى<br>ال Receptor أكثر في القطط علشان كده<br>هو أحلى في القطط .... مميزاته أنه أمن في<br>أمن الأستخدام في كل الأعمار و الحالات   |

( E ) Cough sedative, bronchodilator, Mucolytic and Antitussive

|   | Active Ingredient | Dose  | Trade Name  | Note  |
|---|-------------------|---|---|---|
| 1 | Herbal extract    | 2- 5 ml/animal p.o.q8-12h   | Guava ® syrup<br>Balsam ® syrup                                   | دي بقى مدنات للكحة و عبارة عن اعشاب   |
| 2 | Bromohexine       | Dogs : 3-15mg/dog i.m. q12h<br>2-2.5mg/kg p.o.q12h<br>Cats : 3mg/cat i.m. q24h<br>1mg/kg p.o.q24h | Bisolvon®<br>• Syrup 4mg<br>• Tab. 8mg<br>• Amp. 4mg              | ده بقى مذييب للبلغم جميل اوي .... و الأكثر استخداما كمان  |
| 3 | Acetylcysteine    | 50mg/kg p.o.q8h   | Acetylcysteine® sachets   | ده بقى مذييب للبلغم برضو .... بس كمان بيستخدم في حالات التسمم بالParacetamol في القطط                                     |
| 4 | Salbutamol        | Dog: 100-300 ug/dog q4-6h<br>Cat: 100 ug/cat q4-6h  | Ventolin®<br>• Inhaler<br>• tab 2mg<br>• syrup 2mg<br>• amp 0.5mg | موسع شعب جميل اوي بيستخدم في الحالات التنفسية و البخاخة تكون معاك في العيادة او في الشنطة علشان تستخدمها في حالات الطوارئ |
| 5 | Terbutaline       | Dog: 1.25-5mg/dog p.o.q8-12h<br>Cat : 0.312-1.25mg/cat p.o.q8-12h                                 | Aironyl®<br>• Tab 2.5mg<br>• Syrup 1.5mg                          | دول برضه موسعات شعب بس نادر استخدمها لانها مش بتكون متوفرة دايما في الصيدليات .... بتكون متوفرة في المستشفيات             |
| 6 | Theophylline      | Dog : 15-20mg/kg p.o.q12-24h<br>Cat : 10mg/kg p.o.q24h  | Etaphylline®<br>• Amp. 500mg<br>• Syrup 125mg                     |   |

( H ) Laxatives

|   | Active Ingredient | Dose   | Trade Name                           | Note   |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1 | Docusate sodium   | Dog : 50-100mg p.o.q 12-12h<br>10-15ml of 5% soln. rectal<br>Cat : 50mg p.o.q 12-12h<br>2ml of 5% soln. rectal | Egycusate ® syrup                    | معظم المليينات هنا ملهاش اثار جانبية ... كمان فترة العلاج بتقف اول لما البراز ينتظم ... و أحسنهم طبعا اللاكتيلوز |
| 2 | Lactulose         | Dog : 5 -15ml p.o.q8h<br>Cat : 0.5-5ml p.o.q24h  | Lactulose ® syrup                    |  |
| 3 | Paraffin          | Dog : 1-2 tbsp per meal<br>Cat : 10 mm p.o.q12-24h "kitten"<br>25 mm p.o.q12-24h "adult"                       | Paraffin oil                         |  |
| 4 | Phosphate enema   | Dog : 60 -118 /dog (5-10kg)<br>128 ml /dog (>10kg)<br>Cat : Do not use .                                       | Phosphate enema®<br>Enema ® Enemax ® | دي بقى أوعى تستخدمها لا كلاب و لا قطط بالذات لأنها بتموت   |

( F ) Antacids

|   | Active Ingredient  | Dose   | Trade Name   | Note   |
|---|--------------------|--|--|--|
| 1 | Aluminium antacids | 0.5-1 ml/kg p.o.q6-8h  | Mucogel® Epicogel® syrup   | ذهب يستخدم كإعلاج مساعد في الحالات الخفيفة أو الحالات في فترة النقاهة  |
| 2 | Rantidine          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dogs : 2mg/kg i.v., i.m., s.c., p.o.q8-12h</li> <li>Cats : 2.5mg/kg i.v. q12h</li> <li>3.5mg/kg p.o.q12h</li> </ul> | Ranitack® Rani® <ul style="list-style-type: none"> <li>Tab 75, 150 mg</li> <li>Amp. 50 mg</li> </ul> Noerosive® <ul style="list-style-type: none"> <li>Syrup 75mg</li> </ul> | الدواء الرسمي لعلاج الحموضة تأثيره ممتاز .... يثقل $H_2$ receptor بتأثيره حمض المعدة خذ بالك ان من أعراضه الجانبية انه يعمل هبوط . يستخدم كمان في بعض حالات التسمم |
| 3 | Famotidine         | 0.5-1 mg/kg p.o.q12-24h  | Antodine® <ul style="list-style-type: none"> <li>Tab. 20mg, 40mg</li> <li>Amp. 20mg</li> </ul>   | دواء مماثل للرانتيدين بالظبط و يعتبر بديل له .... بس تأثيره أخف شوية من الرانتيدين   |
| 4 | Omeprazole         | Dog : 0.5-1.5 mg/kg i.v., p.o.q24h<br>Cat : 0.75-1 mg/kg i.v., p.o.q24h  | Risek® <ul style="list-style-type: none"> <li>Cap. 10,20,40 mg</li> <li>Vial. 40 mg</li> </ul>   | ده بقى يثقل ال Pump بتأثيره حمض نفسها ... تأثيره حلو جدا في حالات البارفو ... و يعتبر أقوى من الرانتيدين   |
| 5 | Pantoprazole       | 0.7-1 mg/kg i.v.q24h   | Controloc® Pantoloc® <ul style="list-style-type: none"> <li>Tab. 20, 40 mg</li> <li>Vials 40mg</li> </ul>  | ده شكل ثاني زي الأمبيرازول بالظبط  |

( G ) Anti-diarrheal

|   | Active Ingredient          | Dose   | Trade Name   | Note  |
|---|----------------------------|--|--|---|
| 1 | Kaolin                     | 0.5-1ml/kg p.o.q6-8h as a total daily dose   | Kapect® syrup  | ده يستخدم في الحيوانات الصغيرة و حالات لين البراز الخفيفة   |
| 2 | Metronidazole              | Dog<br>15-25mg/kg p.o.q12h<br>10mg/kg s.c., i.v. q12h<br>Cat<br>8-10mg/kg i.v., p.o.q12h | Flagy ®<br>Syrup 125mg<br>Tab. 250, 500 mg<br>Vial 500mg<br>Flagelat ® 200mg syrup | ده بقى مضاد للوليات و يستخدم في حالات الاسهال الشديدة و الناتجة عن تغيير الأكل .... لأن تغيير الأكل بيغير ال pH بتأثيره الأمعاء و بالتالي بيخلي ال pathogenic protozoa تنشط بس خذ بالك ان لو الجرعة زادت الاسهال هيزيد كمان متديهوش لفترة أكثر من اسبوع |
| 3 | Sulphonamide/ Trimethoprim | 15mg/kg p.o.q12h   | Kapect compound ® 120mg syrup  | ده استخدامه في حالات التسمم الغذائي او حالات تعفن المعدة .... بس متديهوش لفترات طويلة علشان بيأثر على العين و يعمل Keratoconjunctivitis sicca (KCS)   |

|   |              |                  |                                  |   |
|---|--------------|------------------|----------------------------------|---|
| 4 | Nifuroxazide | 4.4mg/kg p.o.q8h | Antinal ®<br>Cap. , Syrup. 200mg | ذهب يستخدم في حالات الاسهالات<br>المصاحبة لعدوى بكتيرية .... يعني<br>الحرارة تبقى عالية |
|---|--------------|------------------|----------------------------------|---|

## ( I ) Anti-hemorrhage

|   | Active Ingredient | Dose  | Trade Name  | Note  |
|---|-------------------|---|---|---|
| 1 | Ethamsylate       | Empirical dose<br>Tab. 1 tab p.o.q8-24h<br>Amp. 1 amp q8-24h i.v., i.m. | Dicynone® Haemostop®<br>• Tab 250, 500 mg<br>• Amp 250 mg | دي بقى انت بتحدد جرعتها على<br>حسب شدة النزيف ألي قدامك |

## ( J ) Supplements and Vitamins

|   | Active Ingredient | Dose  | Trade Name   | Note  |
|---|-------------------|---|--|---|
| 1 | Vit. B complex    | Dog : s.c.,i.m.,i.v. q24h<br>• 1 ml/dog (up to 15 kg)<br>• 2-4 ml/dog (> 15 kg )<br>Cat :<br>• 1 ml/cat s.c.,i.m.,i.v. q24h | Epicozyme® syrup<br>Becozyme® amp<br>B.com® amp<br>Neurotone® tab, amp<br>Levabion® amp.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• متستخدم اي فيتامينات لو شكيت في وجود ديدان او عدوى بكتيريا لأنها ممكن تستخدم الفيتامينات دي و الوضع يسوء</li> <li>• فيتامينات B مفيهاش مشكلة لو زادت لأنها بتذوب في الميه و الزيادة منها بيتطرد برة الجسم فوراً</li> <li>• أي حاجة فيها فيتامينات A,D,E متديهاش بجرعة كبيرة ولا لفترة اكر من شهر علشان دي بتذوب في الدهون و ممكن تعمل تسمم تراكمي</li> </ul> |
| 2 | Vit. B12          | Dog : 0.25-1mg/dog q7d<br>Cat : 0.125-0.25mg/cat q7d  | Milga® tab<br>Depovit-B12® amp.<br>Betolvex® amp.  |   |
| 3 | Multivitamin      | Empirical dose<br>Dog : 1 - 5 ml/dog q12-24h<br>Cat : 0.5 - 3 ml/cat q24h   | Multisanistol Ca ®<br>Multisanistol Iron®<br>Totavit ® syrup<br>Sansovit iron® syrup<br>Sansovit Ca® syrup<br>Halorang ® syrup |   |
| 4 | Mineral           | Empirical Dose<br>Cat : 0.3 - 0.6 sachets/cat<br>Dog : 1-3 sachets/dog  | Hydrosafe® sachets<br>Hydran® sachets  | دي بقى بتذوب الكيس على كمية كبيرة من الميه علشان الحيوان يستلطف طعمها و يشربها بنفسه  |
| 5 | Calcium (inj)     | Dog : 50-150mg/kg<br>Cat : 49-140mg/kg  | Cal-Bor-Mag ®<br>Cal-Di-Mag®   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• متستخدم الكالسيوم في الحال تالي حرارتها عالية لأنه بيرفع درجة الحرارة .... إلا في حالة واحدة بس إلى هي Eclampsia</li> <li>• خد بالك و انت بتستخدم الحق الوريد تكون تنقيط بطيء اوي علشان بتأثر على القلب</li> </ul>   |
| 6 | Calcium (oral)    | Dog : 5-22mg/kg q8-24h<br>Cat : 10-25mg/kg q8-24h   | Osteocare®<br>tab,syrup<br>Decal-B12® syrup<br>Hi-cal® syrup   |   |

( K ) Antifungal

|   | Active Ingredient | Dose  | Trade Name                              | Note  |
|---|-------------------|---|---|---|
| 1 | Fluconazole       | Dog : 2.5-5 mg/kg q12h<br>Cat : 50-100mg/cat q12h | Diflucan® cap 150mg                     | ده بقى الصيت ولا الغنى ... أولا<br>تأثيره ضعيف على الفطريات و<br>كمان ليه آثار جانبية شديدة على الكبد |
| 2 | Itraconazole      | 5mg/kg p.o.q24h ( 4-20 w)<br>(week on - week off) | Itraconazole® tab<br>Itrapex® 100mg cap | ده بقى Drug of choice<br>للفطريات و كمان تأثيره على الكبد<br>مش كبير                                  |
| 3 | Terbinafine       | 20-40mg/kg p.o.q24h<br>(week on - week off)       | Lamasil® Lamafin®<br>125 , 250 tab      | ده تأثيره حلو جدا برضه و الأقراص<br>سهل تطبط الجرعة بتاعتها<br>عيبه الوحيد انه غالى شوية              |

( M ) Eye preparation

|   | Active Ingredient              | Dose         | Trade Name                                      | Note |
|---|--------------------------------|--------------|---|------|
| 1 | Antibiotic                     | 1drop q6-12h | Tobrin® Ciprocine® Tobrex® oint, drops          |      |
| 2 | Antibiotic + anti-inflammatory |              | Tobradex® Isoptomaxitrol® Orchadoxaline ® drops |      |
| 3 | Anti-inflammatory              |              | Isopotomixidex ® Fluca ® drops                  |      |
| 4 | Artificial tears               |              | Artelac® drops                                  |      |
| 5 | Eye refreshers                 |              | Polyfresh® Hifresh® drops                       |      |

( N ) Ear preparation

|   | Active Ingredient              | Dose   | Trade Name                    | Note |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------|------|
| 1 | Antibiotic + anti-inflammatory | Dog: 3-4 drops q 8-12h<br>Cat: 1-2 drops q 8-12h | Otal® drops<br>Otosept® drops |      |
| 2 | Anti-fungal                    |  | Viotec® drops                 |      |
| 3 | Anti-wax                       | 1-2 drops q12h/ 5day                             | Remowax® drops                |      |

( O ) Topical Preparation

|   | Active Ingredient              | Dose  | Trade Name  | Note |
|---|--------------------------------|---|---|------|
| 1 | Antibiotic                     | Apply 2-3 time/day                                | Fucidin ® cream<br>Bivetracin ® spray<br>OXY-G® spray بيطري |      |
| 2 | Anti-inflammatory              |   | Pandermal ® cream<br>Panthinol ® cream                      |      |
| 3 | Antibiotic + anti-inflammatory |   | Fucicort ® cream<br>Kenacomb ® cream<br>Mixderm ® cream     |      |
| 4 | Healing promoter               |   | Healsol® spray<br>Iurexoul® cream                           |      |
| 5 | Skin anti-septic               | يخفف بالماء (9:1) ويستخدم من مرة ل مرتين في اليوم | Cyteal® soln  |      |
| 6 | Skin anti-fungal               | Apply 2-1 time/day                                | Lamasil® spray, cream<br>Terbin® spray                      |      |
| 7 | Vaginal douche                 | Apply 1-2 time/day                                | Betadine vag.douche   |      |