

TD: Série N°1

Exercice 1.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ par:

$$f_n(x) = \frac{1}{n} E(nx),$$

où $E(nx)$ désigne la partie entière du nombre réel nx .

Montrer que f_n est une fonction en escalier sur $[0, 1]$ et calculer $\int_0^1 f_n(x) dx$.

2. Montrer que la fonction f définie par $f(x) = \ln(x)$ est Riemann-intégrable sur l'intervalle $I = [1, \alpha]$ avec $\alpha > 1$.

3. Montrer que la fonction $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{p}{q} \text{ avec } \text{pgcd}(p, q) = 1, \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \text{ ou } x = 0, \end{cases}$$

est Riemann-intégrable sur $[0, 1]$.

Exercice 2.

1. La fonction $f : [1, \frac{7}{3}]$, définie pour $1 \leq x \leq \frac{7}{3}$, par:

$$f(x) = E(x),$$

possède-t-elle une fonction primitive sur l'intervalle $[1, \frac{7}{3}]$?

2. Peut-on cependant calculer $\int_1^{\frac{7}{3}} f(x) dx$?

Exercice 3.

Soit $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, la fonction définie pour $0 \leq x \leq 1$, par:

$$\phi(x) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } 0 < x \leq 1, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que la fonction ϕ est dérivable sur $[0, 1]$ et pour tout $x \in [0, 1]$, calculer $\phi'(x)$.
2. Montrer que la fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, définie pour tout $x \in [0, 1]$ par

$$f(x) = \phi'(x),$$

possède une primitive sur l'intervalle $[0, 1]$, mais que f n'est pas bornée. Conclusion?

Exercice 4 (Inégalité de Minkowski).

Soient f et g deux fonctions intégrables sur $[a, b]$. Montrer que

$$\sqrt{\int_a^b (f(x) + g(x))^2 dx} \leq \sqrt{\int_a^b (f(x))^2 dx} + \sqrt{\int_a^b (g(x))^2 dx}.$$

Exercice 5.

1. Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$. Vérifier que si $x \in [a, b]$, alors $a + b - x \in [a, b]$.
2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que pour tout élément $x \in [a, b]$, on ait:

$$f(a + b - x) = f(x).$$

Montrer que

$$\int_a^b x f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

3. Calculer l'intégrale $\int_0^\pi \frac{x \sin(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$.

Exercice 6.

En utilisant les sommes de Riemann, calculer les limites des suites suivantes:

$$\begin{array}{lll} 1. u_n = \sum_{k=0}^{2n-1} \frac{1}{2n+3k}. & 4. u_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{\pi}{k}. & 7. u_n = n^2 \prod_{k=1}^n k^{-\frac{4k}{n^2}}. \\ 2. u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \cos^2\left(\frac{k\pi}{n}\right). & 5. u_n = \sum_{k=n}^{2n} \sin\left(\frac{\pi}{k}\right). & 8. u_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2 - k^2}}. \\ 3. u_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n^2 - k^2}}{n^2}. & 6. u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n + k^2}{n^3 + k^3}. & 9. u_n = n \sum_{k=1}^n \frac{e^{-\frac{n}{k}}}{k^2}. \end{array}$$

Exercice 7.

En utilisant les primitives usuelles, déterminer les primitives ou calculer les intégrales suivantes:

$$\begin{array}{lll} 1. \int_0^1 x(2x^2 + 4)^3 dx. & 4. \int \frac{e^{\arctan(x)}}{1+x^2} dx. & 7. \int_0^2 |x^2 - 3x + 2| dx. \\ 2. \int (x + \sqrt{x})^2 dx. & 5. \int \frac{\cos(\ln(x))}{x} dx. & 8. \int \frac{dx}{x\sqrt{1-\ln^2(x)}}. \\ 3. \int_1^e \frac{dx}{x \ln(3x)}. & 6. \int_0^x \frac{e^t}{1+e^{2t}} dt. & 9. \int \frac{\cos(x) - \sin(x)}{1+\cos^2(x)} dx. \end{array}$$

Exercice 8.

1. En utilisant une intégration par parties, calculer les intégrales suivantes:

$$(a) \int_1^e \frac{\ln(t)}{t} dt. \quad (b) \int_0^\pi t^2 \cos(t) dt. \quad (c) \int_0^1 \arctan(t) dt. \quad (d) \int_1^e \sin(\ln(t)) dt.$$

2. Pour $n \geq 1$, on pose

$$I_n = \int_0^\pi e^{-nx} \sin(x) dx \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^\pi e^{-nx} \cos(x) dx.$$

(a) En intégrant par parties de deux façons différentes, établir que, pour tout $n \geq 1$,

$$I_n = 1 + e^{-n\pi} - nJ_n \quad \text{et} \quad I_n = \frac{1}{n} J_n.$$

(b) En déduire les valeurs de I_n et J_n .

Exercice 9.

En effectuant un changement de variables, déterminer les primitives ou calculer les intégrales suivantes:

$$\begin{array}{ll} 1. \int \frac{dx}{x(\ln^2(x)-4)}. & 6. \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+4x-3}}. \\ 2. \int \frac{\sin(x)}{(\cos^2(x)+2\cos(x)+5)^2} dx. & 7. \int \frac{dx}{x+\sqrt{x-1}}. \\ 3. \int \frac{e^{3x}+6e^{2x}-e^x}{(e^x-3)^2(e^x-1)} dx. & 8. \int_1^2 \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx. \\ 4. \int \sqrt{x^2+2x+2} dx. & 9. \int \frac{\cos(x)}{\sin^2(x)+2\tan^2(x)} dx. \\ 5. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x}}. & \end{array}$$

Exercice 10.

Calculer les primitives suivantes:

$$\begin{array}{l} 1. \int_0^x \frac{1}{a+b\cos^2(t)} dt \text{ avec } a, b > 0. \\ 2. \int_0^x \frac{1}{\sin^2(t)+3\cos^2(t)} dt. \\ 3. \int 0^x \frac{t^2}{(t\sin(t)+\cos(t))^2} dt. \end{array}$$