

به نام خدا

محاسبات عددی

تمرین سوم

بهار ۹۹

فرشته فرقانی ۹۶۱۰۲۱۰۴

-۱

الف) برای محاسبه چند جمله‌ای درونیاب لاگرانژ داریم:

0	0.6	0.9
1	0.8253	0.6216

$$L_0 = \frac{(x - 0.6)(x - 0.9)}{(0 - 0.6)(0 - 0.9)}$$

$$L_1 = \frac{(x - 0)(x - 0.9)}{(0.6 - 0)(0.6 - 0.9)}$$

$$L_2 = \frac{(x - 0)(x - 0.6)}{(0.9 - 0)(0.9 - 0.6)}$$

$$\Rightarrow p_2(x) = 1L_0 + 0.8253L_1 + 0.6216L_2$$

$$\Rightarrow p_2(x) = -0.430926x^2 - 0.0326111x + 1$$

حال با جایگذاری ۰.۴۵ در معادله داریم:

$$f(0.45) = p_2(0.45) = 0.90008749$$

ب) برای محاسبه خطای مطلق عبارت مقابل را با عبارت $|\cos(0.45) - p_2(0.45)|$ محاسبه می‌کنیم.

$$|\cos(0.45) - p_2(0.45)| = 0.00035961235$$

ج) برای محاسبه کران بالای خطا داریم:

$$\epsilon_n \leq (x - x_0) \dots (x - x_n) \frac{f^{n+1}(t)}{(n+1)!}$$

حال باید t مناسب را با این شرط که $t = \text{minimize } |f^{n+1}(x_i)|$ به دست آوریم. با توجه به آنکه $n = 2$:

$$f(x) = \cos(x) \Rightarrow f^3(x) = \sin(x)$$

$$\Rightarrow t = 0.9$$

پس کران بالای خطا برابر است با:

$$\epsilon_n \leq (0.45 - 0)(0.45 - 0.6)(0.45 - 0.9) \frac{\sin(0.9)}{3!} = 0.030375 \times \frac{0.78332690962}{6} = 0.00396559247$$

-۲

الف) با استفاده از ستون‌های دوم و سوم و چهارم داده‌ها ضرایب L_0, L_1, L_2 را حساب کرده و در فرمول جایگذاری می‌کنیم. به دست می‌آید:

$$p_2(x) = 0.3766x^2 + 17.733x + 12.05$$

حال با جایگذاری ۱۶ در عبارت بالا داریم:

$$p_5(16) = v(16) = 392.1877$$

ب) در روش تفاضلات تقسیم شده نیوتون $p(x)$ به صورت زیر به دست می‌آید:

$$p(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + [a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})]$$

حال a_i ها را حساب می‌کنیم:

$f[x_0] = 0 = a_0$			
$f[x_1] = -2.5$	$f[x_0, x_1] = -2.5 = a_1$		
$f[x_2] = -2$	$f[x_1, x_2] = 0.5$	$f[x_0, x_1, x_2] = 1.5 = a_2$	
$f[x_3] = 13.5$	$f[x_2, x_3] = 15.5$	$f[x_1, x_2, x_3] = 7.5$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = 2 = a_3$

پس داریم:

$$p(x) = 0 - 2.5x + 1.5x(x - 1) + 2x(x - 1)(x - 2) = (-2.5)x + 1.5x^2 - 1.5x + 2x^3 - 6x^2 + 4x = 2x^3 - 4.5x^2$$

برای به دست آوردن مینیمم $f(x)$ ، عبارت $p'(x)$ را محاسبه کرده و ریشه‌های آن را در می‌آوریم:

$$p'(x) = 6x^2 - 9x$$

$$p'(x) = 0 \implies x = 0, x = 1.5$$

$$p(0) = 0, \quad p(1.5) = -\frac{27}{8}$$

پس مینیمم $f(x)$ در بازه $[0, 3]$ در $x = 1.5$ اتفاق می‌افتد که مقدار آن -3.375 است. $-\frac{27}{8}$

-۳

الف) P_c و P_d را دو چند جمله‌ای در نظر می‌گیریم به طوری که P_c چند جمله‌ای درونیاب برای f در x_0, \dots, x_n و P_d چند جمله‌ای درونیاب برای f در x_{i_0}, \dots, x_{i_n} به عبارتی:

$$P_c = c_0 + c_1(x - x_0) \dots + [c_n(x - x_0) \dots (x - x_{n-1})]$$

$$P_d = d_0 + d_1(x - x_{i_0}) \dots + [d_n(x - x_{i_0}) \dots (x - x_{i_{n-1}})]$$

$$\Rightarrow P_c = c_n x^n + \text{lower order terms}$$

$$P_d = d_n x^n + \text{lower order terms}$$

حال چون این چند جمله‌ای‌ها با روش تفاضلات تقسیم شده نیوتون حساب شده اند پس:

$$P_c = f[x_0, \dots, x_n] x^n + \text{lower order terms}$$

$$P_d = f[x_{i_0}, \dots, x_{i_n}] x^n + \text{lower order terms}$$

حال از آنجایی که دو چند جمله‌ای برابرند پس:

$$c_n = d_n$$

$$\Rightarrow f[x_0, \dots, x_n] = f[x_{i_0}, \dots, x_{i_n}]$$

ب) می‌دانیم:

$$f[x_0, \dots, x_n, x] = f[x, x_0, \dots, x_n] = \frac{f[x, x_0, \dots, x_{n-1}] - f[x_0, \dots, x_n]}{x - x_n}$$

$$\Rightarrow f[x, x_0, \dots, x_{n-1}] = f[x_0, \dots, x_n] + (x - x_n) f[x_0, \dots, x_n, x]$$

به طور مشابه داریم:

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0) f[x, x_0]$$

$$f[x, x_0] = f[x_0, x_1] + (x - x_1) f[x, x_0, x_1]$$

$$\Rightarrow f(x) = p_1(x) + (x - x_0)(x - x_1) f[x, x_0, x_1]$$

اگر همین روال را ادامه دهیم داریم:

$$f(x) = p_n(x) + (x - x_0) \dots (x - x_n) f[x, x_0, \dots, x_n]$$

$$\Rightarrow f[x, x_0, \dots, x_n] = \frac{f(x) - p(x)}{(x - x_0) \dots (x - x_n)}$$

می‌دانیم که طبق قضیه‌ای $f(x) - p(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n) \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}$ پس می‌توان نوشت:

$$f[x, x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}$$

ج) با استقرا این عبارت را اثبات می‌کنیم:

پایه استقرا:

$$n = 0 \Rightarrow f[x_0, x] = f[x, x_0]$$

فرض استقرا:

$$n = k - 1 \Rightarrow f[x_0, \dots, x_{k-1}, x] = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{f[x, x_i]}{\prod_{j=0, j \neq i}^{k-1} (x_i - x_j)}$$

حکم استقرا: $n = k$. با توجه قسمت الف این سوال می توانیم بنویسیم:

$$f[x_0, \dots, x_{k-1}, x_k, x] = f[x_0, \dots, x_{k-1}, x, x_k] = \frac{f[x_0, \dots, x_{k-1}, x] - f[x_1, \dots, x, x_k]}{x_0 - x_k}$$

$$= \frac{f[x_1, \dots, x_k, x] - f[x_0, \dots, x_{k-1}, x]}{x_k - x_0} (*)$$

با توجه به فرض استقرا هر یک از عبارات صورت را به صورت زیر می نویسیم:

$$\frac{f[x_1, \dots, x_k, x] - f[x_0, \dots, x_{k-1}, x]}{x_k - x_0} = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{f[x, x_i]}{\prod_{j=1, i \neq j}^k (x_i - x_j)} - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{f[x, x_i]}{\prod_{j=0, i \neq j}^{k-1} (x_i - x_j)}}{x_k - x_0}$$

$$= \frac{\frac{f[x, x_1]}{(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_k)} + \dots + \frac{f[x, x_k]}{(x_k - x_1) \dots (x_k - x_{k-1})} - \left(\frac{f[x, x_0]}{(x_0 - x_1) \dots (x_0 - x_{k-1})} + \dots + \frac{f[x, x_{k-1}]}{(x_{k-1} - x_0) \dots (x_{k-1} - x_{k-2})} \right)}{x_k - x_0}$$

با ساده کردن صورت داریم:

$$\frac{f[x_1, \dots, x_k, x] - f[x_0, \dots, x_{k-1}, x]}{x_k - x_0} = \frac{\sum_{i=1}^{k-1} \left[\frac{(x_k - x_0)f[x, x_i]}{\prod_{j=0, i \neq j}^k (x_i - x_j)} \right] - \frac{f[x, x_0]}{\prod_{j=1}^{k-1} (x_0 - x_j)} + \frac{f[x, x_k]}{\prod_{j=1}^{k-1} (x_k - x_j)}}{x_k - x_0}$$

$$= \sum_{i=1}^{k-1} \left[\frac{f[x, x_i]}{\prod_{j=0, i \neq j}^k (x_i - x_j)} \right] + \frac{f[x, x_0]}{\prod_{j=1}^k (x_0 - x_j)} + \frac{f[x, x_k]}{\prod_{j=0}^{k-1} (x_k - x_j)}$$

$$= \sum_{i=0}^k \frac{f[x, x_i]}{\prod_{j=0, i \neq j}^k (x_i - x_j)}$$

حکم استقرا ثابت شد.

x	1	3	4	5	7	8
y	14	11	7	10	15	13
x^2	1	9	16	25	49	64
x^3	1	27	64	125	343	512
x^4	1	81	256	625	2401	4096
xy	14	33	28	50	105	104
x^2y	14	99	112	250	735	832

حال سه معادله را طبق فرمول کمترین مربعات با $m = 2$ را می نویسیم:

$$6a_0 + 28a_1 + 164a_2 = 70$$

$$28a_0 + 164a_1 + 1072a_2 = 334$$

$$164a_0 + 1072a_1 + 7460a_2 = 2042$$

$$\Rightarrow a_0 = 16.76, \quad a_1 = -3.3892, \quad a_2 = 0.3923$$

$$\Rightarrow p(x) = 0.3923x^2 - 3.3892x + 16.76$$

-۵

الف) برای محاسبه تفاضلات پیش روی نیوتن ابتدا r را به روش زیر حساب می‌کنیم:

$$r = \frac{x - x_0}{h} \Rightarrow r = \frac{0.05 - 0}{0.2} = 0.25$$

سپس با r از به دست آمده را در فرمول زیر جایگذاری می‌کنیم:

$$p_n(x) = f_0 + r\Delta f_0 + \frac{r(r-1)}{2}\Delta^2 f_0 + \dots + \frac{r(r-1)\dots(r-n+1)}{n!}\Delta^n f_0$$

حال مقادیر $\Delta^i f_0$ ها را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$f_0 = 1$				
$f_1 = 1.2240$	$\Delta f_0 = 0.2214$			
$f_2 = 1.49182$	$\Delta f_1 = 0.27042$	$\Delta^2 f_0 = 0.04902$		
$f_3 = 1.82212$	$\Delta f_2 = 0.3303$	$\Delta^2 f_1 = 0.05988$	$\Delta^3 f_0 = 0.01086$	
$f_4 = 2.22554$	$\Delta f_3 = 0.40342$	$\Delta^2 f_2 = 0.07312$	$\Delta^3 f_1 = 0.01324$	$\Delta^4 f_0 = 0.00238$

حال با جایگذاری در معادله بالا داریم:

$$f(0.05) = p_n(0.05) = 1.0513$$

ب) برای محاسبه تفاضلات پس رو داریم:

$$r = \frac{x - x_n}{h} \Rightarrow r = \frac{0.65 - 0.8}{0.2} = (-0.75)$$

سپس با r از به دست آمده را در فرمول زیر جایگذاری می‌کنیم:

$$p_n(x) = f_n + r\Delta f_n + \frac{r(r+1)}{2}\Delta^2 f_n + \dots + \frac{r(r+1)\dots(r+n-1)}{n!}\Delta^n f_n$$

حال مقادیر $\Delta^i f_0$ ها را به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$f_0 = 1$	$\Delta f_1 = 0.2214$	$\Delta^2 f_2 = 0.04902$	$\Delta^3 f_3 = 0.01086$	$\Delta^4 f_4 = 0.00238$
$f_1 = 1.2240$	$\Delta f_2 = 0.27042$	$\Delta^2 f_3 = 0.05988$	$\Delta^3 f_4 = 0.01324$	
$f_2 = 1.49182$	$\Delta f_3 = 0.3303$	$\Delta^2 f_4 = 0.07312$		
$f_3 = 1.82212$	$\Delta f_4 = 0.40342$			
$f_4 = 2.22554$				

حال با جایگذاری در معادله بالا داریم:

$$f(0.65) = p_n(0.65) = 1.9156$$

۶-

الف) می‌دانیم که $p(x)$ به دست آمده از روش‌های مختلف درونیایی یکتاست. حال چون $f(x)$ خود یک چند جمله‌ای از درجه k است پس $p(x_i) = f(x_i)$. حال در روش تفاضلات تقسیم‌شده داریم:

$$p(x_i) = f(x_i) = c_0 + c_1(x_i - x_0) \dots + [c_n(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{n-1})]$$

پس ضریب x_i^n در این چند جمله‌ای برابر با $f[x_0, \dots, x_n]$ است. حال چون p از درجه k است پس ضریب این جمله در p صفر است پس:

$$f[x_0, \dots, x_n] = 0 \quad \text{for } n > k$$

(ب)

.a

می‌دانیم که $p(x)$ به دست آمده از روش‌های مختلف درونیایی یکتاست. حال چون $f(x)$ خود یک چند جمله‌ای از درجه $n+1$ است پس $p(x_i) = f(x_i)$. حال در روش تفاضلات تقسیم‌شده داریم:

$$p(x_i) = f(x_i) = a_0 + a_1(x_i - x_0) \dots + [a_n(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{n-1})]$$

$$\Rightarrow x_i^{n+1} = a_0 + a_1(x_i - x_0) \dots + [a_{n+1}(x_i - x_0) \dots (x_i - x_n)]$$

پس ضریب x_i^{n+1} در این چند جمله‌ای برابر با $f[x_0, \dots, x_{n+1}]$ است پس:

$$f[x_0, \dots, x_{n+1}] = 1$$

.b

می‌دانیم:

$$f[x_0, \dots, x_{n+1}] = \frac{f[x_0, \dots, x_n] - f[x_1, \dots, x_{n+1}]}{x_0 - x_n}$$

$$\Rightarrow f[x_0, \dots, x_n] = f[x_1, \dots, x_{n+1}] + (x_0 - x_n)f[x_0, \dots, x_{n+1}]$$

به طور مشابه داریم:

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x, x_0]$$

$$f[x, x_0] = f[x, x_0] + (x - x_1)f[x, x_0, x_1]$$

$$\Rightarrow f(x) = p_1(x) + (x - x_0)(x - x_1)f[x, x_0, x_1]$$

اگر همین روال را ادامه دهیم داریم:

$$f(x) = p_n(x) + (x - x_0) \dots (x - x_n)f[x, x_0, \dots, x_n]$$

$$\Rightarrow p_n(x) = f(x) - (x - x_0) \dots (x - x_n)f[x, x_0, \dots, x_n]$$

$$f(x) = x^{n+1} \quad \text{and} \quad f[x, x_0, \dots, x_{n+1}] = 1$$

$$\Rightarrow p_{n+1}(x) = x^{n+1} - (x - x_0) \dots (x - x_n)$$