

MÓDULO 07 • UNIDAD 1.5

Valores de referencia de ingesta de nutrientes

Módulos e-learning sobre cobertura, consumo y contribución de alimentos fortificados y fortificables

Objetivos de aprendizaje

1

Diferenciar los valores de referencia de ingesta y su finalidad.

2

Seleccionar el valor adecuado para cada tipo de análisis poblacional.

3

Justificar y citar la fuente de los valores utilizados.

Tipos de valores de referencia

EAR

Cubre al 50 % del grupo. Evalúa la prevalencia de ingesta inadecuada.

INR / RDA

Cubre al 97–98 %.
Meta para individuos; no se usa como punto de corte.

Ingesta adecuada (AI)

Se usa cuando no hay EAR, por ejemplo en lactantes.

UL

Límite superior de ingesta segura. Evalúa el riesgo de exceso.

Fuentes

1

Organismos internacionales

FAO y OMS; Institute of Medicine (Estados Unidos); EFSA; Codex Alimentarius.

2

Instituciones nacionales y regionales

Ministerios de salud e institutos de nutrición.

3

Regulación alimentaria

Valores de referencia para el etiquetado nutricional.

Uso en el análisis de encuestas de hogares

Qué permite

- Comparar la ingesta aparente con el EAR
- Identificar subgrupos en riesgo
- Evaluar escenarios de fortificación contra el UL

Qué exige

- Valores por grupo de edad, sexo y estado fisiológico
- Coherencia entre la fuente de los valores y la unidad de análisis (EMA)
- Declarar y justificar la fuente

Referencias

Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: applications in dietary assessment. Washington, DC: National Academy Press; 2000. doi:10.17226/9956

OMS, FAO. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. 2.^a ed. Ginebra: OMS; 2004.

Allen L, de Benoist B, Dary O, Hurrell R, editores. Guidelines on food fortification with micronutrients. Ginebra: OMS; FAO; 2006.

Siguiente: Módulo 08 • Tablas de composición de alimentos