

第2节 直线与圆的位置关系 (★★)

内容提要

1. 判断直线 $l: Ax + By + C = 0$ 与圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 的位置关系的步骤:

① 计算圆心 $C(a, b)$ 到直线 l 的距离 d ;

② 将 d 和 r 进行比较: 若 $d > r$, 则直线和圆相离, 它们没有交点, 如图 1; 若 $d = r$, 则直线和圆相切, 它们有 1 个交点, 如图 2; 若 $d < r$, 则直线和圆相交, 它们有 2 个交点, 如图 3.




图1




图2




图3




图4

2. 当直线与圆相交时, 如上图 4, 两个交点之间的线段长度, 称为直线被圆截得的弦长, 计算的步骤是:

① 计算圆心 C 到直线 l 的距离 d ; ② 弦长 $|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$.

典型例题

类型 I: 判断直线与圆的位置关系

【例 1】直线 $y = x + 6$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0$ 的位置关系是 ()

(A) 相离 (B) 相切 (C) 相交且过圆心 (D) 相交且不过圆心

解析: $y = x + 6 \Rightarrow x - y + 6 = 0$, $x^2 + y^2 - 2y - 4 = 0 \Rightarrow x^2 + (y-1)^2 = 5$,

圆心 $(0, 1)$ 到直线 $x - y + 6 = 0$ 的距离 $d = \frac{|-1+6|}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} > \sqrt{5}$, 所以直线与圆相离.

答案: A

【变式 1】对任意的实数 k , 直线 $l: kx - y - 4k + 3 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$ 的位置关系是 ()

(A) 相交 (B) 相切 (C) 相离 (D) 与 k 有关

解析: 直线 l 含参, 先看它是否过定点, $kx - y - 4k + 3 = 0 \Rightarrow k(x-4) - (y-3) = 0 \Rightarrow l$ 过定点 $P(4, 3)$,

注意到 $4^2 + 3^2 - 6 \times 4 - 8 \times 3 + 21 = -2 < 0$, 所以点 P 在圆 C 内部, 故 l 与圆 C 始终相交.

答案: A

【反思】判定含参直线与圆的位置关系, 除了直接比较 d 与 r 外, 往往还可以通过判断直线是否过定点来得出结论.

【变式 2】(2021 · 新高考 II 卷) (多选) 已知直线 $l: ax + by - r^2 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$, 点 $A(a, b)$, 则下列说法正确的是 ()

(A) 若点 A 在圆 C 上, 则直线 l 与圆 C 相切
(B) 若点 A 在圆 C 内, 则直线 l 与圆 C 相离

(C) 若点 A 在圆 C 外, 则直线 l 与圆 C 相离

(D) 若点 A 在直线 l 上, 则直线 l 与圆 C 相切

解析: 直线 l 不过定点, 故只能比较 d 和 r , 先把 d 算出来, 由题意, $d = \frac{|-r^2|}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{r^2}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ①,

A 项, 点 A 在圆 C 上 $\Rightarrow a^2+b^2=r^2$, 代入①得 $d = \frac{r^2}{\sqrt{r^2}} = r \Rightarrow l$ 与圆 C 相切, 故 A 项正确;

B 项, 点 A 在圆 C 内 $\Rightarrow a^2+b^2 < r^2$, 结合①得 $d > \frac{r^2}{\sqrt{r^2}} = r \Rightarrow l$ 与圆 C 相离, 故 B 项正确;

C 项, 点 A 在圆 C 外 $\Rightarrow a^2+b^2 > r^2$, 结合①得 $d < \frac{r^2}{\sqrt{r^2}} = r \Rightarrow l$ 与圆 C 相交, 故 C 项错误;

D 项, 点 A 在 l 上 $\Rightarrow a^2+b^2-r^2=0 \Rightarrow a^2+b^2=r^2$, 代入①得 $d = \frac{r^2}{\sqrt{r^2}} = r \Rightarrow l$ 与圆 C 相切, 故 D 项正确.

答案: ABD

类型 II: 用垂径定理计算弦的方程

【例 2】若圆 $C: x^2+y^2-2x+4y+1=0$ 的弦 MN 的中点为 $A(2,-3)$, 则直线 MN 的方程是 ()


(A) $2x-y-7=0$ (B) $x-y-5=0$ (C) $x+y+1=0$ (D) $x-2y-8=0$

解析: $x^2+y^2-2x+4y+1=0 \Rightarrow (x-1)^2+(y+2)^2=4 \Rightarrow$ 圆心为 $C(1,-2)$,

在圆中涉及弦中点, 想到垂径定理, 如图, A 为弦 MN 的中点, 所以 $AC \perp MN$,

因为 $k_{AC} = \frac{-3-(-2)}{2-1} = -1$, 所以 $k_{MN} = 1$, 故直线 MN 方程是 $y-(-3)=x-2$, 整理得: $x-y-5=0$.

答案: B




类型 III: 直线被圆截得的弦长

【例 3】直线 $l: x-y+2=0$ 被圆 $C: x^2+(y-1)^2=4$ 截得的弦长为_____.

解析: 涉及圆的弦长, 一般在如图所示的蓝色直角三角形中由勾股定理来算, 下面先求 d ,

圆心 $C(0,1)$ 到直线 l 的距离 $d = \frac{|-1+2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以弦长 $|AB| = 2\sqrt{r^2-d^2} = 2\sqrt{4-\frac{1}{2}} = \sqrt{14}$.

答案: $\sqrt{14}$




【变式】(2022·天津卷) 若直线 $x-y+m=0 (m>0)$ 与圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=3$ 相交所得的弦长为 m ，则 $m=$ _____.

解析：涉及圆的弦长，先算 d ，如图，圆心为 $C(1,1)$ ，半径 $r=\sqrt{3}$ ， $d=\frac{|1-1+m|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{|m|}{\sqrt{2}}$ ，

所以直线与圆相交所得弦长 $|AB|=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{3-\frac{m^2}{2}}$ ，由题意， $2\sqrt{3-\frac{m^2}{2}}=m$ ，解得： $m=2$ 。

答案：2



《一数·高考数学核心方法》

【反思】从例3和它的变式可以看出，求弦长基本都会转化到点到直线的距离 d 上来。

类型IV：由直线与圆的位置关系求参数范围

【例4】直线 $l: y=kx+1-2k$ 与函数 $y=\sqrt{1-x^2}$ 的图象有2个公共点，则 k 的取值范围为 ()

- (A) $k>\frac{1}{3}$ (B) $0<k<3$ (C) $0<k\leq\frac{1}{3}$ (D) $-3\leq k<0$

解析：所给函数带根号，先通过平方去根号， $y=\sqrt{1-x^2}\Rightarrow y^2=1-x^2\Rightarrow x^2+y^2=1 (y\geq 0)$ ，

$y=kx+1-2k\Rightarrow y=k(x-2)+1\Rightarrow$ 直线 l 过定点 $P(2,1)$ ，要分析交点情况，可画图找临界状态，


如图，当直线 l 从 l_1 (不可取) 绕点 P 逆时针旋转至 l_2 (可取) 的过程中，能与半圆有2个交点，

下面求解临界状态， l_1 与半圆相切，结合图形可知其斜率 $k_1=0$ ；

l_2 经过 P 和 $A(-1,0)$ ，其斜率 $k_2=\frac{0-1}{-1-2}=\frac{1}{3}$ ；

直线 l 在旋转过程中不经过竖直线，故其斜率 k 的变化范围是 $(0, \frac{1}{3}]$ 。

答案：C



【反思】①解析几何中出现根式，可尝试通过平方变形成圆、椭圆等二次曲线，由于根号的范围限制，曲线往往只能取一半；②另外，若题目改为方程 $kx+1-2k=\sqrt{1-x^2}$ 有 2 个实数根，求 k 的范围，也可以数形结合，转化为本题的公共点问题.

强化训练

1. (2022·温州模拟·★) 已知直线 $kx-y+k-1=0$ 与圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 有两个不同的交点，则实数 k 的取值范围是 ()

- (A) $[-\frac{3}{4}, 0]$ (B) $(0, \frac{3}{4})$ (C) $[0, \frac{3}{4}]$ (D) $(-\frac{3}{4}, 0)$

2. (2022·西安模拟·★★) 圆 $C: x^2+y^2-4x+2y+1=0$ 与直线 $l: y-2tx+2t-1=0 (t \in \mathbf{R})$ 的位置关系为 ()

- (A) 相切 (B) 相离 (C) 相交 (D) 与 t 有关

《一数·高考数学核心方法》

3. (2022·呼和浩特模拟·★★) 已知直线 $l: x+3y+5=0$ 与圆 $C: x^2+y^2+2x-4y-20=0$ 相交于 A, B 两点，若该圆的一条直径过弦 AB 的中点，则这条直径所在直线的方程为 ()

- (A) $3x+y+1=0$ (B) $3x-y+3=0$ (C) $3x-y+5=0$ (D) $x+3y-5=0$

4. (2020·天津卷·★★) 已知直线 $x-\sqrt{3}y+8=0$ 和圆 $x^2+y^2=r^2 (r>0)$ 相交于 A, B 两点，若 $|AB|=6$ ，则 r 的值为_____.

5. (★★) 设圆 $C: x^2+y^2-2x-2y-2=0$ ，直线 l 过点 $(0,3)$ 且被圆 C 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$ ，则 l 的方程为_____.

6. (★★) 圆 $C: x^2 + y^2 + 2y - 3 = 0$ 被直线 $l: x + y - k = 0$ 分成长度之比为 1:3 的两段圆弧, 则实数 $k =$ _____.

7. (2022 • 洛宁月考 • ★★★★★) 若关于 y 的方程 $y - b = \sqrt{1 - y^2}$ 恰有 1 个实数解, 则实数 b 的取值范围是()

- (A) $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ (B) $[-1, \sqrt{2}]$ (C) $(-1, 1] \cup \{\sqrt{2}\}$ (D) $(-1, 1] \cup \{-\sqrt{2}\}$