

Álgebra: ejercicio 6

Miguel Anguita Ruiz

Curso 2017/18

Índice

1. Enunciado	3
2. Solución	3

Enunciado

El DNI usado para el ejercicio es el siguiente: 77149477.

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \end{pmatrix}$

- i) Usa una base ampliada de su espacio de filas para encontrar una factorización de A.
- ii) Usa una base ampliada de su espacio de columnas para encontrar una factorización de A.
- iii) Amplía el espacio nulo de la matriz hasta una base de \mathbb{R}^4 . Usa esta base y la de su espacio de columnas para encontrar una factorización de A.

Solución

Para la matriz A, su espacio de filas está contenido en \mathbb{R}^4 :

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \end{pmatrix}$$

$$F(A) = \{\lambda_1(7, 7, 1, 4) + \lambda_2(-9, 4, -7, 7) : \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^4$$

Como A tiene rango 2, sus dos filas son linealmente independientes y forman una base de $F(A)$. Esta se puede ampliar hasta una base de \mathbb{R}^4 añadiendo dos vectores mas que sean l.i. con ellos. Por ejemplo, $(1, 0, 0, 0)$ y $(0, 1, 0, 0)$ sirven.

Así se obtiene una base de \mathbb{R}^4 o equivalentemente una matriz regular:

$$P = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

que tiene la propiedad de simplificar A en una H_1 que aquí es su FNHC.

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H_1 P$$

Solución

obteniéndose una factorización sencilla $A = H_1 P$. Las dos últimas filas de P pueden ser cualesquiera vectores pero se eligen que sean l.i. con los originales para que P tenga inversa y $H_1 = AP^{-1}$. Hay infinitas P pero una única H_1 porque A es de rango pleno por filas.

Amplíemos ahora una base de columnas.

La misma matriz A anterior tiene 4 columnas:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\text{tal que } v_1 = \begin{pmatrix} 7 \\ -9 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

pero si elegimos v_1 y v_2 sale una base de \mathbb{R}^2 que generan también su espacio de columnas.

$$C(A) = \{\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2 \in \mathbb{R}^2 : \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}\}$$

Así se obtiene una base de \mathbb{R}^2 o equivalentemente una matriz regular:

$$Q = \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ -9 & 4 \end{pmatrix}$$

que tiene la propiedad de simplificar A en una H_2 que aquí es su FNHF.

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ -9 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{53}{91} & \frac{-33}{91} \\ 0 & 1 & \frac{-40}{91} & \frac{85}{91} \end{pmatrix} = QH_2$$

obteniéndose una factorización sencilla $A = QH_2 \Leftrightarrow H_2 = Q^{-1}A$.

Pero dependiendo de la elección de la base Q pueden obtenerse distintas H_2 . Si se eligen la primera y la cuarta como base de columnas se obtiene una factorización distinta donde:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ -9 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{33}{85} & \frac{7}{17} & 0 \\ 0 & \frac{91}{85} & \frac{-8}{17} & 1 \end{pmatrix} = QH_3$$

La matriz H_3 no es una FNHC pero su primera y cuarta columnas son elementales.

Finalmente, amplíemos el espacio nulo.

La misma matriz A anterior define el siguiente s.l. homogéneo:

Solución

$$\begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned} 7x_1 + 7x_2 + x_3 + 4x_4 &= 0 \\ -9x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 7x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Resolviéndolo, se obtiene una solución general:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{-53\lambda + 33\mu}{91}, \frac{40\lambda - 85\mu}{91}, \lambda, \mu \right) = \lambda \left(\frac{-53}{91}, \frac{40}{91}, 1, 0 \right) + \mu \left(\frac{33}{91}, \frac{-85}{91}, 0, 1 \right)$$

donde $\left(\frac{-53}{91}, \frac{40}{91}, 1, 0 \right), \left(\frac{33}{91}, \frac{-85}{91}, 0, 1 \right) \in \mathbb{R}^4$ son 2 vectores l.i. que generan a todas las soluciones y forman una base del espacio nulo $N(A)$.

Esta base del espacio nulo se puede ampliar hasta una base de \mathbb{R}^4 añadiendo dos vectores que sean l.i. con ellos. Por ejemplo, nos sirven $e_1 = (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)$ ya que la matriz por columnas

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-53}{91} & \frac{33}{91} \\ 0 & 1 & \frac{40}{91} & \frac{-85}{91} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene determinante distinto de 0 (vale 1). Así, multiplicando a derecha por P_1 se obtiene una matriz A_1 con 2 columnas de ceros:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 0 & 0 \\ -9 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-53}{91} & \frac{33}{91} \\ 0 & 1 & \frac{40}{91} & \frac{-85}{91} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = AP_1$$

Como esta matriz A_1 se puede factorizar usando su base de columnas:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 0 & 0 \\ -9 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ -9 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = QH$$

De las dos últimas igualdades matriciales se puede despejar A :

$$AP_1 = A_1 = QH \Leftrightarrow A = QHP_1^{-1}$$

Solución

O sea, hemos obtenido la factorización:

$$\begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 & 4 \\ -9 & 4 & -7 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 7 \\ -9 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-53}{91} & \frac{33}{91} \\ 0 & 1 & \frac{40}{91} & \frac{-85}{91} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

donde la matriz central H es la forma de Hermite por filas y columnas de A, la matriz izquierda Q es una base de columnas y la matriz derecha P_1^{-1} es la inversa de una base ampliada de $N(A)$ escrita por columnas.