

## تقرير مراجعة جودة الرعاية الطبية

١٤٤٧ هـ ربى  
٨ يناير ٢٠٢٣

مجمع مكة الطبي بالزاهر

MCC

قسم متابعة الجودة والتدقيق الطبي

الطبيب المعالج: جعفر نور الاسلام

تقرير صادر عن قسم متابعة الجودة والتدقيق الطبي  
موافق مع حوكمة المجمع ومتطلبات CBAHI  
يجب معالجة القضايا المرصودة والمحددة في هذا التقرير من قبل  
الطبيب المعالج

html````

### تقرير تحليل طبي شامل

بناءً على المعلومات والملفات المعرفة، أجرينا تحليلًا سريريًّا  
منظّمًا مع مراجعة بصرية عميقة للصور/التقارير.

### الحالة 1: رقم الملف 320793

#### معلومات الزيارة

رقم الملف: 320793

رقم المريض: 92130

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

#### الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** إسهال والتهاب المعدة والأمعاء (منشأً معدني مشتبه به).

### التخليص (ICD-10):

A09: إسهال والتهاب المعدة والأمعاء ذو منشأ معدني مشتبه به.

K29.7: التهاب المعدة، غير محدد.

### الأدوية والإجراءات

تحليل البراز الكامل

محلول ملحي عادي (Normal Saline) عن طريق الوريد.

فحص تعداد الدم الكامل الآلي (CBC).

باراسيتامول 10 ملغ/مل محلول للحقن.

حقن وريدي فقط.

### التقييم

**التقييم:** الحالة تشير إلى التهاب المعدة والأمعاء الحاد، وتم تقديم العلاج المناسب (محلول ملحي، باراسيتامول). يجب متابعة تحليل البراز لتحديد العامل المسبب للإسهال.

### الحالة 2: رقم الملف 320796

### معلومات الزيارة

رقم الملف: 320796

رقم المريض: 7506

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

## الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** عسر الهضم، التهاب المعدة غير محدد، زيادة غير طبيعية في الوزن، تعب وإعياء.

### التشخيص (ICD-10):

} K30: عسر الهضم.

} K29.7: التهاب المعدة، غير محدد.

} R63.5: زيادة غير طبيعية في الوزن.

} R53: تعب وإعياء.

## الأدوية والإجراءات

} دومبي (Dompy) 10 ملغ، 30 قرص.

} إيزوبول (Esopole) 40 ملغ، 28 كبسولة.

## التقييم

**التقييم:** الحالة معقدة بسبب وجود أعراض متعددة (عسر الهضم، زيادة الوزن، التعب). يجب إجراء فحوصات إضافية لاستبعاد أسباب أخرى محتملة لزيادة الوزن والتعب. يجب مراقبة فعالية الأدوية الموصوفة.

**الحالة 3: رقم الملف 320966**

## معلومات الزيارة

رقم الملف: 320966

رقم المريض: 196589

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

## الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** عطاش (Polydipsia), صداع, تعب وإعياء.

### التشخيص (ICD-10):

R63.1: عطاش.

R51: صداع.

R53: تعب وإعياء.

E11: داء السكري غير المعتمد على الأنسولين.

## الأدوية والإجراءات

بانادركس (Panadrex) 500 ملг، 48 قرص.

## التقييم

**التقييم:** وجود عطاش وصداع وتعب بالإضافة إلى تشخيص السكري يتطلب تقييماً دقيقاً لمستوى السكر في الدم ووظائف الكلى. بانادركس قد يخفف الصداع ولكن لا يعالج السبب الجذري. يجب تعديل خطة العلاج لتشمل أدوية السكري المناسبة ومراقبة مستويات السكر بانتظام.

**الحالة 4: رقم الملف 321103**

## معلومات الزيارة

رقم الملف: 321103

رقم المريض: 193431

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

## الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** التهاب شعبي حاد، التهاب البلعوم الحاد.

### التشخيص (ICD-10):

J20.9: التهاب شعبي حاد، غير محدد.

J02: التهاب البلعوم الحاد.

## الأدوية والإجراءات

أزيمات (Azimac) 500 ملг، 3 أقراص.

كلارا (Clara) 10 ملг، قرص.

بانادريلكس (Panadrex) 500 ملг، 48 قرص.

## التقييم

**التقييم:** الحالة تشير إلى التهاب الجهاز التنفسي العلوي الحاد. تم وصف مضاد حيوي (أزيمات) ومضاد للهيستامين (كلارا) ومسكن (بانادريلكس). يجب مراقبة استجابة المريض للعلاج.

**الحالة 5: رقم الملف 321201**

## معلومات الزيارة

رقم الملف: 321201

رقم المريض: 163387

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

## الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** ألم حاد، نقرس، تعب وإعياء، التهاب المثانة الحاد.

### التشخيص (ICD-10):

R52.0: ألم حاد.

M10: نقرس.

R53: تعب وإعياء.

N30.0: التهاب المثانة الحاد.

## الأدوية والإجراءات

رومافين (Rumafen) 1% جل، 100 جرام.

بانادريلكس (Panadrex) 500 ملغ، 48 قرص.

## التقييم

**التقييم:** الحالة معقدة بسبب وجود عدة مشاكل صحية (ألم، نقرس، التهاب المثانة). يجب إجراء فحوصات إضافية لتحديد سبب الألم والتعب. يجب مراقبة وظائف الكلى بسبب النقرس والتهاب المثانة.

**الحالة 6: رقم الملف 321493**

## معلومات الزيارة

رقم الملف: 321493

رقم المريض: 120149

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

## الأعراض والتشخيص

الأعراض: التهاب البلعوم الحاد.

التشخيص (ICD-10):

]J: التهاب البلعوم الحاد.

## الأدوية والإجراءات

ميغاموكس (Megamox) 457 ملغ معلق.

## التقييم

التقييم: الحالة تشير إلى التهاب البلعوم الحاد. تم وصف مضاد حيوي (ميغاموكس). يجب مراقبة استجابة المريض للعلاج.

## الحالة 7: رقم الملف 322276

### معلومات الزيارة

رقم الملف: 322276

رقم المريض: 206717

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

## الأعراض والتشخيص

الأعراض: غير محددة.

**التشخيص (ICD-10): غير محدد.****الأدوية والإجراءات**

ميغاموكس (Megamox) 1 جرام، قرص.

الكا-يور (Alka-Ur) فوار، 4 جرام، 30 كيس.

فيروز-ف (Feroze-F) 30 قرص.

بانادريكس (Panadrex) 500 ملг، 48 قرص.

**التقييم**

**التقييم:** الحالة تفتقر إلى معلومات كافية حول الأعراض والتشخيص. وصف مضاد حيوي (ميغاموكس) ومكملات الحديد (فيروز-ف) ومسكن (بانادريكس) بدون تحديد السبب يستدعي مراجعة دقيقة للحالة.

**الحالة 8: رقم الملف 322490****معلومات الزيارة**

رقم الملف: 322490

رقم المريض: 197188

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

**الأعراض والتشخيص**

**الأعراض:** ارتفاع ضغط الدم الأساسي (أولي).

**التشخيص (ICD-10):**

I10: ارتفاع ضغط الدم الأساسي (أولي).

## الأدوية والإجراءات

استشارة طبيب عام.

أملوبين (Amlopine) 5 ملغ كبسولة.

## التقييم

**التقييم:** الحالة تشير إلى ارتفاع ضغط الدم الأساسي. تم وصف أملوبين. يجب مراقبة ضغط الدم بانتظام وتعديل الجرعة حسب الحاجة.

## الحالة 9: رقم الملف 322493

### معلومات الزيارة

رقم الملف: 322493

رقم المريض: 120292

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

### الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** تضخم البروستاتا، ارتفاع ضغط الدم الأساسي (أولي)، داء السكري غير المعتمد على الأنسولين.

### التشخيص (ICD-10):

N40: تضخم البروستاتا.

I10: ارتفاع ضغط الدم الأساسي (أولي).

E11: داء السكري غير المعتمد على الأنسولين.

## الأدوية والإجراءات

استشارة طبيب عام.

## التقييم

**التقييم:** الحالة معقدة بسبب وجود تضخم البروستاتا وارتفاع ضغط الدم والسكري. يجب إجراء فحوصات إضافية لتقييم وظائف البروستاتا والكلى ومستوى السكر في الدم. يجب وضع خطة علاج شاملة تتضمن أدوية لكل حالة.

## الحالة 10: رقم الملف 322494

### معلومات الزيارة

رقم الملف: 322494

رقم المريض: 202866

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

### الأعراض والتشخيص

الأعراض: التهاب البلعوم الحاد.

التشخيص (ICD-10):

J02: التهاب البلعوم الحاد.

## الأدوية والإجراءات

استشارة طبيب عام.

**التقييم**

**التقييم:** الحالة تشير إلى التهاب البلعوم الحاد. يجب تقييم الحاجة إلى مضاد حيوي بناءً على الأعراض والفحص السريري.

**الحالة 11: رقم الملف 322496****معلومات الزيارة**

رقم الملف: 322496

رقم المريض: 203690

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

**الأعراض والتشخيص**

**الأعراض:** عسر البلع، حمى التيفوئيد، حمى غير محددة، التهاب البلعوم الحاد.

**التشخيص (ICD-10):**

R13: عسر البلع.

A01.0: حمى التيفوئيد.

R50.9: حمى غير محددة.

J02: التهاب البلعوم الحاد.

**الأدوية والإجراءات**

استشارة طبيب عام.

محلول ملحي عادي (Normal Saline) عن طريق الوريد.

باراسيتامول 10 B.Braun 10 مل/مل محلول للحقن.

ميغاموكس (Megamox) 457 مل/مل معلق.

ديفادول (Defadol) 160 مل/5 مل شراب.

حقن وريدي فقط.

بروتين سي التفاعلي (C-Reactive Protein).

حديد.

فحص تعداد الدم الكامل الآلي (CBC).

جهاز تبخير + استنشاق.

## التقييم

**التقييم:** الحالة تشير إلى حمى التيفوئيد المحتملة مع أعراض أخرى. يجب تأكيد التشخيص عن طريق الفحوصات المخبرية المناسبة (مثل مزرعة الدم). يجب مراقبة المريض عن كثب وتقديم العلاج المناسب لحمى التيفوئيد.

## الحالة 12: رقم الملف 322513

### معلومات الزيارة

رقم الملف: 322513

رقم المريض: 127997

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

### الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** ألم في الصدر، ألم في البطن والحووض.

**التشخيص (ICD-10):**

R07.4: ألم في الصدر، غير محدد.

R10: ألم في البطن والحوض.

**الأدوية والإجراءات**

بروتين سي التفاعلي (C-Reactive Protein).

فحص تعداد الدم الكامل الآلي (CBC).

الهيموجلوبين الغليكوزيلاتي (Glycosylated Hemoglobin).

استشارة طبيب عام.

الدهون الثلاثية (Triglycerides).

بانتولوك (Pantoloc) 40 ملغ، 30 قرص.

دومبي (Dompy) 10 ملغ، 30 قرص.

تخطيط كهربائية القلب (ECG).

كوليستيرونول (Chlostirol).

تروبونيin (Tropomin).

**التقييم**

**التقييم:** الحالة تشير إلى ألم في الصدر والبطن. يجب إجراء فحوصات إضافية لتحديد سبب الألم، بما في ذلك تقييم القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي. ارتفاع ضغط الدم يستدعي المتابعة.

**الحالة 13: رقم الملف 322514**

## معلومات الزيارة

رقم الملف: 322514

رقم المريض: 121686

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

## الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** إسهال والتهاب المعدة والأمعاء (منشأ معدني مشتبه به).

### التشخيص (ICD-10):

A09: إسهال والتهاب المعدة والأمعاء ذو منشأ معدني مشتبه به.

K29.7: التهاب المعدة، غير محدد.

## الأدوية والإجراءات

استشارة طبيب عام.

ريموكس (Remox) 500 ملغ كبسولات.

بانادريكس (Panadrex) 500 ملغ، 48 قرص.

بريموسان (Premosan) 10 ملغ قرص.

أنازول (Anazol) 500 ملغ، 20 قرص مغلف.

سكوبينال (Scopinal) 10 ملغ قرص.

## التقييم

**التقييم:** الحالة تشير إلى التهاب المعدة والأمعاء الحاد. تم وصف مضاد حيوي (ريموكس) ومسكن (باناديكس) ومضاد للتقلصات (سكوبينال). يجب مراقبة استجابة المريض للعلاج.

## الحالة 14: رقم الملف 322518

### معلومات الزيارة

رقم الملف: 322518

رقم المريض: 206770

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

### الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** إسهال والتهاب المعدة والأمعاء (منشأ معدى مشتبه به)، غثيان وقيء، تعب وإعياء، حمى غير محددة.

### التشخيص (ICD-10):

A09: إسهال والتهاب المعدة والأمعاء ذو منشأ معدى مشتبه به.

R11: غثيان وقيء.

R53: تعب وإعياء.

R50.9: حمى غير محددة.

### الأدوية والإجراءات

استشارة طبيب عام.

كلارا (Clara) 10 ملغ قرص.

باراسيتامول 10 B.Braun ملغم/مل محلول للحقن.

محلول ملحي عادي (Normal Saline) عن طريق الوريد.

بروتين سي التفاعلي (C-Reactive Protein).

فحص تعداد الدم الكامل الآلي (CBC).

تحليل البول الكامل.

حقن وريدي فقط.

ميغاموكس (Megamox) 625 ملغم قرص.

بانادريلكس (Panadrex) 500 ملغم، 48 قرص.

## التقييم

**التقييم:** الحالة تشير إلى التهاب المعدة والأمعاء الحاد مع أعراض أخرى. يجب تحديد سبب الحمى والغثيان والقيء. يجب مراقبة وظائف الكلى بسبب الإسهال والقيء.

## الحالة 15: رقم الملف 322523

### معلومات الزيارة

رقم الملف: 322523

رقم المريض: 159664

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

### الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** عسر الهضم، ألم في البطن والحوض، التهاب المعدة غير محدد.

**التشخيص (ICD-10):**

- } K30: عسر الهضم.
- } R10: ألم في البطن والحوض.
- } K29.7: التهاب المعدة، غير محدد.

**الأدوية والإجراءات**

بروتين سي التفاعلي (C-Reactive Protein).

إنزيم الكبد (SGPT).

إنزيم الكبد (SGOT).

الموجات فوق الصوتية على البطن.

دومبي (Dompy) 10 ملغم، 30 قرص.

فحص تعداد الدم الكامل الآلي (CBC).

تحليل البول الكامل.

استشارة طبيب عام.

**التقييم**

**التقييم:** الحالة تشير إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. يجب تقييم نتائج الموجات فوق الصوتية وإنزيمات الكبد لتحديد سبب عسر الهضم والألم.

**الحالة 16: رقم الملف 322533**

**معلومات الزيارة**

رقم الملف: 322533

رقم المريض: 200969

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

## الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** فرط حمض يوريك في الدم بدون علامات التهاب المفاصل أو داء النقرسي، التهاب المثانة الحاد.

### التشخيص (ICD-10):

E79.0: فرط حمض يوريك في الدم بدون علامات التهاب المفاصل أو داء النقرسي.

N30.0: التهاب المثانة الحاد.

## الأدوية والإجراءات

نو-يوريك (No-Uric) 100 ملг، 50 قرص.

استشارة طبيب عام.

حمض اليوريك.

يوريا.

تحليل البول الكامل.

كرياتينين.

## التقييم

**التقييم:** الحالة تشير إلى فرط حمض يوريك في الدم والتهاب المثانة. يجب مراقبة وظائف الكلى وتقديم العلاج المناسب

## الحالة 17: رقم الملف 322534

### معلومات الزيارة

رقم الملف: 322534

رقم المريض: 151337

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

### الأعراض والتشخيص

الأعراض: ألم حاد، التهاب الجلد غير محدد.

التشخيص (ICD-10):

R52.0: ألم حاد.

L30.9: التهاب الجلد غير محدد.

### الأدوية والإجراءات

بانادركس (Panadrex) 500 ملغ، 48 قرص.

استشارة طبيب عام.

فيوزيدرم (Fusiderm) 2% كريم، 30 جرام.

### التقييم

**التقييم:** الحالة تشير إلى ألم حاد والتهاب الجلد. تم وصف مسكن (بانادركس) وكريم مضاد للالتهابات (فيوزيدرم). يجب مراقبة استجابة المريض للعلاج.

**الحالة 18: رقم الملف 322538****معلومات الزيارة**

رقم الملف: 322538

رقم المريض: 206557

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

**الأعراض والتشخيص**

**الأعراض:** التهاب المعدة غير محدد، عوامل بكتيرية أخرى كسبب للأمراض المصنفة في فصوص أخرى، نقص فيتامين د غير محدد.

**التشخيص (ICD-10):**

K29.7: التهاب المعدة، غير محدد.

B96: عوامل بكتيرية أخرى كسبب للأمراض المصنفة في فصوص أخرى.

E55.9: نقص فيتامين د غير محدد.

**الأدوية والإجراءات**

استشارة طبيب عام.

ريمكس (Remox) 500 ملغ كبسولات.

إيزوبول (Esopole) 40 ملغ، 28 كبسولة.

كلاريدار (Claridar) 500 ملغ، 14 قرص.

تيرا د (Tera D) 50000 وحدة دولية، 20 كبسولة.

## التقييم

**التقييم:** الحالة تشير إلى التهاب المعدة ونقص فيتامين د. يجب إجراء فحوصات إضافية لتحديد العامل البكتيري المسئول للتهاب المعدة. يجب مراقبة مستويات فيتامين د والاستجابة للعلاج.

## الحالة 19: رقم الملف 322539

### معلومات الزيارة

رقم الملف: 322539

رقم المريض: 150672

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

### الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** التهاب شعبي حاد، إمساك، التهاب البلعوم الحاد.

#### التشخيص (ICD-10):

J20: التهاب شعبي حاد.

K59.0: إمساك.

J02: التهاب البلعوم الحاد.

### الأدوية والإجراءات

استشارة طبيب عام.

إل-سيت (L-Cet) 5 ملغ قرص مغلف.

دراميلين (Dramylin) شراب 120 مل.

إيزيلاكس (Ezilax) 10 جرام/15 مل شراب.

دومبي (Dompy) 10 ملغ، 30 قرص.

## التقييم

**التقييم:** الحالة تشير إلى التهاب الجهاز التنفسي العلوي والإمساك. تم وصف مضاد للهيستامين (إل-سيت) وشراب للسعال (دراميلين) وملين (إيزيلاكس). يجب مراقبة استجابة المريض للعلاج.

## الحالة 20: رقم الملف 322540

### معلومات الزيارة

رقم الملف: 322540

رقم المريض: 161469

تاريخ الزيارة: 2026-01-03

### الأعراض والتشخيص

**الأعراض:** التهاب المعدة غير محدد، التهاب شعبي حاد غير محدد، التهاب الب

### مجمع مكة الطبي بالزاهر

هذا التقرير صادر من قسم متابعة الجودة ومراقبة مستوى تقديم الخدمات الطبية

ويُعد وثيقة رسمية لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة

