

# Assignment 1

Mohini Mehta

Question taken from

cbse/math/10/2006/set1-Q17

Download all python codes from

<https://github.com/makoamimbo/AI-assignment-1.git>

## 1 QUESTION 1

Find the value of  $p$  for which the points

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ p \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$  are collinear

## 2 SOLUTION

Given:- Given:-  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 \\ p \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$

Given that the points are collinear, so we create a matrix

$$\mathbf{M} = (\mathbf{B} - \mathbf{A} \quad \mathbf{C} - \mathbf{A})^T \quad (2.0.1)$$

where  $\text{rank}(\mathbf{M}) = 1$ . We have the matrix  $\mathbf{M}$  as,

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 2+1 & p-3 \\ 5+1 & -1-3 \end{pmatrix} \quad (2.0.2)$$

$$\Rightarrow \mathbf{M} = \begin{pmatrix} 3 & p-3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} \quad (2.0.3)$$

Now we row reduce the matrix  $\mathbf{M}$ ,

$$\begin{pmatrix} 3 & p-3 \\ 6 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & p-3 \end{pmatrix} \quad (2.0.4)$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{2}} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 3 & p-3 \end{pmatrix} \quad (2.0.5)$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & p-1 \end{pmatrix} \quad (2.0.6)$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & p-1 \end{pmatrix} \quad (2.0.7)$$

Since  $\text{rank}(\mathbf{M}) = 1$ , we have

$$p-1 = 0 \quad (2.0.8)$$

$$\Rightarrow p = 1 \quad (2.0.9)$$

Fig.2.1 verifies that the points are indeed collinear for  $p = 1$




Fig. 2.1: Collinear