

Algebrske struktre

- **grupoid**  $(M, \cdot)$  urejen par z neprazno množico  $M$  in zaprto opreacijo  $\cdot$ .
- **polgrupa** grupoid z asociativno operacijo  $\forall x, y, z \in M : (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ .
- **monoid** polgrupa z enoto  $\exists e \in M \ \forall x \in M : e \cdot x = x \cdot e = x$ .
- **grupa** polgrupa v kateri ima vsak element inverz  $\forall x \in M \ \exists x^{-1} \in M : x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e$ .
- **abelova grupa** grupa s komutativno operacijo  $\forall x, y \in M : x \cdot y = y \cdot x$ .

Kolobarji

**Kolobar** je množica  $R$  skupaj z dvema operacijama (oznaka:  $+$ ,  $\cdot$ ) tako, da velja:

- $(R, +)$  je abelova grupa
- $\forall a, b, c \in R : \quad a(b + c) = ab + ac$  (distributivnost)
- $\forall a, b, c \in R : \quad (a + b)c = ac + bc$  (distributivnost)
- $\forall a, b \in R : \quad ab \in R$  (zaprtost množenja)
- $\forall a, b, c \in R : \quad (ab)c = a(bc)$  (asociativnost\*)
- $\exists e \in R \ \forall a \in R : \quad e \cdot a = a = e \cdot a$  (enota\*)

Kolobar je **komutativen**, če  $\forall a, b \in R : \quad ab = ba$ . Kolobar je **kolobar z deljenjem**, če  $\forall a \in R - \{0\} \ \exists a^{-1} \in R : \quad aa^{-1} = 1$  element 1 je *enota kolobarja*.

Kolobar, ki ima vse naštetе lastnosti je **obseg**.

Delitelji ničа in celi kolobarji

Naj bo  $R$  komutativen koloboar. Tedaj je  $a \in R, \ a \neq 0$  **delitelj ničа**, če

$$\exists b \in R, \ b \neq 0 : \quad ab = 0$$

**Cel kolobar** je komutativen kolobar z enoto ( $1 \neq 0$ ), ki nima deliteljev ničа.

Razširitve kolobarjev

Naj bo  $K$  kolobar **brez enote**:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} \times K &= \{n \in \mathbb{Z}, a \in K \\ (n, a) + (m, b) &= (n + m, a + b) \\ (n, a) \cdot (m, b) &= (nm, nb + am + ab) \end{aligned}$$

Naj bo  $K$  komutativen kolobar *brez deliteljev ničа* vendar niso vsi elementi obrnljivi. Dodamo ulomke definirane kot ekvivalenčne razrede dvojic z ekvivalenčno (*refleksivno, simetrično, tranzitivno*) relacijo  $\sim$ .

$$\begin{aligned} K \times K - \{0\} / \sim \\ \frac{a}{b} \sim \frac{ka}{kb} \quad \forall k \in K - \{0\} \\ \frac{a}{b} + \frac{a'}{b'} = \frac{ab' + a'b}{bb'} \\ \frac{a}{b} \cdot \frac{a'}{b'} = \frac{aa'}{bb'} \end{aligned}$$

*Če bi bila  $b$  in  $b'$  delitelja ničа, bi imeli težave.*

Tako dobimo **obseg ulomkov za  $K$** .

Wedderburnov izrek

Končen kolobar brez deliteljev ničа je **obseg**.

Posledica:  $\mathbb{Z}_n$  je obseg  $\iff n \in \mathbb{P}$

Karakteristika kolobarja

**Karakteristika** kolobarja  $R$  je najmanjši  $n \in \mathbb{N}$ , tako da velja

$$\forall a \in R : \quad na = \underbrace{a + a + \dots + a}_\text{n-krat} = 0$$

Če tak  $n$  ne obstaja je karakteristika enaka 0.

Če je  $1 \in R$ , je  $\text{char}(R) = \text{red enote}$  oziroma najmanjši  $n \in \mathbb{N}$ , da je  $1 \cdot n = 0$ .

Če je  $R$  cel kolobar, je  $\text{char}R \in \{0\} \cup \mathbb{P}$ .

Homomorfizem

Naj bosta  $K, \ L$  kolobarja.  $f : K \rightarrow L$  je **homomorfizem**, če  $\forall a, b \in K$  velja:

$$\begin{aligned} f(a + b) &= f(a) + f(b) \\ f(a \cdot b) &= f(a) \cdot f(b) \end{aligned}$$

Iz aditivnosti sledi:  $f(0) = 0$  in  $f(-a) = -f(a)$ .

**Izomorfizem** je bijektivni homomorfizem.

**Avtomorfizem** je homomorfizem  $f : K \rightarrow K$ .

Če je  $f(1) = 1$ , pravimo, da je homomorfizem **unitalen**. Če je unitelen in če je  $a$  obrnljiv, potem je  $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$ .

Slika / zaloga vrednosti

Zaloga vrednosti  $f$  je  $f(K) = \{f(a) \mid a \in K\} = \text{Im}K \leq L$ .

$$f \text{ je surjektivnen } \iff \text{Im}f = L$$

Jedro / ničelna množica

Prasluka 0 je  $f^{-1}(0) = \{a \in K \mid f(a) = 0\} = \text{Ker}f \leq K$ .

$$\begin{aligned} \forall a \in K, \forall x \in \text{Ker}f : \quad f(ax) &= f(a)f(x) = 0 \\ &\implies \text{Ker}f \triangleleft K \end{aligned}$$

Ideali

Podkolobar  $I \leq K$  je ideal, če velja  $I \cdot K \subseteq I$  in  $K \cdot I \subseteq I$ . Oznaka:  $I \triangleleft K$ .

V nekumutativnih kolobarjih ločimo **leve** in **desne** ideale.

$K$  in  $\{0\}$  sta **neprava ideala**.

(komutativen) kolobar  $K$  je obseg  $\iff$  nima pravih idealov.

Še več, pravi ideali ne vsebujejo obrnljivih elementov.

Maksimalen ideal

Pravi ideal je **maksimalen**, če ni vsebovan v nobenem pravem idealu.

Glavni ideali

Naj bo  $K$  kolobar in  $x, y \in K$ .

$$(x) = Kx = \{kx \mid k \in K\}$$

$$(x, y) = (x) + (y) = \{kx + ly \mid k, l \in K\}$$

Kolobar je **glavno idealski**, če se vsi njegovi ideali glavni.

Če je  $F$  obseg, je  $F[x]$  glavno idealski, maksimalni ideali pa pripadajo natanko nerazcepnim polinomom.

Kvocientni ideal

Za dvostranski ideal  $I \triangleleft K$  definiramo ekvivalenčno relacijo  $\sim$ :

$$\forall a, b \in K : \quad a \sim b \iff a - b \in I$$

$K$  razdelimo na ekvivalenčne razrede  $K/\sim$ , ki pa jih lahko označimo tudi z  $K/I$ . Ekvivalenčni razred, ki pripada  $x \in K$  označimo  $[x]$  ali pa  $(x + I)$ .

Dodamo opreaciji:

$$\begin{aligned} (x + I) + (y + I) &= (x + y + I) \\ (x + I) \cdot (y + I) &= (x \cdot y + I) \end{aligned}$$

$(K/I, +, \cdot)$  je kolobar in podeduje lastnosti  $K$ .

$K/I$  ( $K$  komutativen kolobar) je **obseg**  $\iff I$  maksimalen ideal.

Funkcija

$$f : \{\text{ideali v } K, \text{ ki vsebujejo } I\} \leftrightarrow \{\text{ideali v } K/I\}$$

je bijekcija.

Ideali v  $K/(x)$  so oblike  $(d + (x))$ , kjer  $d|x$ . Če je  $d$  nerazcepen, je ideal maksimalen.

Praideal

Ideal  $P$  v kolobarju  $K$  je *praideal*, če je  $P \neq K$  in če  $\forall a, b \in K : ab \in P \implies a \in P \vee b \in P$ .

Izrek o izomorfizmu

Naj bo  $f : K \rightarrow L$  homomorfizem kolobarjev (velja tudi za grupe). Potem je  $\text{Ker}f \triangleleft K$  in imamo naravni izomorfizem:

$$\bar{f} : K/\text{Ker}f \rightarrow \text{Im}f$$

$$\bar{f}(x + \text{Ker}f) = f(x)$$

$$K/\text{Ker}f \cong \text{Im}f$$

Kolobarji polinomov

Računanje s kompleksnimi števili

$$z = x + iy = re^{i\varphi} = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \varphi = \arg z = \arctan \frac{y}{x}$$

$$(a + bi)^{-1} = \frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$



