

41. Мера на многообразии. Интеграл первого рода на многообразии. Частные случаи интеграла I рода на многообразии: криволинейный и поверхностный, вычислительные формулы для них

Мера на многообразии μ_M

Пусть $M \in M_{kn}^{(1)}$, $E \in A_M$.

1. Если E малое, U — стандартная окрестность, $E \subset U$, φ — параметризация U , то
$$\mu_M E = \int_{\varphi^{-1}(E)} \sqrt{D_\varphi} d\mu_k.$$
2. Если $E = \bigcup_\nu E_\nu$ (дизъюнктные малые измеримые множества), то
$$\mu_M E = \sum_\nu \mu_M E_\nu.$$

Функция μ_M называется мерой на многообразии M .

Криволинейный интеграл первого рода

Пусть Γ — гладкая кривая ($k = 1$), заданная параметризацией $x = \gamma(t)$, $t \in \langle a, b \rangle$. Тогда:

- Мера (длина) кривой:

$$\mu \Gamma = \int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

- Криволинейный интеграл первого рода:

$$\int_\Gamma f d\mu_\Gamma = \int_a^b (f \circ \gamma)(t) \cdot |\gamma'(t)| dt.$$

Классическое обозначение: $\int_\Gamma f ds$, где ds — элемент длины дуги.

Поверхностный интеграл первого рода

Пусть S — гладкая поверхность ($k = n - 1$), заданная параметризацией $\varphi : G \subset \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$.

По формуле Вине–Коши:

$$\sqrt{D_\varphi} = \sqrt{\sum_{j=1}^n (\det \varphi'_j)^2} = |\mathcal{N}_\varphi|,$$

где \mathcal{N}_φ — вектор нормали к поверхности. Тогда:

- Мера (площадь) поверхности:

$$\mu S = \int_G |\mathcal{N}_\varphi| d\mu_{n-1}.$$

- Поверхностный интеграл первого рода:

$$\int_S f d\mu_S = \int_G (f \circ \varphi) \cdot |\mathcal{N}_\varphi| d\mu_{n-1}.$$

42. Ориентация многообразий. Понятия: одинаково ориентирующие параметризации, ориентация окрестностей, согласованные ориентации окрестностей, ориентированное многообразие, ориентируемое многообразие. Возможное количество ориентаций связного многообразия

Одинаково ориентирующие параметризации

Две параметризации φ и ψ стандартной окрестности U многообразия M называются согласованными (или одинаково ориентирующими), если для перехода $L : \Pi \rightarrow \Pi$ между ними якобиан $\det L' > 0$ на всей области Π . Если $\det L' < 0$, параметризации называются противоположно ориентирующими.

Ориентация окрестностей

Ориентация окрестности U — это выбор класса эквивалентности параметризаций, для которых переходы имеют положительный якобиан. Параметризации этого класса называются положительно ориентирующими, а остальные — отрицательно ориентирующими.

Согласованные ориентации окрестностей

Две ориентированные окрестности U и V называются согласованными, если либо их пересечение пусто, либо для любых положительно ориентирующих параметризаций φ (для U) и ψ (для V) переход L между ними имеет $\det L' > 0$ в области пересечения.

Ориентированное многообразие

Многообразие M называется ориентированным, если существует набор попарно согласованных ориентаций всех его стандартных окрестностей. Такой набор называется ориентацией многообразия.

Ориентируемое многообразие

Многообразие M называется ориентируемым, если существует хотя бы одна его ориентация (т.е. если его можно превратить в ориентированное многообразие выбором подходящих локальных ориентаций).

Количество ориентаций связного многообразия

Если многообразие M связно и ориентируемо, то оно имеет ровно две ориентации: исходную и противоположную (где во всех окрестностях выбран "обратный" класс параметризаций).

43. Понятие направления, лемма о существовании направлений

Кривая как одномерное многообразие

При $k = 1$ гладкое многообразие M в \mathbb{R}^n называется кривой. Это означает, что локально кривая устроена как интервал числовой прямой.

Параметрическое задание кривой

Кривая Γ задаётся параметризацией $\gamma \in C^{(1)}((a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n)$, где:

1. γ - инъективна (кроме, возможно, концов для замкнутых кривых)
2. γ регулярна ($\gamma'(t) \neq 0$ для всех t)
3. $\Gamma = \gamma((a, b))$

Определение направления на кривой

Пусть Γ — гладкая кривая в \mathbb{R}^n . Отображение $\tau \in C(\Gamma \rightarrow \mathbb{R}^n)$ называется *направлением* на Γ , если:

$$\forall x \in \Gamma \quad \tau(x) \in T_x \Gamma \quad \text{и} \quad |\tau(x)| = 1,$$

где $T_x \Gamma$ — касательное пространство к Γ в точке x .

Лемма о существовании двух направлений

На связной гладкой кривой Γ , заданной параметризацией γ (соотношения (12.6)), существуют ровно два направления:

$$\tau_{\pm} = \pm \frac{\gamma'}{|\gamma'|} \circ \gamma^{-1}.$$

(Для замкнутого пути γ под $\gamma^{-1}(\gamma(a))$ можно понимать как a , так и b).

44. Сторона поверхности, лемма о существовании стороны

Определение двусторонней поверхности и Стороны

Связная поверхность S в \mathbb{R}^n называется *двусторонней*, если существует непрерывное отображение $\mathcal{N} \in C(S \rightarrow \mathbb{R}^n)$ (называемое *стороной* поверхности S), такое что для всех $x \in S$:

$$\mathcal{N}(x) \perp T_x S \quad \text{и} \quad |\mathcal{N}(x)| = 1.$$

Лемма о связи двусторонности и ориентируемости

Для того чтобы связная поверхность S была двусторонней, необходимо и достаточно, чтобы она была ориентируемой. При этом S имеет ровно две стороны.

Построение стороны через параметризацию

Если $\varphi : G \rightarrow U \subset S$ — параметризация стандартной окрестности U , то сторона U задаётся формулой:

$$\mathcal{N}_{\pm}(x) = \pm \frac{\mathcal{N}_{\varphi}}{|\mathcal{N}_{\varphi}|} \circ \varphi^{-1}(x),$$

где \mathcal{N}_{φ} — векторное произведение частных производных:

$$\mathcal{N}_\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial u^1} \times \frac{\partial \varphi}{\partial u^2} \times \cdots \times \frac{\partial \varphi}{\partial u^{n-1}}.$$

45. Теорема о крае многообразия и его ориентации. Понятие ориентации края, согласованной с ориентацией многообразия. Пример согласованных ориентаций на поверхности и ограничивающей кривой.

Теорема о крае многообразия

Если M — k -мерное многообразие класса $C^{(r)}$, то его край ∂M является $(k - 1)$ -мерным многообразием класса $C^{(r)}$ без края.

Если M ориентируемо, то ∂M также ориентируемо.

Понятие ориентации края, согласованной с ориентацией многообразия

Ориентация края ∂M , заданная формулой $\tilde{\varphi}_x(\tilde{u}) = \varphi_x(0, \tilde{u})$ (где φ_x — параметризация M и $\tilde{u} \in \Pi_{k-1}$), называется индуцированной или согласованной с ориентацией M .

Пример согласованных ориентаций

Пусть $G \subset \mathbb{R}^2$ — область с гладкой границей S . Если G ориентирована естественным образом (якобиан > 0), то согласованная ориентация S задаётся касательным вектором τ , при котором G остаётся слева при обходе границы. Нормаль \mathcal{N} направлена наружу.

Доп

$\Pi_{k-1} = (-1, 1)^{k-1}$ — это открытый $(k - 1)$ -мерный куб в пространстве параметров $\tilde{u} = (u_2, \dots, u_k)$, используемый для параметризации края ∂M .

46. Полилинейные формы, кососимметрические формы - определения и элементарные свойства,

внешнее произведение форм

Полилинейные формы

Пусть X, Y — векторные пространства над полем K , $p \in \mathbb{N}$. Отображение $F : X^p \rightarrow Y$ называется p -линейным, если оно линейно по каждому аргументу. Если $Y = K$, то F называется p -формой на X . Множество всех p -форм обозначается $\mathcal{F}_p(X)$. При $p = 0$ под 0-формами понимаются элементы Y .

Разложение по базису

Если $\dim X = n < +\infty$ и e^1, \dots, e^n — базис X , то для $F \in \mathcal{F}_p(X)$:

$$F = \sum_{i_1, \dots, i_p=1}^n a_{i_1, \dots, i_p} \pi_{i_1} \otimes \dots \otimes \pi_{i_p},$$

где π_i — проектор на i -ю координату, а коэффициенты $a_{i_1, \dots, i_p} = F(e^{i_1}, \dots, e^{i_p})$.

Кососимметрические формы

Форма $F \in \mathcal{F}_p(X)$ называется кососимметрической, если для любых двух аргументов:

$$F(x^1, \dots, x^i, \dots, x^j, \dots, x^p) = -F(x^1, \dots, x^j, \dots, x^i, \dots, x^p).$$

Множество таких форм обозначается $\mathcal{E}_p(X)$. При $p > n$ все формы нулевые.

Базис в $\mathcal{E}_p(X)$

Для $p \leq n$ форма F раскладывается как:

$$F = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n} a_{i_1, \dots, i_p} \pi_{i_1} \wedge \dots \wedge \pi_{i_p},$$

где \wedge — внешнее произведение, а $\pi_{i_1} \wedge \dots \wedge \pi_{i_p}$ вычисляется через определитель матрицы из координат векторов.

Внешнее произведение форм

Для $F \in \mathcal{E}_p(X)$ и $G \in \mathcal{E}_q(X)$ их внешнее произведение $F \wedge G \in \mathcal{E}_{p+q}(X)$ определяется на базисных формах как:

$$(\pi_{i_1} \wedge \dots \wedge \pi_{i_p}) \wedge (\pi_{j_1} \wedge \dots \wedge \pi_{j_q}) = \pi_{i_1} \wedge \dots \wedge \pi_{i_p} \wedge \pi_{j_1} \wedge \dots \wedge \pi_{j_q},$$

а затем продолжается по линейности.

Формула для коэффициентов

Если F и G заданы в виде (12.19), то:

$$F \wedge G = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n} a_{i_1, \dots, i_p} b_{j_1, \dots, j_q} \pi_{i_1} \wedge \dots \wedge \pi_{i_p} \wedge \pi_{j_1} \wedge \dots \wedge \pi_{j_q}.$$

47. Дифференциальные формы; координатное представление дифференциальных форм. Внешнее дифференцирование дифференциальных форм

Определение дифференциальной формы

Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$, $p \in \mathbb{N}$. Дифференциальной формой степени p (p -формой) на G называется функция $\omega : G \times (\mathbb{R}^n)^p \rightarrow \mathbb{R}$, такая что для всех $x \in G$ функция $\omega(x; \cdot)$ принадлежит пространству $\mathcal{E}_p(\mathbb{R}^n)$ (является кососимметрической p -линейной формой). 0-формой называется функция $f : G \rightarrow \mathbb{R}$.

Координатное представление дифференциальных форм

Пусть $p \in \mathbb{N}$. Дифференциальная p -форма ω в открытом множестве $G \subset \mathbb{R}^n$ может быть записана в виде:

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n} a_{i_1 \dots i_p}(x) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p},$$

где $a_{i_1 \dots i_p} : G \rightarrow \mathbb{R}$ — коэффициенты формы, а $dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}$ — базисные внешние

произведения дифференциалов координат. Для $p = n$ форма имеет вид $\omega = a(x)dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$.

Внешнее дифференцирование дифференциальных форм

Пусть G открыто в \mathbb{R}^n , $p \in \mathbb{Z}_+$, $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Внешнее дифференцирование — это оператор $d : \Omega_p^{(r)}(G) \rightarrow \Omega_{p+1}^{(r-1)}(G)$, определяемый так:

1. Для 0-формы $\omega = f \in C^{(r)}(G)$:

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

2. Для p -формы $\omega = \sum_I a_I(x) dx_I$ (где $I = (i_1 < \dots < i_p)$):

$$d\omega = \sum_I da_I \wedge dx_I = \sum_I \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial a_I}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge dx_I.$$

Свойства:

1. d линейно.
2. $d(\omega \wedge \lambda) = d\omega \wedge \lambda + (-1)^{\deg \omega} \omega \wedge d\lambda$ для форм ω, λ .
3. $d^2\omega = d(d\omega) = 0$.

48. Перенос дифференциальных форм. Теорема о свойствах переноса форм

Определение переноса дифференциальных форм

Пусть G — открытое множество в \mathbb{R}^n , U — открытое множество в \mathbb{R}^m , $p \in \mathbb{Z}_+$, $\omega \in \Omega_p(G)$, $T \in C^{(1)}(U \rightarrow G)$. Перенесённая форма $T^*\omega$ определяется равенством:

$$(T^*\omega)(u; du^1, \dots, du^p) = \omega(T(u); T'(u)du^1, \dots, T'(u)du^p),$$

где $u \in U$, $du^1, \dots, du^p \in \mathbb{R}^m$. Отображение T^* называется переносом форм или заменой переменных.

Свойства переноса форм

1. Линейность: $T^*(\alpha\omega + \beta\lambda) = \alpha T^*\omega + \beta T^*\lambda$.
2. Умножение на функцию: $T^*(f\omega) = (f \circ T)T^*\omega$ для $f \in C^{(r)}(G)$.
3. Внешнее произведение: $T^*(\omega \wedge \lambda) = T^*\omega \wedge T^*\lambda$ для $\lambda \in \Omega_q^{(r)}$.
4. Дифференциал: $T^*d\omega = dT^*\omega$ при $r \geq 1$.
5. Явная формула: Для $\omega = \sum a_{i_1, \dots, i_p} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}$,

$$T^*\omega = \sum (a_{i_1, \dots, i_p} \circ T) \cdot \det \left(\frac{\partial T_{i_k}}{\partial u_{j_l}} \right) du_{j_1} \wedge \dots \wedge du_{j_p}.$$

6. Композиция: $(T \circ S)^*\omega = S^*(T^*\omega)$, если V открыто в \mathbb{R}^i , $S \in C^{(1)}(V \rightarrow U)$.

49 Поверхностный интеграл второго рода.

Выражением поверхностного интеграла второго рода через поверхностный интеграл первого рода. Выражения для интеграла 2го рода в случае размерностей многообразия 1 и 2. Примеры. Лемма Пуанкаре в общем случае (без док-ва)

Определение интеграла второго рода

Пусть G открыто в \mathbb{R}^n , $M \subset G$ — ориентированное k -мерное многообразие класса $\mathbb{M}_{k,n}^{(1)}$, $\omega \in \Omega_k(G)$ — дифференциальная форма степени k , $E \in \mathbb{A}_M$ — малое измеримое множество.

Тогда интеграл второго рода определяется как:

$$\int_E \omega = \int_{\varphi^{-1}(E)} \widehat{\varphi^*\omega} d\mu_k,$$

где φ — положительно ориентирующая параметризация стандартной окрестности U , содержащей E , а $\varphi^*\omega$ — pullback формы ω .

Связь с интегралом первого рода

Для малого множества E и формы $\omega = \sum a_{i_1 \dots i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ интеграл второго рода выражается через интеграл первого рода:

$$\int_E \omega = \int_E \left\langle a, \frac{\det \varphi'}{\sqrt{\mathcal{D}_\varphi}} \circ \varphi^{-1} \right\rangle d\mu_M,$$

где $\mathcal{D}_\varphi = \sum (\det \varphi'_{j_1 \dots j_k})^2$ — грамиан параметризации.

Примеры для размерностей 1 и 2:

- Для $k = 1$ (кривая): $\int_E \omega = \int_E \langle a, \tau \rangle d\mu_1$, где τ — единичный касательный вектор.
- Для $k = 2, n = 3$ (поверхность):

$$\int_S \omega = \int_S \langle F, N \rangle d\mu_S, \quad F = (P, Q, R), \quad N \text{ — единичная нормаль.}$$

Теорема Пуанкаре (без доказательства):

Если G — звездная область в \mathbb{R}^n и ω — замкнутая форма ($d\omega = 0$), то ω точна ($\exists \eta : \omega = d\eta$).
Для форм класса C^r первообразная также C^r .

50. Общая формула Стокса. Частные случаи и следствия общей формулы Стокса: формула Ньютона-Лейбница для криволинейных интегралов, формула Грина, классическая формула Стокса, формула Гаусса–Остроградского

Общая формула Стокса для многообразий

Пусть $M \in \mathbb{M}_{kn}^{(2)}$ — компактное и ориентированное многообразие, G — открытое множество в \mathbb{R}^n , $M \subset G$, $\omega \in \Omega_{k-1}^{(1)}(G)$. Тогда:

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

Формула Грина

Пусть D — ограниченная область в \mathbb{R}^2 с гладкой границей ∂D , G открыто в \mathbb{R}^2 , $\overline{D} \subset G$, $P, Q \in C^{(1)}(G)$. Тогда:

$$\iint_D (Q'_x - P'_y) dx dy = \int_{\partial D} P dx + Q dy.$$

Классическая формула Стокса

Пусть S — компактная ориентированная поверхность класса $C^{(2)}$ в \mathbb{R}^3 с краем ∂S , G открыто в \mathbb{R}^3 , $S \subset G$, $P, Q, R \in C^{(1)}(G)$. Тогда:

$$\iint_S (R'_y - Q'_z) dy \wedge dz + (P'_z - R'_x) dz \wedge dx + (Q'_x - P'_y) dx \wedge dy = \int_{\partial S} P dx + Q dy + R dz.$$

Формула Гаусса–Остроградского

Пусть V — ограниченная область в \mathbb{R}^3 с гладкой границей ∂V , G открыто в \mathbb{R}^3 , $V \subset G$, $P, Q, R \in C^{(1)}(G)$. Тогда:

$$\iiint_V (P'_x + Q'_y + R'_z) dx dy dz = \iint_{\partial V} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy.$$

51: Неравенства Минковского и Гёльдера, существенный супремум, пространства $L_p(X, \mu)$

Теорема (Неравенство Гёльдера):

Пусть (X, \mathbb{A}, μ) — пространство с мерой, $E \in \mathbb{A}$, функции f и g измеримы на E , существует $\int_E fg d\mu$, $1 < p < +\infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда:

$$\left| \int_E fg d\mu \right| \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int_E |g|^q d\mu \right)^{1/q}.$$

Неравенство Минковского для интегралов

Теорема (Неравенство Минковского):

Пусть (X, \mathbb{A}, μ) — пространство с мерой, $E \in \mathbb{A}$, функции f и g измеримы, конечны почти

езде на E , $1 \leq p < +\infty$. Тогда:

$$\left(\int_E |f + g|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_E |g|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

Существенный супремум функции

Для измеримой функции $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ почти везде на пространстве с мерой (X, \mathbb{A}, μ) существенный супремум:

$$\operatorname{ess\,sup}_{x \in E} f(x) = \inf \{ A \in \mathbb{R} : f(x) \leq A \text{ почти везде на } E \}.$$

(Если таких A нет, полагаем $+\infty$.)

Пространства $L_p(X, \mu)$

Для $1 \leq p < +\infty$:

$$L_p(E, \mu) = \left\{ f : \text{н.в. } E \rightarrow \mathbb{R} \text{ измеримы, } \int_E |f|^p d\mu < +\infty \right\}.$$

Для $p = +\infty$:

$$L_\infty(E, \mu) = \{ f : \text{н.в. } E \rightarrow \mathbb{R} \text{ измеримы, } \operatorname{ess\,sup} |f| < +\infty \}.$$

Норма: $\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{1/p}$ (для L_∞ — $\operatorname{ess\,sup} |f|$).

52: Вложения пространств Лебега $L_p(X, \mu)$ и пространств ℓ_p . Несравнимость пространств L_p

Вложение $L_q \subset L_p$ при конечной мере

Если мера пространства $\mu E < +\infty$ и индексы удовлетворяют условию $1 \leq p < q \leq +\infty$, то $L_q(E, \mu) \subset L_p(E, \mu)$. Более того, для любой функции $f \in L_q(E, \mu)$ выполняется неравенство:

$$\|f\|_{L_p(E,\mu)} \leq (\mu E)^{1/p-1/q} \|f\|_{L_q(E,\mu)}.$$

Несравнимость L_p при бесконечной мере

Если $\mu E = +\infty$, то пространства $L_p(E, \mu)$ могут не быть вложены друг в друга. Контрпример: $E = (0, +\infty)$ с мерой Лебега,

- $f_1(x) = \frac{1}{x+1}$: $f_1 \in L_2(E)$ но $f_1 \notin L_1(E)$.
- $f_2(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \chi_{(0,1)}(x)$: $f_2 \in L_1(E)$ но $f_2 \notin L_2(E)$.

Пространства ℓ_p и вложение периодических L_p

Пространство ℓ_p состоит из последовательностей $x = (x_k)_{k=1}^{\infty}$ с конечной нормой:

$$\|x\|_p = \begin{cases} (\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p)^{1/p}, & 1 \leq p < +\infty, \\ \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k|, & p = +\infty. \end{cases}$$

Для 2π -периодических функций на \mathbb{R} с мерой Лебега на $[-\pi, \pi]$ верно вложение пространств:

$$C \subset L_{\infty} \subset \dots \subset L_2 \subset \dots \subset L_1,$$

где C — пространство непрерывных 2π -периодических функций с нормой $\|f\|_{\infty} = \max_{x \in [-\pi, \pi]} |f(x)|$, совпадающей с L_{∞} -нормой для непрерывных функций.

53. Полнота пространства $C(K)$

Определение полного нормированного пространства

Нормированное пространство X называется полным (банаховым), если любая фундаментальная последовательность в X сходится к некоторому элементу из X .

Последовательность $(x_n) \subset X$ фундаментальна, если $\forall \epsilon > 0 \exists N: \forall n, m \geq N$ выполняется $\|x_n - x_m\|_X < \epsilon$.

Пространство непрерывных функций $C(K)$

Пусть K — компактное топологическое пространство. Пространство $C(K)$ состоит из всех непрерывных функций $f: K \rightarrow \mathbb{C}$ (или \mathbb{R}), с нормой $\|f\|_{C(K)} = \sup_{x \in K} |f(x)|$. Обозначается

$C_{\mathbb{C}}(K)$ или $C_{\mathbb{R}}(K)$ в зависимости от поля.

Теорема о полноте $C(K)$

Пространство $C(K)$ полно.

54. Критерий полноты нормированного пространства

Определение полного нормированного пространства (банахово пространство)

Нормированное пространство $(X, \|\cdot\|)$ называется полным, если любая фундаментальная последовательность в X сходится к элементу этого пространства. Полное нормированное пространство также называют банаховым.

Критерий полноты через абсолютную сходимость ряда

Нормированное пространство X полно тогда и только тогда, когда любой абсолютно сходящийся ряд в X сходится, то есть:

$$x_k \in X, \sum_{n=1}^{\infty} \|x_k\| < +\infty \implies \sum_{n=1}^{\infty} x_k \text{ сходится в } X.$$

55 Полнота пространств $L^p(X, \mu)$ при $p \in [1, +\infty]$

Определение пространства $L^p(X, \mu)$

Пусть (X, \mathcal{A}, μ) — пространство с мерой, $p \in [1, +\infty]$. Пространство $L^p(X, \mu)$ — полное, состоит из измеримых функций $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ (или \mathbb{C}), для которых конечна норма:

- при $p < +\infty$: $\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu\right)^{1/p},$

- при $p = +\infty$: $\|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in X} |f(x)|$.

Критерий полноты пространства L^p

Пространство $L^p(X, \mu)$ полно при $p \in [1, +\infty]$, то есть любая фундаментальная последовательность $\{f_n\} \subset L^p$ сходится к некоторой функции $f \in L^p$ по норме $\|\cdot\|_p$.

Теорема Рисса-Фишера

Любое нормированное пространство $L^p(X, \mu)$ при $p \in [1, +\infty]$ является банаховым (полным). В частности, если $\{f_n\}$ — фундаментальна в L^p , то существует $f \in L^p$, такая что $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.

56. Плотность ступенчатых функций в L^p

Определение плотного множества в метрическом пространстве

Подмножество K_0 метрического пространства (X, d) называется **плотным** в X , если его замыкание совпадает с X :

$$\overline{K_0} = X.$$

Определение ступенчатой функции

Функция $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ называется ступенчатой (обозначается $g \in \operatorname{step}(X, \mu)$), если она представима в виде:

$$g = \sum_{k=1}^n c_k \cdot \chi_{E_k}, \quad \text{где} \quad \mu(E_k) < \infty, \quad c_k \in \mathbb{R}.$$

Теорема о плотности в L^p для $1 \leq p < \infty$

Пусть (X, \mathcal{A}, μ) — пространство с мерой, и $1 \leq p < \infty$. Тогда для любой $f \in L^p(X, \mu)$ и $\varepsilon > 0$ существует ступенчатая функция $g \in \operatorname{step}(X, \mu)$ такая, что:

$$\|f - g\|_p < \varepsilon, \quad \text{где} \quad \|h\|_p = \left(\int_X |h|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

57. Плотность $C_0(\mathbb{R}^n)$ в $L^p(\mathbb{R}^n)$, плотность $C_{2\pi}$ в $L^p_{2\pi}$

Аппроксимация характеристических функций ограниченных множеств

Для ограниченного измеримого множества $E \subset \mathbb{R}^n$ с $\lambda_n(E) < \infty$ и $\chi_E \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ($1 \leq p < \infty$), существует функция $g \in C_0(\mathbb{R}^n)$ такая, что:

$$\|\chi_E - g\|_p \leq 2\epsilon.$$

Конструкция:

$$g(x) = 1 - \frac{d(x, \mathbb{R}^n \setminus U)}{d(x, \mathbb{R}^n \setminus U) + d(x, E)},$$

где $U \supset E$ — открытое множество с $\lambda_n(U \setminus E) < \epsilon$.

Аппроксимация простых функций

Любая простая функция $f = \sum_{k=1}^N c_k \chi_{E_k}$ с $\lambda_n(E_k) < \infty$ аппроксимируется функцией $g \in C_0(\mathbb{R}^n)$:

$$\|f - g\|_p < \epsilon, \quad \text{где} \quad g = \sum_{k=1}^N c_k g_k,$$

и для каждого k : $\|\chi_{E_k} - g_k\|_p < \frac{\epsilon}{N \cdot \max(|c_k|)}$.

Плотность $C_0(\mathbb{R}^n)$ в $L^p(\mathbb{R}^n)$ и $C_{2\pi}$ в $L^p_{2\pi}$

- Для $L^p(\mathbb{R}^n)$: $\forall f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ и $\epsilon > 0 \exists g \in C_0(\mathbb{R}^n) : \|f - g\|_p < \epsilon$.
- Для $L^p_{2\pi}$ (периодические функции): $\forall f \in L^p_{2\pi} \exists g \in C_{2\pi} : \|f - g\|_{L^p_{2\pi}} < \epsilon$, где $C_{2\pi}$ — непрерывные 2π -периодические функции.

58 Теорема о непрерывности сдвига

Определение Оператора Сдвига

Пусть $h \in \mathbb{R}^m$. Оператор сдвига на вектор h определяется как отображение, действующее на функцию f по правилу:

$$(\tau_h f)(x) = f(x + h).$$

Теорема о Непрерывности Сдвига в L^p

Пусть $1 \leq p < +\infty$ и $f \in L^p(\mathbb{R}^m)$. Тогда оператор сдвига непрерывен по норме пространства L^p , то есть:

$$\lim_{|h| \rightarrow 0} \|\tau_h f - f\|_p = \lim_{|h| \rightarrow 0} \left(\int_{\mathbb{R}^m} |f(x + h) - f(x)|^p dx \right)^{1/p} = 0.$$

59. Гильбертовы пространства. Непрерывность скалярного произведения. Скалярное умножение в $L^2(X, \mu)$. Примеры ортогональных систем в $L^2(X, \mu)$

Гильбертовы пространства

Полное линейное пространство H , снабженное скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$, относительно нормы $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Непрерывность скалярного произведения

Если $x_n \rightarrow x$ и $y_n \rightarrow y$ в H , то $\langle x_n, y_n \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$.

Скалярное умножение в $L^2(X, \mu)$

Для $f, g \in L^2(X, \mu)$ скалярное произведение задается формулой:

$$\langle f, g \rangle = \int_X f(x) \overline{g(x)} d\mu(x).$$

\bar{g} обозначает комплексно сопряжённое значение. Например, для $g = a + bi$, верно $\bar{g} = a - bi$.

Ортогональные системы в $L^2(X, \mu)$

Система функций $\{\phi_k\} \subset L^2(X, \mu)$ называется ортогональной, если:

$$\langle \phi_m, \phi_n \rangle = 0 \quad \text{при} \quad m \neq n.$$

Если дополнительно $\|\phi_k\| = 1$ для всех k , система называется ортонормированной.

Примеры ортогональных систем в $L^2(X, \mu)$

1. Тригонометрическая система $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ в $L^2([-\pi, \pi])$.
2. Многочлены Лежандра $\{P_n\}$ в $L^2([-1, 1])$.
3. Функции Хаара на отрезке.

60. Теорема Пифагора для гильбертовых пространств и критерий сходимости ортогонального ряда

Лемма о почленном умножении сходящегося ряда

Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ — сходящийся ряд в гильбертовом пространстве \mathcal{H} . Тогда для любого вектора $y \in \mathcal{H}$ выполняется:

$$\left\langle \sum_{k=1}^{\infty} x_k, y \right\rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \langle x_k, y \rangle.$$

Критерий сходимости ортогонального ряда

Ортогональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ в гильбертовом пространстве \mathcal{H} сходится тогда и только тогда, когда сходится числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|^2$. При этом выполняется равенство:

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|^2.$$

Теорема Пифагора для гильбертовых пространств

Для любого конечного набора ортогональных векторов $\{x_k\}_{k=1}^N$ в \mathcal{H} выполняется:

$$\left\| \sum_{k=1}^N x_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^N \|x_k\|^2.$$