
(a) domain scores
(outcome-blind)
(b) adjusted association of each score
with the outcomes, in time order
(c) single-factor screen
(43 of 49 factors)
metabolic
procedural
coagulation
renal/electrolyte
inflammatory
red cell/platelet
lipid
3 vars
9 vars
2 vars
4 vars
12 vars
9 vars
4 vars
3.75 (2.01 to 8.40) q < 0.001**
−2.5 pts
−6.1 pts
2.77 (1.40 to 6.86) q = 0.013*
3.80 (1.73 to 11.09) q = 0.001**
1.39 (0.92 to 2.15)
−1.8 pts
−10.7 pts q = 0.185
1.63 (1.00 to 2.77) q = 0.115
1.69 (1.04 to 2.91) q = 0.110
1.52 (0.97 to 2.45)
−1.7 pts
−3.3 pts
1.68 (1.01 to 3.05) q = 0.115
1.68 (1.01 to 3.06) q = 0.110
1.34 (0.83 to 2.23)
−1.9 pts
−3.2 pts
0.97 (0.56 to 1.69)
0.84 (0.49 to 1.45)
1.12 (0.67 to 1.88)
+0.5 pts
+4.1 pts
0.78 (0.40 to 1.47)
0.80 (0.41 to 1.51)
1.05 (0.67 to 1.68)
−0.7 pts
+1.6 pts
1.12 (0.68 to 1.84)
1.31 (0.81 to 2.21)
0.99 (0.62 to 1.60)
+0.2 pts
+3.2 pts
0.97 (0.58 to 1.65)
1.01 (0.60 to 1.72)
2/3
0/10
0/2
0/4
0/12
0/8
0/4
0
0.5
1
variance explained (bar)
loading congruence, 5th pct to median (line)
fENI (discharge)
Barthel (rehab entry)
Berg (rehab entry)
mRS 3–6 (90 days)
mRS 3–6 (12 months)
0
10
factors screened (light)
nominal p<0.05 (mid)
FDR q<0.05 (red)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
log odds ratio per SD (rehabilitation columns scaled to range) → worse