① $dX_t = k(\theta - X_t)dt + \sigma dW_t$

$dY_t = B_t dt + \int_0^t A(t-s)\,B_s\,dW_s$

$X_t = e^{At}X_0 + \int_0^t e^{A(t-s)}B\,dW_s$

$du(t,x) = u'(t,x)dt + u_x(t,x)dx + \frac{1}{2}u_{xx}(t,x)\,dx\,dx$

$Y_t = \theta - X_t$

$dY_t = -dX_t = -k(\theta - X_t)\,dt - \sigma dW_t = -kY_t\,dt - \sigma\,dW_t$

$u(t,x) = \theta - x$

$u' = 0$

$u_x = -1$

$u_{xx} = 0$

$Y_t = e^{-kt}Y_0 - \int_0^t e^{-k(t-s)}\sigma dW_s$

$\theta - X_t = e^{-kt}(\theta - X_0) - \int_0^t e^{-k(t-s)}\sigma\,dW_s$

$-X_t = -\theta + \theta e^{-kt} - X_0 e^{-kt} - \int_0^t \dots$

$X_t = X_0 e^{-kt} + \theta(1 - e^{-kt}) + \int_0^t e^{-k(t-s)}\sigma\,dW_s$

② $dX_t = \mu X_t\,dt + \sigma X_t\,dW_t$ $\quad df = f\cdot g$, $\frac{df}{dt} = g$, $df = f\cdot g\,dt$

$\ln X_t$

$Y_t = \ln X_t$

$dY_t = \frac{1}{X_t}dX_t - \frac{1}{2}\frac{1}{X_t^2}(dX_t)^2$

$dY_t = \frac{1}{X_t}(\mu X_t\,dt + \sigma X_t\,dW_t) - \frac{1}{2}\frac{1}{X_t^2}\sigma^2 X_t^2\,dt$

$(dX_t)^2 = \mu^2 X_t^2(dt)^2 + 2\mu\sigma X_t^2\,dt\,dW_t + \sigma^2 X_t^2(dW_t)^2 = \sigma^2 X_t^2(dW_t)^2$

$dt\,dt = 0$, $dt\,dW = 0$, $dW\,dt = 0$, $(dW)^2 = dt$

$\int_0^t (dW)^2 = t$

$Y_t = \ln X_t + 2\sigma W_t - \frac{1}{2}\sigma^2 t = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t$

$\Rightarrow dY_t = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t \;\Big|\int_0^t \Rightarrow Y_t = Y_0 + \int_0^t (\mu - \frac{\sigma^2}{2})ds + \int_0^t \sigma dW_s$

$Y_t - Y_0 = \int_0^t (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\,ds + \int_0^t \sigma\,dW_s$

$Y_t - Y_0 = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma(W_t - W_0)$

$X_t = X_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t)}$

Метод интегрирующего множителя

$dX_t = f(t, X_t)\,dt + \sigma(t)X_t\,dW_t$

① $dG_t = \sigma(t)G_t\,dW_t$ — урав. вида $\dot{y} = a(t)y$, $\int_0^t f'(s)ds + \int_0^t \sigma dW_s$

$G_t = e^{\int_0^t \sigma(s)ds + \int_0^t \sigma dW_s}$

② $F_t = \frac{1}{G_t}$

$dF_t = -\frac{1}{G_t^2}dG_t + \frac{2}{G^3}\sigma^2 G_t^2\,dt$ ③

$f(t,x) = \frac{1}{x}$

$f' = 0$

$f_x = -\frac{1}{x^2}$ $\quad f_{xx} = \frac{2}{x^3}$

③ $-\frac{1}{G_t^2}\sigma(t)X_t\,dW_t + \frac{1}{G^3}\sigma^2(t)G_t^2\,dt =$

$= -\frac{1}{G_t}\sigma(t)dW_t + \frac{1}{G_t}\sigma^2(t)\,dt =$

$= F_t\sigma^2(t)dt - \sigma(t)F_t\,dW_t$

③ $C_t = F_t X_t$

$dC_t = d(F_t X_t) = F_t\,dX_t + X_t\,dF_t + dX_t\,dF_t =$

$= F_t(f(t,X_t)dt + \sigma(t)X_t dW_t) + X_t(F_t\sigma^2(t)dt - \sigma(t)F_t\,dW_t)$

$-\sigma^2(t)X_tF_t\,dt =$

$= F_t f(t,X_t)dt + \sigma(t)F_tX_t\,dW_t + X_tF_t\sigma^2(t)dt - \sigma(t)X_tF_t\,dW_t - \sigma^2(t)X_tF_t\,dt$

$d(C_t) = F_t f(t, X_t)\,dt$

$X_t \cdot G_t \cdot F_t$, $C_t = G_t$

$dC_t = F_t f(t, C_t G_t)\,dt$ — "вроде" ОДУ

④ $X_t = G_t C_t$

Пример $dX_t = \frac{1}{X_t}dt + \alpha X_t\,dW_t$

$f(t,x) = \frac{1}{x}$

$G_t = e^{-\frac{\alpha^2}{2}t + \alpha W_t}$

$F_t = \frac{1}{G_t} = e^{\frac{\alpha^2}{2}t - \alpha W_t}$

$dC_t = F_t f(t, C_t G_t) = F_t \cdot \frac{1}{C_t G_t} = \frac{F_t^2}{C_t}$

$dC_t = \frac{F_t^2}{C_t}$

$C_t\,dC_t = F_t^2$

$\frac{1}{2}dC_t^2 = F_t^2$

$C_t^2 = \int_0^t F_s^2\,ds + __ = 2\int_0^t e^{\alpha^2 s - 2\alpha W_s}\,ds + __$

$X_t = G_t C_t = e^{\alpha W_t - \frac{\alpha^2}{2}t}\sqrt{2\int_0^t e^{\alpha^2 s - 2\alpha W_s}\,ds + __}$

Ⓨ $dX_t = k(\theta - X_t)dt + \sigma\sqrt{X_t}\,dW_t$

$E[X_t] = ?$

$X_t = X_0 + \int_0^t k(\theta - X_s)\,ds + \int_0^t \sigma\sqrt{X_s}\,dW_s$

$E[X_t] = E[X_0] + kE\left[\int_0^t(\theta - X_s)ds\right] + E\left[\int_0^t \sigma\sqrt{X_s}\,dW_s\right]$ (→ 0)

$= E[X_0] + k\left(\theta t - \int_0^t E[X_s]\,ds\right)$

$Y_t = X_0 + k\left(\theta t - \int_0^t y_s\,ds\right)$

$dy_t = k\theta - ky_t \;\to$ ОДУ $\quad y_0 = x_0$

$y_t = \theta + (x_0 - \theta)e^{-kt}$

$E(X_t) = \theta + (x_0 - \theta)e^{-kt}$

$E[X^2]$

$dX^2 = 2X\,dX + (dX)^2 \;\to$ интегр. $\to E \to$ ОДУ $\to E[X^2]$

$X_{t_{i+1}} = X_{t_i} + \int_{t_i}^{t_{i+1}} \mu X_s\,ds + \int_{t_i}^{t_{i+1}} \sigma X_s\,dW_s \qquad X_0 = x$

$X_{t_i} + \mu X_{t_i}(t_{i+1} - t_i) + \sigma X_{t_i}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$

$\sim N(0, t_{i+1} - t_i)$

$X_t = X_0 e^{(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t)}$

$W_t = \sum_{i=1}^{N}\xi_i \qquad \xi_i \sim N(0, \Delta t)$

$(0,1) \to N \qquad \Delta t = \frac{1}{N}$

Симпсон. N точек $\to \sim N(0, \delta t)$

сложим n точек $W_t \to$ одна реализация X_t

N точек на сколько реш Δt

$N/64$ точек, $N/16$ точек, $N/2$ точек } ранг Э.-М. $\Delta t \times 64$, $\Delta t \times 16$, $\Delta t \times 2$