

## Руководство по работе с программой

### Диаграммы Гейла

*Александр Максименко*

**Выпуклые  $d$ -мерные многогранники.** Данная программа представляет собой инструмент для изучения комбинаторных свойств выпуклых многогранников [1, 2]. Каждый такой многогранник состоит из граней различных размерностей. Грани минимальной размерности, 0-грани, называются *вершинами*. Грани максимальной размерности,  $(d-1)$ -грани, где  $d$  — размерность многогранника, называются *гипергранями* или *фасетами*. Грани размерности 1 называются *ребрами*, а грани размерности  $d-2$  — *гребнями* или *риджами*. Комбинаторный тип многогранника однозначно определяется его *матрицей инцидентий фасет-вершин*. Множество строк этой матрицы находится во взаимно-однозначном соответствии с множеством фасет многогранника, а множество её столбцов — с множеством вершин многогранника. На пересечении  $i$ -ой строки и  $j$ -го столбца этой матрицы вписана единица, если  $i$ -я фасета многогранника содержит  $j$ -ю вершину, в противном случае вписан ноль.

**Диаграмма Гейла.** *Диаграммой Гейла* называется конечное множество точек (векторов)  $X \subset \mathbb{R}^d$ . Причем одна и та же точка может присутствовать несколько раз (иметь кратность). Хорошо известно [1, 2], что каждому  $m$ -мерному выпуклому многограннику на  $n$  вершинах  $V$  может быть поставлена в соответствие диаграмма Гейла (множество точек)  $X$  со следующими свойствами:

1. Размерность  $d$  диаграммы равна  $n - m - 1$ .
2. Число точек в диаграмме совпадает с числом вершин многогранника, и между этими множествами установлено взаимно-однозначное соответствие  $\alpha: V \rightarrow X$ .
3. При удалении любой (одной) точки из диаграммы Гейла выпуклая оболочка остальных точек имеет размерность  $d$  и содержит начало координат в качестве внутренней точки.

4. Подмножество  $F \subseteq V$  является множеством вершин некоторой грани многогранника  $\text{conv}(V)$  тогда, и только тогда, когда начало координат является относительной внутренней точкой выпуклой оболочки множества  $Y = \alpha(V \setminus F)$ ,  $Y \subseteq X$ . В таком случае  $Y$  называют *когранью*.

Более того, каждая диаграмма Гейла, удовлетворяющая третьему свойству, соответствует некоторому выпуклому многограннику с указанными выше свойствами.

Таким образом, если число вершин многогранника не сильно отличается от его размерности, то для изучения его комбинаторных свойств удобнее перейти к рассмотрению диаграммы Гейла, которая, при таких условиях, будет иметь небольшую размерность. Кроме того, как показывает опыт, именно такие случаи (когда число вершин не сильно отличается от размерности) представляют особый интерес в рамках комбинаторной теории выпуклых многогранников.

**Критерий кофасеты.** Из перечисленных выше свойств диаграммы Гейла следует, что подмножество  $F \subseteq V$  является множеством вершин некоторой фасеты многогранника  $\text{conv}(V)$  тогда, и только тогда, когда выпуклая оболочка множества  $Y = \alpha(V \setminus F)$  является симплексом и содержит начало координат в качестве относительной внутренней точки. Если последнее выполнено, то  $Y$  называется *кофасетой* соответствующей диаграммы Гейла.

**Примеры.** Если в качестве  $X \subset \mathbb{R}^3$  взять множество вершин октаэдра

$$\begin{aligned} x_1 &= (1, 0, 0), \\ x_2 &= (-1, 0, 0), \\ x_3 &= (0, 1, 0), \\ x_4 &= (0, -1, 0), \\ x_5 &= (0, 0, 1), \\ x_6 &= (0, 0, -1), \end{aligned}$$

то такая диаграмма Гейла будет содержать ровно три кофасеты:  $\{x_1, x_2\}$ ,  $\{x_3, x_4\}$ ,  $\{x_5, x_6\}$ . Но третье свойство для этой диаграммы не выполнено.

В частности, начало координат  $(0, 0, 0)$  лежит на границе выпуклой оболочки множества  $\{x_2, x_3, \dots, x_6\}$ . Это означает, что данная диаграмма не соответствует никакому выпуклому многограннику.

Рассмотрим теперь множество вершин шестиугольника в  $\mathbb{R}^2$ :

$$\begin{aligned}x_1 &= (2, 1), \\x_2 &= (2, -1), \\x_3 &= (0, -2), \\x_4 &= (-2, -1), \\x_5 &= (-2, 1), \\x_6 &= (0, 2).\end{aligned}$$

Такая диаграмма Гейла содержит пять кофасет:  $\{x_1, x_4\}$ ,  $\{x_2, x_5\}$ ,  $\{x_3, x_6\}$ ,  $\{x_1, x_3, x_5\}$ ,  $\{x_2, x_4, x_6\}$ . Соответствующий ей трехмерный многогранник является треугольной призмой.

Диаграмме Гейла, образованной вершинами треугольника с кратностью два

$$\begin{aligned}x_1 &= (1, 1), \\x_2 &= (1, 1), \\x_3 &= (1, -1), \\x_4 &= (1, -1), \\x_5 &= (-1, 0), \\x_6 &= (-1, 0),\end{aligned}$$

соответствует трехмерный октаэдр, имеющий 6 вершин и 8 фасет:  $\{x_1, x_3, x_5\}$ ,  $\{x_1, x_3, x_6\}$ ,  $\{x_1, x_4, x_5\}$ ,  $\{x_1, x_4, x_6\}$ ,  $\{x_2, x_3, x_5\}$ ,  $\{x_2, x_3, x_6\}$ ,  $\{x_2, x_4, x_5\}$ ,  $\{x_2, x_4, x_6\}$ .

**Основная идея реализации.** Рассмотрим подмножество точек  $Y = \{y^1, \dots, y^k\}$  диаграммы  $X$ . Из описанного выше критерия кофасеты следует, что  $Y$  является кофасетой тогда, и только тогда, когда система

$$\begin{aligned}x_1 y^1 + \dots + x_k y^k &= 0, \\x_1 + \dots + x_k &= 1,\end{aligned}$$

имеет единственное решение и  $x_i > 0$ ,  $i \in [k]$ . (Более того, никакое подмножество множества  $Y$  этому условию не удовлетворяет.) Такая проверка может быть выполнена, например, с помощью метода Гаусса для решения систем линейных уравнений.

Та же идея используется и для проверки третьего свойства диаграммы Гейла. А именно, пусть  $x$  — одна из точек диаграммы Гейла и  $Y = X \setminus \{x\}$ . Воспользуемся тем, что вершина  $\alpha^{-1}(x)$  многогранника  $\text{conv}(V)$  должна быть пересечением как минимум  $m$  фасет, где  $m = n - d - 1$  — размерность многогранника. Предположим, что все фасеты (точнее, множества их вершин) уже найдены на предыдущем шаге. Выберем из них те, что содержат тестируемую вершину  $\alpha^{-1}(x)$ . Если их число оказалось меньше  $n - d - 1$ , то эта диаграмма не может соответствовать выпуклому многограннику. Если же их не меньше, чем  $n - d - 1$ , то остается убедиться в том, что система векторов из  $Y$  имеет ранг не менее  $d$ . Это можно сделать с помощью того же метода Гаусса, располагая вектора в строках соответствующей матрицы.

**Формат входных данных.** Во входном файле, содержащем диаграмму Гейла, первая строка содержит два целых числа, разделенных пробелом(ами): размерность диаграммы и число точек в ней. Далее идет список точек. Описание каждой точки занимает одну строку и представляет собой несколько целых чисел (координат точки), разделенных пробелами. На значения входных данных накладываются следующие ограничения:

1. Все числа целые. Никакие символы, кроме цифр и пробельных символов (переводов строки, табуляций) недопустимы.
2. Размерность диаграммы не может быть больше 16 (константа `MAX_DIM` в коде программы).
3. Число точек не может быть больше 64 (особенность реализации, связанная с разрядностью ОС).
4. Значения координат точек не могут быть по абсолютной величине больше, чем 2 (константа `MAX_NUMBERS` в коде программы). Эта константа может быть на несколько порядков увеличена, если размерность обрабатываемых диаграмм невелика.

Пример входного файла, содержащего вершины шестиугольника:

```
2 6
2 1
2 -1
```

```
0 -2
-2 -1
-2 1
0 2
```

**Работа с программой.** Программа написана на языке C++ и, в случае использования компилятора GNU, компилируется следующей командой:

```
g++ gale-main.cpp gale-diagram.cpp -o gale
```

Единственным параметром получившегося исполняемого файла `gale.exe` является имя файла, содержащего описание диаграммы Гейла. Пример использования:

```
gale 2d6v.g
```

Результат работы программы сохраняется в файл с расширением `.out`. Формат и способ вывода результатов работы программы может быть скорректирован вручную в основном файле `gale-main.cpp`. В текущей версии в выходной файл сохраняется:

1. Описание диаграммы в исходном виде.
2. Список множеств вершин, образующих фасеты.
3. Матрица инцидентий фасет-вершин.
4. Если диаграмма не соответствует никакому выпуклому многограннику, то выводится номер первой точки, для которой не выполнено третье свойство диаграммы Гейла и файл заканчивается надписью `This is not convex polytope!`
5. Далее выводится число риджей и список ребер многогранника.

**Дополнения.** Для тестирования данной программы написана программа `genexamples.cpp`, генерирующая несколько примеров диаграмм Гейла. Список команд для её компиляции, запуска и обработки сгенерированных примеров содержится в файле `test.bat`.

## Список литературы

- [1] Grünbaum B. Convex polytopes. Second edition. Springer, 2003.
- [2] Циглер Г.М. Теория многогранников: Пер. с англ. / Под ред. Н.П. Долбилина. М.: МЦНМО, 2014.