Séquence 2 : Droites, segments et codage

12 octobre 2020

Objectifs

- Reconnaître un segment, une demie-droite, une droite et savoir les tracer;
- Tracer avec l'équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné;
- Tracer avec la règle et l'équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un point donné;
- Déterminer la distance entre deux points, entre un point et une droite;
- Savoir coder et lire une figure.

Compétences

- Modéliser
- Représenter
- Raisonner
- Communiquer

I. Droites

II. Sécantes, perpendiculaires et parallèles

III. Longueurs et codages

Une <u>droite</u> est un objet géométrique formé de <u>points alignés</u>. Une droite est illimitée des deux cotés.

Une <u>droite</u> est un objet géométrique formé de <u>points alignés</u>. Une droite est illimitée des deux cotés.

Propriétés

- Une droite qui passe par deux points A et B, se note (AB) ou (BA);
- Si un point C appartient à la droite (AB), on note $C \in (AB)$.
- Si il n'appartient pas à la droite (AB), on note $C \notin (AB)$.

Une <u>droite</u> est un objet géométrique formé de <u>points alignés</u>. Une droite est illimitée des deux cotés.

Propriétés

- Une droite qui passe par deux points A et B, se note (AB) ou (BA);
- Si un point C appartient à la droite (AB), on note $C \in (AB)$.
- Si il n'appartient pas à la droite (AB), on note $C \notin (AB)$.

Exemple

Les points M, R et A sont alignés.



- La droite (d) passant par les points M et R se note
- Le point A appartient à la droite (MR), on note :
- Le point S n'appartient pas à la droite (MR), on note :

Une <u>demi-droite</u> est une portion de droite limitée d'un seul côté par un point, son <u>origine</u>.

Une <u>demi-droite</u> est une portion de droite limitée d'un seul côté par un point, son <u>origine</u>.

Propriété

La demi-droite d'origine A et passant par B se note [AB).

Une <u>demi-droite</u> est une portion de droite limitée d'un seul côté par un point, son <u>origine</u>.

Propriété

La demi-droite d'origine A et passant par B se note [AB).

Exemple



La demi droite

Un <u>segment</u> est une portion de droite limitée par deux points : ses <u>extrémités</u>.

Propriété

Le segment d'extrémités A et B se note [AB] ou [BA].

Exemple



Le segment

I. Droites

II. Sécantes, perpendiculaires et parallèles

III. Longueurs et codages


Deux droites sont sécantes

Deux droites sont <u>sécantes</u> si elles n'ont qu'un seul point commun :

Deux droites sont <u>sécantes</u> si elles n'ont qu'un seul point commun : leur point d'intersection.


Deux droites sont <u>sécantes</u> si elles n'ont qu'un seul point commun : leur point d'intersection.

Exemple



Deux droites sont <u>sécantes</u> si elles n'ont qu'un seul point commun : leur point d'intersection.

Exemple



Les droites (d) et (d') sont sécantes en O qui est leur point d'intersection.

Deux droites (d_1) et (d_2) sont

Deux droites (d_1) et (d_2) sont <u>perpendiculaires</u> si elles se coupent en formant <u>quatre angles droits</u>.


Deux droites (d_1) et (d_2) sont <u>perpendiculaires</u> si elles se coupent en formant <u>quatre angles droits</u>. On note $(d_1) \perp (d_2)$.

Deux droites (d_1) et (d_2) sont <u>perpendiculaires</u> si elles se coupent en formant <u>quatre angles droits</u>. On note $(d_1) \perp (d_2)$.

Exemple

Deux droites (d_1) et (d_2) sont <u>perpendiculaires</u> si elles se coupent en formant <u>quatre angles droits</u>. On note $(d_1) \perp (d_2)$.

Exemple



Les droites (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires en A.

Deux droites (d_3) et (d_4)

Deux droites (d_3) et (d_4) qui ne sont pas sécantes sont parallèles.

Deux droites (d_3) et (d_4) qui ne sont pas sécantes sont <u>parallèles</u>. On note $(d_3)//(d_4)$..

Deux droites (d_3) et (d_4) qui ne sont pas sécantes sont <u>parallèles</u>. On note $(d_3)//(d_4)$..

Exemple

 (d_3)

 (d_4)

Deux droites (d_3) et (d_4) qui ne sont pas sécantes sont <u>parallèles</u>. On note $(d_3)//(d_4)$..

Exemple

d₃)

 (d_4)

Les droites (d_3) et (d_4) sont parallèles.

Deux droites (d_3) et (d_4) qui ne sont pas sécantes sont <u>parallèles</u>. On note $(d_3)//(d_4)$..

Exemple

(d₃)

Les droites (d_3) et (d_4) sont parallèles. Même en les prolongeant à l'infini elles ne se rencontreront jamais.

- I. Droites
- II. Sécantes, perpendiculaires et parallèles
- III. Longueurs et codages

La mesure d'un segment

La mesure d'un segment (distance entre ses deux extrémités)

La mesure d'un segment (distance entre ses deux extrémités) est sa longueur.

La mesure d'un segment (distance entre ses deux extrémités) est sa longueur.

La longueur d'un segment [AB],

La mesure d'un segment (distance entre ses deux extrémités) est sa longueur.

La longueur d'un segment [AB], se note AB ou BA.

La mesure d'un segment (distance entre ses deux extrémités) est sa longueur.

La longueur d'un segment [AB], se note AB ou BA.

Exemple



La mesure d'un segment (distance entre ses deux extrémités) est sa longueur.

La longueur d'un segment [AB], se note AB ou BA.

Exemple



La longueur du segment [AB] est de 3,5 cm,

La mesure d'un segment (distance entre ses deux extrémités) est sa longueur.

La longueur d'un segment [AB], se note AB ou BA.

Exemple



La longueur du segment [AB] est de 3,5 cm, on note AB = 3,5 cm.

Le milieu d'un segment

Le milieu d'un segment est le point qui appartient au segment et

Le <u>milieu</u> d'un segment est le point qui appartient au segment <u>et</u> qui est à égale distance de ses extrémités.

Le <u>milieu</u> d'un segment est le point qui appartient au segment <u>et</u> qui est à égale distance de ses extrémités.

Remarque


Des segments de même longueur sont codés de façon identique.

Le <u>milieu</u> d'un segment est le point qui appartient au segment <u>et</u> qui est à égale distance de ses extrémités.

Remarque

Des segments de même longueur sont codés de façon identique.

Exemple




On a:

Le <u>milieu</u> d'un segment est le point qui appartient au segment <u>et</u> qui est à égale distance de ses extrémités.

Remarque

Des segments de même longueur sont codés de façon identique.

Exemple




On a : $M \in [AB]$ et AM = MB,

Le <u>milieu</u> d'un segment est le point qui appartient au segment <u>et</u> qui est à égale distance de ses extrémités.

Remarque

Des segments de même longueur sont codés de façon identique.

Exemple




On a : $M \in [AB]$ et AM = MB, donc le point M est le milieu du segment [AB].

Le <u>milieu</u> d'un segment est le point qui appartient au segment <u>et</u> qui est à égale distance de ses extrémités.

Remarque

Des segments de même longueur sont codés de façon identique.

Exemple



On a : $M \in [AB]$ et AM = MB, donc le point M est le milieu du segment [AB]. On a ainsi $AM = AB \div 2$.