

# Terminale ST<sub>2</sub>S : DS numéro 2

20 Décembre 2018

## Exercice 1 Questions à choix multiple (5 points)

Cet exercice se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple (QCM). Les cinq questions sont indépendantes. Pour chaque question, une seule réponse est exacte, on demande d'indiquer cette réponse sans la justifier. Chaque bonne réponse rapporte 1 point, chaque réponse incorrecte retire 0,25 point, une question sans réponse n'apporte ni ne retire aucun point.

- (1 point) On considère la suite arithmétique  $(u_n)$ , telle que  $u_0 = 16$  et  $u_4 = -4$ . La raison de la suite  $(u_n)$  est :  
☐ 3,5;   ☐ 3;   ☐ -3;   ☒ -5.
- (1 point) On considère la suite  $(u_n)$  telle que  $u_n = 3n - 2$ . La suite  $(u_n)$  est :  
☐ une suite arithmétique de raison -2;  
☐ une suite géométrique de raison 3;  
☒ **une suite arithmétique de raison 3;**  
☐ une suite géométrique de raison 2.
- (1 point) On injecte  $u_0$  cm<sup>3</sup> d'un médicament dans le sang d'un patient. La quantité de ce médicament présente dans le sang du patient  $n$  heures après l'injection est  $u_n$ . La quantité de médicament présente dans le sang baisse de 20 % chaque heure. La suite  $(u_n)$  est :  
☐ une suite arithmétique de raison -20;  
☐ une suite géométrique de raison 1,20;  
☐ une suite arithmétique de raison -0,2;  
☒ **une suite géométrique de raison 0,8.**
- (1 point) On reprend la situation décrite dans la question 3. Cinq heures après l'injection, il reste dans le sang du patient environ :  
☐ 67 % de la quantité injectée;  
☐ 20 % de la quantité injectée;  
☐ rien;  
☒ **33 % de la quantité injectée.**

- (1 point) La feuille de calcul ci-dessous est utilisée pour calculer les premiers termes de la suite géométrique  $(u_n)$  de premier terme 5000 et de raison 1,02. La formule à entrer dans la cellule B3 et à recopier vers le bas est :

- ☐  $5000 * 1,02;$
- ☐  $= \$B\$2 * 1,02;$
- ☒  $= B2 * 1,02;$
- ☐  $= 1,02^A3;$

	A	B
1	$n$	$u(n)$
2	0	5 000
3	1	
4	2	
5	3	
6	4	
7	5	
8	6	
9	7	
10	8	
11	9	
12	10	

**Exercice 2 Des normes antipollution (7 points)**

Un grand groupe industriel fait le bilan de sa quantité de rejets polluants. En 2001, sa quantité de rejets était de 49 000 tonnes. Elle est passée à 68 000 tonnes en 2004.

De nouvelles normes antipollution ont été mises en place à partir de 2001. Le groupe, pour être aux normes ne doit pas dépasser 42 000 tonnes de rejets par an.

**Partie A**

Chaque année, si ses rejets dépassent la quantité autorisée, le groupe doit payer une amende.

Tant que le groupe ne prend pas de mesure pour faire baisser sa quantité de rejets, l'amende augmente de 6000 € tous les ans. En 2001, le groupe a payé une amende de 83 000 €.

*Dans toute cette partie, on fait l'hypothèse que le groupe ne prend aucune mesure pour diminuer sa quantité de rejets.*

On appelle  $C_1$  l'amende payée en 2001 et  $C_n$  l'amende payée l'année  $2000 + n$ . On a alors  $C_1 = 83\,000$  €.

1. (1 point) Calculer la valeur de l'amende payée par l'entreprise en 2002 et en 2003.

**Solution:**

L'amende payée en 2002 est  $C_2$  et celle payée en 2003 est  $C_3$ .

$$— C_2 = C_1 + 6000 = 83\,000 + 6000 = 89\,000 ;$$

$$— C_3 = C_2 + 6000 = 89\,000 + 6000 = 95\,000.$$

L'entreprise a payé 89 000 € en 2002 et 95 000 en 2003.

2. (1 point) Quelle est la nature de la suite  $(C_n)$  ?

**Solution:**

Tous les ans, l'amende augmente de 6000 €, donc pour passer d'un terme à l'autre, on ajoute 6000. C'est donc une suite arithmétique de raison 6000.

3. (1 point) Calculer l'amende que le groupe devra payer en 2015.

**Solution:**

$2015 = 2000 + 15$ , on calcule la valeur de  $C_{15}$ .

$$C_n = C_1 + (n - 1) \times 6000$$

$$C_{15} = 83\,000 + 14 \times 6000$$

$$C_{15} = 83\,000 + 84\,000$$

$$C_{15} = 167\,000$$

En 2015, le groupe devra payer 167 000 €.

**Partie B**

Au vu des résultats précédents, le groupe a décidé en 2004 de mettre en place un dispositif lui permettant de se mettre aux normes progressivement, l'objectif étant de ramener sa quantité de déchets à une valeur inférieure ou égale à 42 000 tonnes en 2014.

Le groupe s'est engagé à réduire chaque année sa production de déchets de 4 % à partir de 2004.

1. (1 point) Si le groupe a rejeté 66 000 tonnes en 2005, a-t-il respecté son engagement ?

**Solution:**

L'entreprise s'est engagée à diminuer ses rejets de 4 % chaque année. Le coefficient multiplicateur correspondant à cette baisse est 0,96. Je calcule les rejets prévu pour 2005 :

$$68\,000 \times 0,96 = 65\,280$$

Non le groupe n'a pas respecté son engagement, il aurait du rejeter 65 280 tonnes de déchets.

2. On appelle  $Q_n$  la quantité de rejets prévue pour l'année  $2004 + n$ . Ainsi,  $Q_0 = 68\,000$ .

- (a) (1 point) Quelle est la nature de la suite  $(Q_n)$  ?

**Solution:**

Les rejets doivent baisser chaque année de 4 %, donc chaque terme de la suite est obtenu en multipliant le précédent par 0,96. J'en déduis que la suite  $(Q_n)$  est une suite géométrique de raison 0,96.

- (b) (1 point) Exprimer  $Q_n$  en fonction de  $n$ .

**Solution:**

$$Q_n = Q_0 \times q^n = 68\,000 \times 0,96^n.$$

- (c) (1 point) Calculer à la tonne près, la quantité de rejets prévue pour l'année 2014. L'entreprise aura-t-elle atteint son objectif ?

**Solution:**

2014 = 2004 + 10. Je calcule  $Q_{10}$  :

$$Q_{10} = 68\,000 \times 0,96^{10} = 45\,209.$$

La quantité de rejets prévue pour l'année 2014 est de 45 209 tonnes, donc l'entreprise n'aura pas atteint son objectif.

**Exercice 3    Entraînement à vélo (8 points)**

Aline et Blandine décident de reprendre l'entraînement à vélo, chaque samedi pendant 15 semaines.

Chacune a établi son programme d'entraînement. Elles parcourent 20 km la première semaine et souhaitent effectuer une sortie ensemble la quinzième semaine.

1. Programme d'entraînement d'Aline

Après la première semaine, Aline décide d'augmenter chaque semaine la distance parcourue de 7 km.

On note  $u_n$  la distance parcourue la  $n$ -ième semaine. Ainsi  $u_1 = 20$  et  $u_{15} = 118$ .

- (a) (1 point) Montrer que la suite  $(u_n)$  correspondante est une suite arithmétique de terme initial  $u_1 = 20$  dont on précisera la raison.

**Solution:**

La distance parcourue augmente chaque semaine de 7 km, c'est donc une suite arithmétique de terme initial  $u_1 = 20$  et de raison  $r = 7$ .

- (b) (1 point) Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .

**Solution:**

On a :

$$u_n = u_1 + n \times r$$

$$u_n = 20 + n \times 7$$

- (c) (1 point) Calculer la distance parcourue par Aline le samedi de la dixième semaine.

**Solution:**

La distance parcourue la dixième semaine correspond à  $u_{10}$ .

$$u_{10} = 20 + 10 \times 7$$

$$u_{10} = 90.$$

Aline parcourt 90 km la dixième semaine.

- (d) (1 point) Calculer la distance totale parcourue par Aline au cours de ses entraînements, quinzième semaine incluse.

**Solution:**

$$S_{15} = \frac{15 \times (u_1 + u_{15})}{2}$$

$$S_{15} = \frac{15 \times (20 + 118)}{2}$$

$$S_{15} = 1035$$

Au total, Aline a parcouru 1035 km au cours de ses entraînements.

2. Programme d'entraînement de Blandine

Chaque semaine, Blandine augmente de 13,5 % la distance parcourue, de telle sorte que la distance parcourue la quinzième semaine soit aussi de 118 km, à l'unité près.

On note  $v_n$  la distance parcourue la  $n$ -ième semaine. Ainsi  $v_1 = 20$  et  $v_{15} = 118$ .

- (a) (1 point) Montrer que la suite  $(v_n)$  correspondante est une suite géométrique et déterminer sa raison.

**Solution:**

La distance parcourue augmente chaque semaine de 13,5 %, elle est donc multipliée par 1,135 ( $1 + \frac{13,5}{100}$ ). J'en déduis que c'est une suite géométrique de premier terme  $v_1 = 20$ , et de raison  $q = 1,135$ .

- (b) (1 point) Exprimer  $v_n$  en fonction de  $n$ .

**Solution:**

On a :

$$\begin{aligned}v_n &= v_1 \times q^{(n-1)} \\v_n &= 20 \times 1,135^{(n-1)}.\end{aligned}$$

- (c) (1 point) Calculer la distance parcourue par Blandine le samedi de la dixième semaine.

**Solution:**

La distance parcourue la dixième semaine correspond à  $v_{10}$ .

$$\begin{aligned}v_{10} &= 20 \times 1,135^9 \\u_{10} &\approx 62,52\end{aligned}$$

Blandine parcourt 63 km la dixième semaine.

- (d) (1 point) Calculer la distance totale parcourue par Blandine au cours de ses entraînements, quinzième semaine incluse.

**Solution:**

$$\begin{aligned}S_{15} &= u_1 \times \frac{1 - 1,135^{15}}{1 - 1,135} \\S_{15} &= 20 \times \frac{1 - 1,135^{15}}{1 - 1,135} \\S_{15} &\approx 841,82\end{aligned}$$

Au total, Blandine a parcouru 842 km au cours de ses entraînements.

NOM Prénom :

Les réponses doivent être justifiées et rédigées

**Formulaire :**

Somme des  $n$  premiers termes d'une suite arithmétique :

$$S_n = \frac{n \times (u_1 + u_n)}{2}$$

Somme des  $n$  premiers termes d'une suite géométrique :

$$S_n = u_1 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}$$