

② Éléments de géométrie

Objectifs

- Reconnaître un segment, une demie-droite, une droite et savoir les tracer ;
- Tracer avec l'équerre la droite perpendiculaire à une droite donnée passant par un point donné ;
- Tracer avec la règle et l'équerre la droite parallèle à une droite donnée passant par un point donné ;
- Déterminer la distance entre deux points, entre un point et une droite ;
- Savoir coder et lire une figure.

Compétences

- **Modéliser**
- **Représenter**
- **Raisonner**
- **Communiquer**


I. Droites

Définitions

- Une **droite** est un objet géométrique formé
- Une droite est
- Une droite qui passe par deux points A et B ,
- Si un point C appartient à la droite (AB) ,
- Si il n'appartient pas à la droite (AB) ,

Exemple :

Les points M , R et A sont alignés.



- La droite (d) passant par les points M et R se note
- Le point A appartient à la droite (MR) , on note :
- Le point S n'appartient pas à la droite (MR) , on note :

Définition

- Une **demi-droite** est une portion de droite
- La demi-droite d'origine A et passant par B se note

Exemple :



La demi-droite

Définition

- Un **segment** est une portion de droite
- Le segment d'extrémités A et B se note

Exemple :



Le segment


II. Sécantes, perpendiculaires et parallèles

Définition

Deux droites sont _____

Exemple :

Les droites (d) et (d') sont




Définition

Deux droites (d_1) et (d_2) sont _____

Exemple :

Les droites (d_1) et (d_2) sont




Définition

Deux droites (d_3) et (d_4) _____

Exemple :

Les droites (d_3) et (d_4) sont



III. Montrer que des droites sont perpendiculaires ou parallèles


Propriété

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, **alors** ces deux droites sont parallèles.

Exemple :

On sait que (d_1) et (d_2) sont toutes deux perpendiculaires à (D) .

Donc (d_1) et (d_2) sont parallèles.




Propriété

Si deux droites sont parallèles, **alors** toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre

Exemple :

On sait que $(d_1) \parallel (d_2)$ et $(d_1) \perp (D)$

Donc $(d_2) \perp (D)$.




Propriété

Si deux droites sont parallèles à une même troisième, **alors** ces deux droites sont parallèles entre elles.

Exemple :

On sait que $(d_1) \parallel (d)$ et $(d_2) \parallel (d)$

Donc $(d_1) \parallel (d_2)$.



IV. Longueurs et codages


Définition

La mesure (distance entre ses deux extrémités) d'un segment est sa **longueur**.

Propriété

La longueur d'un segment $[AB]$, se note AB ou BA .

Exemple :



La longueur du segment $[AB]$ est de 3,5 cm, on note


Définition

Le **milieu** d'un segment est le point qui appartient au segment **et** qui est à égale distance de ses extrémités.

Remarque

Des segments de même longueur sont codés de façon identique.

Exemple :



On a : $M \in [AB]$ et $AM = MB$, donc le point M est le milieu du segment $[AB]$. On a ainsi $AM = AB \div 2$.