5 Division

\circ	1 .			C
()	h_1	മറ	† 1	tq
O.	v.J	\sim	UI.	ΓS

- Je connais et j'utilise le vocabulaire des divisions;
- Je sais si un nombre est divisible par un autre;
- Je sais poser et calculer la division d'un nombre entier par un autre;
- Je sais poser et calculer la division d'un nombre décimal par un nombre entier;
- Je sais résoudre des problèmes en utilisant des additions, soustractions, multiplications et divisions.

Compétences

CalculerReprésenter

Modéliser

RaisonnerCommuniquer

I. Division euclidienne

Définition

Bemmerem			
Effectuer la _			

Exemples:

Poser et vérifier les divisions euclidiennes suivantes : $653 \div 7$ et $73 \div 5$

II. Multiples et diviseurs

1) Définition

Définitions

— *a* est

a obt

— a est _____

-b est $_$

Exemple:

$$24 \times 39 + 0 = 936$$

Exercice

- Citer 3 multiples de 24:
- Citer tous les diviseurs de 16 :

2) Critères de divisibilité

Propriétés

— Un nombre entier est divisible par 2 si
— Un nombre entier est divisible par 5 si
— Un nombre entier est divisible par 10 si
— Un nombre entier est divisible par 3 si
— Un nombre entier est divisible par 9 si
— Un nombre entier est divisible par 4 si

Exemples:

- -1250 est divisible par :
- 726 est divisible par :
- 1024 est divisible par :
- 342 est divisible par :

III. Division décimale

Définition

Effectuer la division décimale d'un nombre décimal par un nombre entier, c'est chercher le **quotient**, tel que :

 $quotient \times diviseur = dividende$

1) Division décimale de deux entiers

Méthode:

On commence comme une division euclidienne. Quand il n'y a plus de chiffre à abaisser, pn ajoute une virgule au quotient et on abaisse des zéros jusqu'à ce que le reste soit égal à zéro (ou qu'on obtienne la valeur approchée demandée).

Exemples:

2) Division décimale d'un nombre décimal par un entier

Méthode:

On commence comme pour le cas précédent, mais on met une virgule au quotient dès qu'on arrive à la virgule du diviseur.

Exemples:

3) Division décimale de deux nombres décimaux

Propriété

On ne change pas le quotient de deux nombres décimaux quand on multiplie chacun d'eux par un même nombre (10, 100, ...) pour obtenir un diviseur entier.

Exemple:

Diviser 67,85 par 2,3.

Le diviseur est égal à 2,3, pour qu'il soit entier on le multiplie par 10 :

$$2.3 \times 10 = 23$$

et on multiplie le dividende par 10, pour ne pas changer la valeur du quotient :

$$67,85 \times 10 = 678,5$$