Exemples

- Soit (u_n) la suite arithmétique de terme initial $u_0 = 1, 5$ et de raison r = -7. Le terme de rang n est $u_n = 1, 5 + n \times (-7)$ c'est à dire $u_n = 1, 5 \times 7n$. On a ainsi :
 - $u_4 = 1, 5 7 \times 4 = -26, 5$
 - $u_{100} = 1, 5 7 \times 100 = -698, 5$
- Soit (u_n) la suite arithmétique de terme initial $u_1 = 14$ et de raison r = 1, 3. Le terme de rang n est $u_n = 14 + (n-1) \times 1, 3$; c'est à dire $u_n = 12, 7+1, 3n$. On a ainsi :
 - $u_4 = 12, 7 + 1, 3 \times 4 = 17, 9$;
 - $u_{100} = 12, 7 + 1, 3 \times 100 = 142, 7.$

Exemples

Soit (u_n) la suite géométrique de terme initial $u_0 = 2, 4$ et de raison q = 0, 6. Le terme de rang n est $u_n = 2, 4 \times 0, 6^n$.

On a ainsi:

- $u_4 = 2, 4 \times 0, 6^4 = 0,31104$;
- $u_{100} = 2, 4 \times 0, 6^{100} = 0.$
- Soit (u_n) la suite arithmétique de terme initial $u_1 = 0, 7$ et de raison q = 2, 2. Le terme de rang n est $u_n = 0, 7 \times 2, 2^{n-1}$.

On a ainsi:

- $u_5 = 0, 7 \times 2, 2^4 = 16,39792$;
- $u_11 = 0, 7 \times 2, 2^{10} = 1859.$