

ELABORATO DI CALCOLO NUMERICO

Federico Schipani
Tommaso Ceccarini
Giuliano Gambacorta

29 maggio 2015

Indice

1	Errori ed aritmetica finita	9
1.1	Esercizi del libro	9
1.1.1	Esercizio 1.1	9
1.1.2	Esercizio 1.2	9
1.1.3	Esercizio 1.3	9
1.1.4	Esercizio 1.4	10
1.1.5	Esercizio 1.5	10
1.1.6	Esercizio 1.6	10
1.1.7	Esercizio 1.7	11
1.1.8	Esercizio 1.8	11
1.1.9	Esercizio 1.9	11
1.1.10	Esercizio 1.10	11
1.1.11	Esercizio 1.11	11
1.1.12	Esercizio 1.12	11
1.1.13	Esercizio 1.13	11
1.1.14	Esercizio 1.14	12
1.1.15	Esercizio 1.15	12
1.1.16	Esercizio 1.17	12
1.1.17	Esercizio 1.18	12
1.2	Esercizi integrativi	12
1.2.1	Esercizio 1	12
1.2.2	Esercizio 2	12
1.2.3	Esercizio 3	13
1.2.4	Esercizio 4	13
1.2.5	Esercizio 5	14
1.2.6	Esercizio 6	14
1.2.7	Esercizio 7	14
1.2.8	Esercizio 8	14
1.2.9	Esercizio 9	14
1.2.10	Esercizio 10	15
2	Radici di una equazione	17
2.1	Esercizi del libro	17
2.1.1	Esercizio 2.1	17
2.1.2	Esercizio 2.2	17
2.1.3	Esercizio 2.3	17
2.1.4	Esercizio 2.4	17

2.1.5	Esercizio 2.5	17
2.1.6	Esercizio 2.6	17
2.1.7	Esercizio 2.7	18
2.1.8	Esercizio 2.8	18
2.1.9	Esercizio 2.9	18
3	Capitolo 3	19
3.1	Esercizi del libro	19
3.1.1	Esercizio 3.1	19
3.1.2	Esercizio 3.2	19
3.1.3	Esercizio 3.3	19
3.1.4	Esercizio 3.4	19
3.1.5	Esercizio 3.5	19
3.1.6	Esercizio 3.6	19
3.1.7	Esercizio 3.7	19
3.1.8	Esercizio 3.8	20
3.1.9	Esercizio 3.9	20
3.1.10	Esercizio 3.10	20
3.1.11	Esercizio 3.11	20
3.1.12	Esercizio 3.12	20
3.1.13	Esercizio 3.13	20
3.1.14	Esercizio 3.14	20
4	Capitolo 4. Approssimazione di funzioni	21
4.1	Esercizi del libro	21
4.1.1	Esercizio 1	21
4.1.2	Esercizio 2	21
4.1.3	Esercizio 3	21
4.1.4	Esercizio 4	21
4.1.5	Esercizio 5	21
4.1.6	Esercizio 6	21
4.1.7	Esercizio 7	22
4.1.8	Esercizio 8	22
4.1.9	Esercizio 9	22
4.1.10	Esercizio 10	22
4.1.11	Esercizio 11	22
4.1.12	Esercizio 12	23
4.1.13	Esercizio 13	23
4.1.14	Esercizio 14	23
4.1.15	Esercizio 15	23
4.1.16	Esercizio 16	23
4.1.17	Esercizio 17	23
4.1.18	Esercizio 18	24
4.1.19	Esercizio 19	24
4.1.20	Esercizio 20	24
4.1.21	Esercizio 21	24
4.1.22	Esercizio 22	24

5	Formule di quadratura	25
5.0.23	Esercizio 1	25
5.0.24	Esercizio 2	25
5.0.25	Esercizio 3	25
5.0.26	Esercizio 4	25
5.0.27	Esercizio 5	25
5.0.28	Esercizio 6	25
5.0.29	Esercizio 7	25
5.0.30	Esercizio 8	26
5.0.31	Esercizio 9	26
5.0.32	Esercizio 10	26
6	Calcolo del Google Pagerank	27
6.0.33	Esercizio 1	27
6.0.34	Esercizio 2	27
6.0.35	Esercizio 3	27
6.0.36	Esercizio 4	27
6.0.37	Esercizio 5	27
6.0.38	Esercizio 6	28
6.0.39	Esercizio 7	28
6.0.40	Esercizio 8	28
6.0.41	Esercizio 9	28
6.0.42	Esercizio 10	28
6.0.43	Esercizio 11	28
6.0.44	Esercizio 12	29

L'errore assoluto da un
informazione relativa, l'errore
relativo da un informazione
assoluta!

Sestini, Brugnano, Magherini

Capitolo 1

Errori ed aritmetica finita

1.1 Esercizi del libro

Qua ci sono gli esercizi contenuti del libro

1.1.1 Esercizio 1.1

Sia $x = \pi \approx 3.1415 = \tilde{x}$. Calcolare il corrispondente errore relativo ϵ_x . Verificare che il numero di cifre decimali corrette nella rappresentazione approssimata di x mediante \tilde{x} è all'incirca dato da

$$-\log_{10} |\epsilon_x|$$

Soluzione:

$$\begin{aligned}x &= \pi \approx 3.1415, & \tilde{x} &= 3.1415 \\ \Delta_x &= x - \tilde{x} = 0,0000926 \\ \epsilon_x &= \frac{\Delta_x}{x} = 0,3 \cdot 10^{-4} \\ -\log_{10} |\epsilon_x| &= -\log_{10} |0,3 \cdot 10^{-4}| \approx 4,5\end{aligned}$$

Arrotondando 4,5 si nota che il numero delle cifre decimali corrette nella rappresentazione è 4

1.1.2 Esercizio 1.2

Dimostrare che, se $f(x)$ è sufficientemente regolare e $h > 0$ è una quantità "piccola", allora:

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} &= f'(x_0) + O(h^2) \\ \frac{f(x_0+h)-2f(x_0)+f(x_0-h)}{h^2} &= f''(x_0) + O(h^2)\end{aligned}$$

1.1.3 Esercizio 1.3

Dimostrare che il metodo iterativo (1.1), convergente a x^* (vedi(1.2)), deve verificare la condizione di consistenza

$$x^* = \Phi(x^*)$$

Ovvero la soluzione cercata deve essere un punto fisso per la funzione di iterazione che definisce il metodo.

1.1.4 Esercizio 1.4

Il metodo iterativo

$$x_{n+1} = \frac{x_n x_{n-1} + 2}{x_n + x_{n-1}}, \quad n = 1, 2, \dots, x_0 = 2, \quad x_1 = 1.5$$

definisce una successione di approssimazioni convergente a $\sqrt{2}$. Calcolare a quale valore di n bisogna arrestare l'iterazione, per avere un errore di convergenza $\approx 10^{-22}$ (comparare con i risultati in Tabella 1.1)

1.1.5 Esercizio 1.5

Il codice Fortran

```
program INTERO
c——variabili intere da 2 byte
integer*2 numero, i
numero = 32765
do i = 1, 10
write(*,*) i, numero
numero = numero +1
end do
end
```

Produce il seguente output:

1. 32765
2. 32766
3. 32767
4. -32768
5. -32767
6. -32766
7. -32765
8. -32764
9. -32763
10. -32762

Spiegare il motivo

1.1.6 Esercizio 1.6

Dimostrare i teoremi 1.1 e 1.3

1.1.7 Esercizio 1.7

Completare la dimostrazione del teorema 1.4

1.1.8 Esercizio 1.8

Quante cifre binarie sono utilizzate per rappresentare, mediante arrotondamento, la mantissa di un numero, sapendo che la precisione di macchina è $u \approx 4.66 \cdot 10^{-10}$

1.1.9 Esercizio 1.9

Dimostrare che, detta u la precisione di macchina utilizzata,

$$-\log_{10} u$$

fornisce, approssimativamente, il numero di cifre decimali correttamente rappresentate dalla mantissa.

1.1.10 Esercizio 1.10

Con riferimento allo standard IEEE 754 determinare, relativamente alla doppia precisione:

1. il più grande numero di macchina
2. il più piccolo numero di macchina normalizzato positivo
3. il più piccolo numero di macchina denormalizzato positivo
4. la precisione di macchina

Confrontare le risposte ai primi due quesiti col risultato fornito dalle **function Matlab** `realmax` e `realmin`

1.1.11 Esercizio 1.11

Eseguire le seguenti istruzioni Matlab:

```
x = 0; delta = 0.1;
while x \tilde{=} 1, x = x+delta end
```

Spiegarne il (non) funzionamento

1.1.12 Esercizio 1.12

Individuare l'algoritmo più efficace per calcolare, in aritmetica finita, l'espressione $\sqrt{x^2 + y^2}$

1.1.13 Esercizio 1.13

Eseguire le seguenti istruzioni Matlab:

```
help eps
((eps/2+1)-1)*(2/eps)
(eps/2+(1-1))*(2/eps)
```

Concludere che la somma algebrica non gode, in aritmetica finita, della proprietà associativa.

1.1.14 Esercizio 1.14

Eseguire e discutere il risultato delle seguenti istruzioni Matlab

$$(1e300 - 1e300) * 1e300, \quad (1e300 * 1e300) - (1e300 * 1e300)$$

1.1.15 Esercizio 1.15

Eseguire l'analisi dell'errore (relativo), dei due seguenti algoritmi per calcolare la somma di tre numeri:

$$1) (x \oplus y) \oplus z), \quad 2) x \oplus (y \oplus z)$$

1.1.16 Esercizio 1.17

(Cancellazione numerica) Si supponga di dover calcolare l'espressione

$$y = 0.12345678 - 0.12341234 \equiv 0.0000444,$$

utilizzando una rappresentazione decimale con arrotondamento alla quarta cifra significativa. Comparare il risultato esatto con quello ottenuto in aritmetica finita, e determinare la perdita di cifre significative derivante dalla operazione effettuata. Verificare che questo risultato è in accordo con l'analisi di condizionamento.

1.1.17 Esercizio 1.18

(Cancellazione Numerica) Eseguire le seguenti istruzioni Matlab

```
format long e
a = 0.1
b = 0.09999999999999
a-b
```

Valutare l'errore relativo sui dati di ingresso e l'errore relativo sul risultato ottenuto.

1.2 Esercizi integrativi

Questi sono gli esercizi integrativi sul capitolo 1

1.2.1 Esercizio 1

un'approssimazione del secondo ordine di $f'(x_0)$ utilizzando il passo di discretizzazione h e i seguenti tre valori di funzione $f(x_0), f(x_0 + h), f(x_0 + 2h)$ (molecola a tre punti in avanti).

1.2.2 Esercizio 2

Dimostrare che se un numero reale x viene approssimato da \tilde{x} con un certo errore relativo ϵ_x , la quantità $-\log_{10}|\epsilon_x|$ fornisce approssimativamente il numero di cifre decimali esatte di \tilde{x} .

1.2.3 Esercizio 3

Calcolare il più grande e il più piccolo numero reale di macchina positivo normalizzato che si può rappresentare utilizzando lo standard IEEE 754 nel formato della singola precisione e in quello della doppia precisione.

Soluzione:

Il numero più piccolo è uguale a:

$$R_1 = b^\nu$$

Per cui nel caso di questo esercizio:

$$2^{-126}$$

Il numero più grande è uguale a

$$R_2 = (1 - 2^{-24})2^\varphi$$

con

$$\varphi = 2^8 - 127$$

quindi

$$R_2 = 6.805646933 \cdot 10^{38}$$

.

1.2.4 Esercizio 4

Siano $x = 2.7352 \cdot 10^2$, $y = 4.8017 \cdot 10^{-2}$ e $z = 3.6152 \cdot 10^{-2}$. Utilizzando un'aritmetica finita che lavora in base 10 con arrotondamento e che riserva $m = 4$ cifre alla mantissa, confrontare gli errori assoluti $R_1 - R$ e $R_2 - R$, dove $R = x + y + z$ e

$$R_1 = (x \oplus y) \oplus z, \quad R_2 = x \oplus (y \oplus z).$$

Soluzione:

Per facilitare i calcoli si portano x e y da 10^{-2} a 10^2 :

$$y = 4.8017 \cdot 10^{-2} = 0.00048017 \cdot 10^2$$

$$z = 3.6152 \cdot 10^{-2} = 0.00031652 \cdot 10^2$$

Successivamente si calcola R_1 , R_2 ed R :

$$R_1 = (x \oplus y) \oplus z = (2.7352 + 0.00048017) + 0.00031652 = 2,7359 \cdot 10^2$$

$$R_2 = x \oplus (y \oplus z) = 2.7352 + (0.00048017 + 0.00031652) = 2.7360 \cdot 10^2$$

$$R = x + y + z = 2.73604169$$

Attraverso R si calcolano gli errori assoluti su R_1 ed R_2 :

$$R_1 - R = -0.000014169 \cdot 10^2$$

$$R_2 - R = 0.000004169 \cdot 10^2$$

1.2.5 Esercizio 5

Un'aritmetica finita utilizza la base 10, l'arrotondamento, $m = 5$ cifre per la mantissa, $s = 2$ cifre per l'esponente e lo shift $\nu = 50$. Per gli interi esso utilizza $N = 7$ cifre decimali. Dire se il numero intero $x = 136726$ è un numero intero di macchina e come viene convertito in reale di macchina. Dire quindi se il numero intero $x = 78345 \cdot 10^{40}$ è un reale di macchina e/o se è un intero di macchina.

Soluzione:

Si verifica facilmente che il numero $x = 136726$ è un intero di macchina.

Il numero x viene convertito in reale di macchina in questo modo: $x_r = 1,36726 \cdot 10^5$

Invece il numero $x = 78345 \cdot 10^{40}$ è un reale di macchina in quanto non bastano 5 cifre per rappresentarlo.

Per un maggiore sicurezza si calcola il più grande reale di macchina:

$$R_2 = (1 - 10^{-5})10^{50} = 9.9999 \cdot 10^{49}$$

Essendo $x < R_2$ è confermato che è un reale di macchina.

1.2.6 Esercizio 6

Dimostrare che il numero di condizionamento del problema di calcolo $\sqrt[n]{x}$ è $\frac{1}{n}$.

Soluzione:

Per prima cosa si riscrive la funzione: $f(x) = x^{\frac{1}{n}}$

Il numero di condizionamento è uguale a $k = |f'(x) \frac{x}{y}|$

Si calcola la derivata di $f(x)$ che è uguale a $f'(x) = \frac{x^{\frac{1}{n}-1}}{n}$

$$\text{Quindi: } k = \left| \frac{x^{\frac{1}{n}-1}}{n} \frac{x}{\sqrt[n]{x}} \right|$$

$$\text{Da cui con passaggi algebrici: } \left| \frac{\sqrt[n]{x} x^{-1}}{n} \frac{x}{\sqrt[n]{x}} \right| = \left| \frac{1}{n} \right| = \frac{1}{n}.$$

1.2.7 Esercizio 7

Individuare l'algoritmo più efficace per valutare, in aritmetica finita, la funzione $f(x) = \ln x^4$

Soluzione:

Bisogna semplicemente riscrivere la funzione per evitare problemi di overflow e underflow e poi valutarla. $f(x) = \ln x^4 = 4 \cdot \ln x$

L'algoritmo è questo:

Result = $4 \cdot \ln x$

Return Result

1.2.8 Esercizio 8

Individuare una forma algebrica equivalente ma preferibile in aritmetica finita per il calcolo dell'espressione $(x+2)^3 - x^3$

Soluzione:

$$(x+2)^3 - x^3 = (x+2)(x+2)^2 - x^3 = (x+2)(x^2+4x+4) - x^3 = x^3+4x^2+4x+2x^2+8x+8-x^3 = 6x^2+12x+8$$

1.2.9 Esercizio 9

Si calcoli l'approssimazione \tilde{y} della differenza tra y fra $x_2 = 3.5555$ e $x_1 = 3.5554$ utilizzando un'aritmetica finita che lavora con arrotondamento in base 10 con 4 cifre per la mantissa

normalizzata. Se ne calcoli quindi il corrispondente errore relativo e la maggiorazione di esso che si ottiene utilizzando il numero di condizionamento della somma algebrica.

Soluzione:

Prima si calcola un'approssimazione di x_1 e x_2 poi si calcola un'approssimazione \tilde{y} della differenza y . $\tilde{x}_1 = 3.555$

$$\tilde{x}_2 = 3.556$$

$$\tilde{y} = \tilde{x}_1 - \tilde{x}_2 = 0.001 \quad y = x_2 - x_1 = 0.0001$$

$$\text{L'errore relativo è uguale a: } \varepsilon_y = \frac{0.001 - 0.0001}{0.0001} = 9$$

Per la maggiorazione serve $\max\{|\varepsilon_{x_1}|, |\varepsilon_{x_2}|\}$

$$\varepsilon_{x_1} = \frac{x_1 - \tilde{x}_1}{\tilde{x}_1} = -1.125 \cdot 10^{-4}$$

$$\varepsilon_{x_2} = \frac{x_2 - \tilde{x}_2}{\tilde{x}_2} = 1.406 \cdot 10^{-4}$$

$$\text{Quindi: } k = \frac{|-3.5554| + |3.5555|}{|3.5555 - 3.5554|} \cdot 1.406 \cdot 10^{-4} = 9.9979254$$

1.2.10 Esercizio 10

Dimostrare che il numero razionale 0.1 (espresso in base 10) non può essere un numero di macchina in un'aritmetica finita che utilizza la base 2 indipendentemente da come viene fissato il numero m di bit riservati alla mantissa. Dare una maggiorazione del corrispondente errore relativo di rappresentazione supponendo di utilizzare l'aritmetica finita binaria che utilizza l'arrotondamento e assume $m = 7$.

Capitolo 2

Radici di una equazione

2.1 Esercizi del libro

2.1.1 Esercizio 2.1

Definire una procedura iterativa basata sul metodo di Newton per determinare \sqrt{a} , per un assegnato $a > 0$. Costruire una tabella dell'approssimazioni relativa al caso $a = x_0 = 2$ (Comparare con la tabella 1.1)

2.1.2 Esercizio 2.2

Generalizzare il risultato del precedente esercizio, derivando una procedura iterativa basata sul metodo di Newton per determinare $\sqrt[n]{a}$ per un assegnato $a > 0$

2.1.3 Esercizio 2.3

In analogia con quanto visto nell'Esercizio 2.1, definire una procedura iterativa basata sul metodo delle secanti per determinare \sqrt{a} . Confrontare con l'esercizio 1.4.

2.1.4 Esercizio 2.4

Discutere la convergenza del metodo di Newton, applicato per determinare le radici dell'equazione (2.11) in funzione della scelta del punto iniziale x_0

2.1.5 Esercizio 2.5

Comparare il metodo di Newton (2.9), il metodo di Newton modificato (2.16) ed il metodo di accelerazione di Aitken (2.17), per approssimare gli zeri delle funzioni:

$$f_1(x) = (x - 1)^{10}, \quad f_2(x) = (x - 1)^{10}e^x$$

per valori decrescenti della tolleranza `tolx`. Utilizzare, in tutti i casi, il punto iniziale $x_0 = 10$.

2.1.6 Esercizio 2.6

È possibile, nel caso delle funzioni del precedente esercizio utilizzare il metodo di bisezione per determinare lo zero?

2.1.7 Esercizio 2.7

Costruire una tabella in cui si comparano, a partire dallo stesso punto iniziale $\mathbf{x}_0 = 0$, e per valori decrescenti della tolleranza \mathbf{tolx} , il numero di iterazioni richieste per la convergenza dei metodi di Newton, corde e secanti, utilizzati per determinare lo zero della funzione

$$f(x) = x - \cos x$$

2.1.8 Esercizio 2.8

Completare i confronti del precedente esercizio inserendo quelli con il metodo di bisezione, con intervallo di confidenza iniziale $[0, 1]$.

2.1.9 Esercizio 2.9

Quali controlli introdurreste, negli algoritmi 2.4-2.6, al fine di rendere più "robuste" le corrispondenti iterazioni?

Capitolo 3

Capitolo 3

3.1 Esercizi del libro

3.1.1 Esercizio 3.1

Riscrivere gli Algoritmi 3.1-3.4 in modo da controllare che la matrice dei coefficienti sia non singolare.

3.1.2 Esercizio 3.2

Dimostrare che la somma ed il prodotto di matrici triangolari inferiori (superiori), è una matrice triangolare inferiore (superiore).

3.1.3 Esercizio 3.3

Dimostrare che il prodotto di due matrici triangolari inferiori a diagonale unitaria è a sua volta una matrice triangolare inferiore a diagonale unitaria

3.1.4 Esercizio 3.4

Dimostrare che la matrice inversa di una matrice triangolare inferiore è a sua volta triangolare inferiore. Dimostrare inoltre che, se la matrice ha diagonale unitaria, tale è anche la diagonale della sua inversa.

3.1.5 Esercizio 3.5

Dimostrare i lemmi 3.2 e 3.3.

3.1.6 Esercizio 3.6

Dimostrare che il numero di flop richiesti dall'algoritmo 3.5 è dato da (3.25)

3.1.7 Esercizio 3.7

Scrivere una function matlab che implementi efficientemente l'algoritmo 3.5 per calcolare la fattorizzazione LU di una matrice.

3.1.8 Esercizio 3.8

Scrivere una function Matlab che, avendo in ingresso la matrice A riscritta dall'algoritmo 3.g, ed un vettore x contenente i termini noti del sistema lineare (3.1), ne calcoli efficientemente la soluzione.

3.1.9 Esercizio 3.9

Dimostrare i lemmi 3.4 e 3.5

3.1.10 Esercizio 3.10

Completare la dimostrazione del Teorema 3.6

3.1.11 Esercizio 3.11

Dimostrare che, se A è non singolare, le matrici $A^T A$ e AA^T sono sdp.

3.1.12 Esercizio 3.12**3.1.13 Esercizio 3.13****3.1.14 Esercizio 3.14**

Capitolo 4

Capitolo 4. Approssimazione di funzioni

4.1 Esercizi del libro

4.1.1 Esercizio 1

Sia $f(x) = 4x^2 - 12x + 1$. Determinare $p(x) \in \Pi_4$ che interpola $f(x)$ sulle ascisse $x_i = i, i = 0, \dots, 4$.

4.1.2 Esercizio 2

Dimostrare che il seguente algoritmo,

```
p = a(n+1)
for k = n:-1:1
    p = p*x + a(k)
end
```

valuta il polinomio (4.4) nel punto x , se il vettore a contiene i coefficienti del polinomio $p(x)$ (Osservare che in MATLAB i vettori hanno indice che parte da 1, invece che da 0).

4.1.3 Esercizio 3

Dimostrare il lemma 4.1

4.1.4 Esercizio 4

Dimostrare il lemma 4.2

4.1.5 Esercizio 5

Dimostrare il lemma 4.4

4.1.6 Esercizio 6

Costruire una **function** MATLAB che implementi in modo efficiente l'Algoritmo 4.1

4.1.7 Esercizio 7

Dimostrare che il seguente algoritmo, che riceve in ingresso i vettori x e f prodotti dalla **function** dell'Esercizio 4.6, valuta il corrispondente polinomio interpolante di Newton in un punto xx assegnato.

```
p = f(n+1)
for k = n:-1:1
    p = p*(xx-x(k)) + f(k)
end
```

Quale è il suo costo computazionale? Confrontarlo con quello dell'Algoritmo 4.1. Costruire, quindi, una corrispondente **function** MATLAB che lo implementi efficientemente (complementare la possibilità che xx sia un vettore)

4.1.8 Esercizio 8

Costruire una **function** MATLAB che implementi in modo efficiente l'algoritmo del calcolo delle differenze divise per il polinomio di Hermite.

4.1.9 Esercizio 9

Si consideri la funzione

$$f(x) = (x - 1)^9.$$

Utilizzando le **function** degli Esercizi 4.6 e 4.8, valutare i polinomi interpolanti di Newton e di Hermite sulle ascisse

$$0, 0.25, 0.5, 0.75, 1,$$

per $x = \text{linspace}(0, 1, 101)$. Raffigurare, quindi, (e spiegare) i risultati.

4.1.10 Esercizio 10

Quante ascisse di interpolazione equidistanti sono necessarie per approssimare la funzione $\sin(x)$ sull'intervallo $[0, 2\pi]$, con un errore di interpolazione inferiore a 10^{-6} ?

4.1.11 Esercizio 11

Verificare sperimentalmente che, considerando le ascisse di interpolazione equidistanti (??) su cui si definisce il polinomio $p(x)$ interpolante $f(x)$, l'errore $\|f - p\|$ diverge, al crescere di n , nei seguenti due casi:

1. esempio di Runge:

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}, \quad [a, b] \equiv [-5, 5];$$

2. esempio di Bernstein:

$$f(x) = |x|, \quad [a, b] \equiv [-1, 1].$$

4.1.12 Esercizio 12

Dimostrare che, se $x \in [-1, 1]$, allora:

$$\tilde{x} \equiv \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}x \in [a, b].$$

Viceversa, se $\tilde{x} \in [a, b]$, allora:

$$x \equiv \frac{2\tilde{x} - a - b}{b - a} \in [-1, 1].$$

Concludere che è sempre possibile trasformare il problema di interpolazione (4.1)-(4.2) in uno definito sull'intervallo $[-1, 1]$, e viceversa.

4.1.13 Esercizio 13

Dimostrare le proprietà dei polinomi di Chebyshev di I specie (4.24) elencate nel Teorema 4.9.

4.1.14 Esercizio 14

Quali diventano le ascisse di Chebyshev (4.26), per un problema definito su un generico intervallo $[a, b]$?

4.1.15 Esercizio 15

Utilizzare le ascisse di Chebyshev (4.26) per approssimare gli esempi visti nell'Esercizio 4.11, per $n = 2, 4, 6, \dots, 40$.

4.1.16 Esercizio 16

Verificare che la fattorizzazione LU della matrice dei coefficienti del sistema tridiagonale (4.40) è dato da:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_2 & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & l_{n-1} & 1 & \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} u_1 & \xi_1 & & & \\ & u_2 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \xi_{n-2} \\ & & & & u_{n-1} \end{pmatrix},$$

con

$$\begin{aligned} u_1 &= 2, \\ l_i &= \frac{\varphi_i}{u_{i-1}}, \\ u_i &= 2 - l_i \xi_{i-1}, \quad i = 2, \dots, n-1. \end{aligned}$$

Scrivere una **function** MATLAB che implementi efficientemente la risoluzione della (4.40).

4.1.17 Esercizio 17

Generalizzare la fattorizzazione del precedente Esercizio 4.16 al caso della matrice dei coefficienti del sistema lineare (4.41). Scrivere una corrispondente **function** MATLAB che risolva efficientemente questo sistema.

4.1.18 Esercizio 18

Scrivere una **function** MATLAB che, noti gli $\{m_i\}$ in (4.32), determini l'espressione, polinomiale a tratti, della spline cubica (4.36).

4.1.19 Esercizio 19

Costruire una **function** MATLAB che implementi le spline cubiche naturali e quelle definite dalle condizioni not-a-knot.

4.1.20 Esercizio 20

Utilizzare la **function** dell'Esercizio 4.19 per approssimare, su partizioni (4.28) uniformi con $n = 10, 20, 30, 40$, gli esempi proposti nell'Esercizio 4.11.

4.1.21 Esercizio 21

Interpretare la retta dell'Esercizio 3.32 come retta di approssimazione ai minimi quadrati dei dati.

4.1.22 Esercizio 22

È noto che un fenomeno ha un decadimento esponenziale, modellizzato come

$$y = \alpha \cdot e^{-\lambda t},$$

in cui α e λ sono parametri positivi e incogniti. Riformulare il problema in modo che il modello sia di tipo polinomiale. Supponendo inoltre di disporre delle seguenti misure,

t_1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y_i	5.22	4.00	4.28	3.89	3.53	3.12	2.73	2.70	2.20	2.08	1.94

calcolare la stime ai minimi quadrati dei due parametri incogniti. Valutare il residuo e raffigurare, infine, i risultati ottenuti.

Capitolo 5

Formule di quadratura

5.0.23 Esercizio 1

Calcolare il numero di condizionamento dell'integrale

$$\int_0^{e^{21}} \sin \sqrt{x} \, dx.$$

Questo problema è ben condizionato o è malcondizionato?

5.0.24 Esercizio 2

Derivare, dalla (5.5), i coefficienti della formula dei trapezi (5.6) e della formula di Simpson (5.7).

5.0.25 Esercizio 3

Verificare, utilizzando il risultato del Teorema (5.2) le (5.9) e (5.10).

5.0.26 Esercizio 4

*Scrivere una **function** MATLAB che implementi efficientemente la formula dei trapezi composita (5.11).*

5.0.27 Esercizio 5

*Scrivere una **function** MATLAB che implementi efficientemente la formula di Simpson composita (5.13).*

5.0.28 Esercizio 6

Implementare efficientemente in MATLAB la formula adattativa dei trapezi.

5.0.29 Esercizio 7

Implementare efficientemente in MATLAB la formula adattativa di Simpson.

5.0.30 Esercizio 8

Come è classificabile, dal punto di vista del condizionamento, il seguente problema?

$$\int_{\frac{1}{2}}^{100} -2x^{-3} \cos(x^{-2}) \, dx \equiv \sin(10^{-4}) - \sin(4)$$

5.0.31 Esercizio 9

Utilizzare le **function** degli Esercizi 5.4 e 5.6 per il calcolo dell'integrale

$$\int_{\frac{1}{2}}^{100} -2x^{-3} \cos(x^{-2}) \, dx \equiv \sin(10^{-4}) - \sin(4),$$

indicando gli errori commessi. Si utilizzi $n = 1000, 2000, \dots, 10000$ per la formula dei trapezi composta e $\text{tol} = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$ per la formula dei trapezi adattativa (indicando anche il numero di punti).

5.0.32 Esercizio 10

Utilizzare le **function** degli Esercizi 5.5 e 5.7 per il calcolo dell'integrale

$$\int_{\frac{1}{2}}^{100} -2x^{-3} \cos(x^{-2}) \, dx \equiv \sin(10^{-4}) - \sin(4),$$

indicando gli errori commessi. Si utilizzi $n = 1000, 2000, \dots, 10000$ per la formula di Simpson composta e $\text{tol} = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-5}$ per la formula di Simpson adattativa (indicando anche il numero di punti).

Capitolo 6

Calcolo del Google Pagerank

6.0.33 Esercizio 1

[Teorema di Gershgorin] Dimostrare che gli autovalori di una matrice $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{nn}$ sono contenuti nell'insieme

$$\mathcal{D} = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{D}_i, \quad \mathcal{D}_i = \left\{ \lambda \in \mathbb{C} : |\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \right\}, \quad i = 1, \dots, n.$$

6.0.34 Esercizio 2

Utilizzare il metodo delle potenze per approssimare l'autovalore dominante della matrice

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

per valori crescenti di n . Verificare numericamente che questo è dato da $2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{n+1}\right)$.

6.0.35 Esercizio 3

Dimostrare i Corollari 6.2 e 6.3.

6.0.36 Esercizio 4

Dimostrare il Teorema 6.9.

6.0.37 Esercizio 5

Tenendo conto della (6.10), riformulare il metodo delle potenze (6.11) per il calcolo del Google pagerank come metodo iterativo definito da uno splitting regolare.

6.0.38 Esercizio 6

Dimostrare che il metodo di Jacobi converge asintoticamente in un numero minore di iterazioni, rispetto al metodo delle potenze (6.11) per il calcolo del Google pagerank.

6.0.39 Esercizio 7

Dimostrare che, se A è diagonale dominante, per riga o per colonna, il metodo di Jacobi è convergente.

6.0.40 Esercizio 8

Dimostrare che, se A è diagonale dominante, per riga o per colonna, il metodo di Gauss-Seidel è convergente.

6.0.41 Esercizio 9

Se A è sdp, il metodo di Gauss-Seidel risulta essere convergente. Dimostrare questo risultato nel caso (assai più semplice) in cui l'autovalore di massimo modulo della matrice di iterazione sia reale.

(Suggerimento: considerare il sistema lineare equivalente

$$(D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}})(D^{\frac{1}{2}}\underline{x}) = (D^{-\frac{1}{2}}\underline{b}), \quad D^{\frac{1}{2}} = \text{diag}(\sqrt{a_{11}}, \dots, \sqrt{a_{nn}}),$$

la cui matrice dei coefficienti è ancora sdp ma ha diagonale unitaria, ovvero del tipo $I - L - L^T$. Osservare quindi che, per ogni vettore reale \underline{v} di norma 1, si ha: $\underline{v}^T L \underline{v} = \underline{v}^T L^T \underline{v} = \frac{1}{2} \underline{v}^T (L + L^T) \underline{v} < \frac{1}{2}$.)

6.0.42 Esercizio 10

Con riferimento ai vettori errore (6.16) e residuo (6.17) dimostrare che, se

$$\|\underline{r}_k\| \leq \varepsilon \|\underline{b}\|, \tag{6.1}$$

allora

$$\|\underline{e}_k\| \leq \varepsilon k(A) \|\hat{\underline{x}}\|,$$

dove $k(A)$ denota, al solito, il numero di condizionamento della matrice A . Concludere che, per sistemi lineari malcondizionati, anche la risoluzione iterativa (al pari di quella diretta) risulta essere più problematica.

6.0.43 Esercizio 11

Calcolare il polinomio caratteristico della matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \alpha \\ 1 & \ddots & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

6.0.44 Esercizio 12

Dimostrare che i metodi di Jacobi e Gauss-Seidel possono essere utilizzati per la risoluzione del sistema lineare (gli elementi non indicati sono da intendersi nulli)

$$\begin{pmatrix} 1 & & & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 1 \end{pmatrix} \underline{x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n,$$

la cui soluzione è $\underline{x} = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. Confrontare il numero di iterazioni richieste dai due metodi per soddisfare lo stesso criterio di arresto (6.19), per valori crescenti di n e per tolleranze ε decrescenti. Riportare i risultati ottenuti in una tabella (n/ε).