

Econometría Avanzada

Diferencias en Diferencias (DiD)

Manuel Fernández


9 de julio de 2026

Temas de la clase:

1. Experimentos naturales y modelo de diferencias
2. Modelo de diferencias en diferencias (DiD)
 - Gráficamente
 - Resultados potenciales
 - Modelo de regresión
3. Ejemplo: Card and Krueger (1994)

- **Diferencias en diferencias (DiD)**: uno de los métodos más usados en econometría aplicada.
 - Se puede implementar en muchos contextos.
 - Evaluación de políticas públicas.
 - Experimentos naturales o cuasi-experimentos.
 - Posibilidad de validar (**parcialmente**) los supuestos de identificación.
 - Método **flexible**: se puede extender (e.g., tratamientos discretos, intensidad de tratamiento, estudio de eventos, *etc.*).

DiD y Estudio de Eventos



Fuente: Currie et al. (2020).

Experimentos naturales y modelo de diferencias

John Snow y la epidemia de cólera

- A mediados del siglo XIX se presentaron varias epidemias de cólera en Londres. Los médicos no sabían su causa o cómo frenarla.
- **Teoría predominante** (teoría miasmática) postulaba que la enfermedad se transmitía por gases tóxicos.
- El médico y epidemiólogo **John Snow** (1813 – 1858) no estaba de acuerdo.
 - Las medidas para impedir que los gases llegaran a las personas no daban resultado.
 - Su hipótesis era que la enfermedad se transmitía al consumir agua del sistema de acueducto que contenía materiales residuales.
 - Las excreciones humanas contenían el agente activo (un microorganismo no observado), y este llegaba al suministro de agua, reinfectando a las personas que la consumían.
 - La repetición de este proceso generaba la epidemia.

Experimento naturales

- La **estrategia de identificación** de Snow se basó en lo que se conoce en la literatura como un **experimento natural**.
 - **Experimento natural**: una situación en la que factores fuera de control del investigador –en oposición a un experimento controlado– generan **asignaciones** a un tratamiento de forma posiblemente **exógena**.
- El suministro de agua en Londres en la época estaba a cargo de diferentes compañías.
 - La mayoría de estas compañías tomaban el agua del río Támesis, que se sabía estaba contaminado con aguas residuales.

El experimento natural de John Snow

- En 1852, una de estas compañías, ***Lambeth Company***, cambió el punto de recolección de agua río arriba, en una zona superior al punto de descarga del alcantarillado (un lugar donde el agua no estaba (tan) contaminada).
- Otras compañías, en particular ***Southwark and Vauxhall Company***, mantuvieron el punto de recolección río abajo, en una zona inferior al punto de descarga del alcantarillado (agua contaminada).
- La idea de Snow era simple: comparar las tasas de mortalidad por cólera entre distritos que recibían el suministro de estas dos compañías durante el brote de 1854.

La lógica de la comparación

*"The **experiment** . . . was on the grandest scale. No fewer than 300,000 people of both sexes, of every age and occupation, and of every rank and station, from gentle-folks down to the very poor, **were divided into two groups without their choice, and, in some cases, without their knowledge**; one group being supplied with water containing the sewage of London, and, amongst it, whatever might have come from the cholera patients, the other group having water free from such impurity."*

John Snow (1855, On the Mode of Communication of Cholera.)

John Snow y la epidemia de cólera

Tasas de mortalidad por 10,000 hogares en la epidemia de cólera en Londres en 1854

Water source	Number of houses	Cholera deaths	Deaths per 10,000 households
Southwark and Vauxhall Company	40,046	1,263	315
Lambeth Company	26,107	98	37

- Los distritos que recibían el suministro de agua de *Southwark and Vauxhall Company* (distritos de **control**) tuvieron una tasa de mortalidad **8.5 veces mayor** relativo a los distritos que recibían el suministro de *Lambeth Company* (distritos de **tratamiento**).

John Snow y la epidemia de cólera

Tasas de mortalidad por 10,000 hogares en la epidemia de cólera en Londres en 1854

Water source	Number of houses	Cholera deaths	Deaths per 10,000 households
Southwark and Vauxhall Company	40,046	1,263	315
Lambeth Company	26,107	98	37

- Los distritos que recibían el suministro de agua de *Southwark and Vauxhall Company* (distritos de **control**) tuvieron una tasa de mortalidad **8.5 veces mayor** relativo a los distritos que recibían el suministro de *Lambeth Company* (distritos de **tratamiento**).
- En primera medida esto parece una evidencia contundente, pero no se puede descartar problemas de selección.

Resultados potenciales

- Resultados potenciales:

$$Y_i = \begin{cases} Y_i(1) & \text{tasa de mortalidad del distrito } i \text{ si recibe agua limpia} \\ Y_i(0) & \text{tasa de mortalidad del distrito } i \text{ si recibe agua contaminada.} \end{cases}$$

Resultados potenciales

- Resultados potenciales:

$$Y_i = \begin{cases} Y_i(1) & \text{tasa de mortalidad del distrito } i \text{ si recibe agua limpia} \\ Y_i(0) & \text{tasa de mortalidad del distrito } i \text{ si recibe agua contaminada.} \end{cases}$$

- $D_i = 1$ si el proveedor de agua del distrito i es *Lambeth Company*;
 $= 0$ si el proveedor es *Southwark and Vauxhall Company*.

Resultados potenciales

- Resultados potenciales:

$$Y_i = \begin{cases} Y_i(1) & \text{tasa de mortalidad del distrito } i \text{ si recibe agua limpia} \\ Y_i(0) & \text{tasa de mortalidad del distrito } i \text{ si recibe agua contaminada.} \end{cases}$$

- D_i : = 1 si el proveedor de agua del distrito i es *Lambeth Company*;
= 0 si el proveedor es *Southwark and Vauxhall Company*.

- Efecto causal por distrito:

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0).$$

Resultados potenciales

- Resultados potenciales:

$$Y_i = \begin{cases} Y_i(1) & \text{tasa de mortalidad del distrito } i \text{ si recibe agua limpia} \\ Y_i(0) & \text{tasa de mortalidad del distrito } i \text{ si recibe agua contaminada.} \end{cases}$$

- D_i : = 1 si el proveedor de agua del distrito i es *Lambeth Company*;
= 0 si el proveedor es *Southwark and Vauxhall Company*.

- Efecto causal por distrito:

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0).$$

Problema fundamental de la inferencia causal: no vemos al mismo distrito en los dos estados de la naturaleza al mismo tiempo.

El problema de selección

- Tasa de mortalidad observada:

$$Y_i = Y_i(0) + \underbrace{(Y_i(1) - Y_i(0))}_{\tau_i} D_i.$$

El problema de selección

- Tasa de mortalidad observada:

$$Y_i = Y_i(0) + \underbrace{(Y_i(1) - Y_i(0))}_{\tau_i} D_i.$$

- $\tau_{Snow} = \mathbb{E}[Y_i|D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|D_i = 0]$. Pero sabemos que

$$\begin{aligned}\tau_{Snow} &= \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(1)|D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0)|D_i = 1]}_{\tau_{ATT}} \\ &+ \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(0)|D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0)|D_i = 0]}_{\text{Sesgo de selección}}.\end{aligned}$$

El problema de selección

- Tasa de mortalidad observada:

$$Y_i = Y_i(0) + \underbrace{(Y_i(1) - Y_i(0))}_{\tau_i} D_i.$$

- $\tau_{Snow} = \mathbb{E}[Y_i|D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i|D_i = 0]$. Pero sabemos que

$$\begin{aligned}\tau_{Snow} &= \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(1)|D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0)|D_i = 1]}_{\tau_{ATT}} \\ &\quad + \underbrace{\mathbb{E}[Y_i(0)|D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_i(0)|D_i = 0]}_{\text{Sesgo de selección}}.\end{aligned}$$

En palabras, $\tau_{Snow} = \tau_{ATT}$ únicamente si **no hay diferencias sistemáticas entre los distritos** que son abastecidos por cada una de las compañías.



Modelo de diferencias en diferencias (DiD)

Modelo de DiD - extendiendo la lógica de Snow

- El modelo de **diferencias en diferencias** es una extensión de la lógica de Snow cuando tenemos datos panel.
 - **Datos panel:** **observaciones para unas mismas unidades en diferentes momentos del tiempo** (individuos, firmas, ciudades, países, colegios, cohortes, *etc.*).

Modelo de DiD - extendiendo la lógica de Snow

- El modelo de **diferencias en diferencias** es una extensión de la lógica de Snow cuando tenemos datos panel.
 - **Datos panel:** **observaciones para unas mismas unidades en diferentes momentos del tiempo** (individuos, firmas, ciudades, países, colegios, cohortes, *etc.*).
- **Notación** (modelo de 2×2):
 - Periodos $t \in \{0, 1\}$: pre y post.
 - Indicador de grupo $D_i \in \{0, 1\}$.
 - Indicador temporal $\text{Post}_t = \mathbf{1}\{t = 1\}$.
 - Tratamiento efectivo $D_{i,t} = D_i \times \text{Post}_t$.
 - Resultado $Y_{i,t}$.


Modelo de DiD - extendiendo la lógica de Snow

- El modelo de **diferencias en diferencias** es una extensión de la lógica de Snow cuando tenemos datos panel.
 - **Datos panel:** **observaciones para unas mismas unidades en diferentes momentos del tiempo** (individuos, firmas, ciudades, países, colegios, cohortes, *etc.*).
- **Notación** (modelo de 2×2):
 - Periodos $t \in \{0, 1\}$: pre y post.
 - Indicador de grupo $D_i \in \{0, 1\}$.
 - Indicador temporal $\text{Post}_t = \mathbf{1}\{t = 1\}$.
 - Tratamiento efectivo $D_{i,t} = D_i \times \text{Post}_t$.
 - Resultado $Y_{i,t}$.
- Tres formas equivalentes de motivar DiD:
 1. Gráficamente.
 2. Resultados potenciales.
 3. Modelo de regresión.

1. Experimentos naturales y modelo de diferencias
2. Modelo de diferencias en diferencias (DiD)
 - Gráficamente
 - Resultados potenciales
 - Modelo de regresión
3. Ejemplo: Card and Krueger (1994)


Representación gráfica I

- Diferencias en el tiempo para el grupo tratado ($D_i = 1$):




Representación gráfica II

- Diferencias en el tiempo para el grupo de control ($D_i = 0$):



Representación gráfica II

- Diferencias en el tiempo para el grupo de control ($D_i = 0$):



- El valor esperado de la tasa de mortalidad en el periodo pre no es igual en los dos grupos, i.e., es posible que tengamos selección.

S1. Tendencias paralelas

En ausencia del tratamiento, la evolución promedio de la variable dependiente en el grupo tratado **habría sido igual** a la del grupo de control (posible condicional a covariables).

Supuestos de identificación

S1. Tendencias paralelas

En ausencia del tratamiento, la evolución promedio de la variable dependiente en el grupo tratado **habría sido igual** a la del grupo de control (posible condicional a covariables).

S2. No anticipación

Los individuos (o unidades) no ajustan sus resultados antes del tratamiento por esperar recibirlo. Por tanto, el tratamiento no tiene efectos en periodos previos a su inicio.

Supuestos de identificación

S1. Tendencias paralelas

En ausencia del tratamiento, la evolución promedio de la variable dependiente en el grupo tratado **habría sido igual** a la del grupo de control (posible condicional a covariables).


S2. No anticipación

Los individuos (o unidades) no ajustan sus resultados antes del tratamiento por esperar recibirlo. Por tanto, el tratamiento no tiene efectos en periodos previos a su inicio.

S3. SUTVA

No hay interferencia entre unidades: el tratamiento de una unidad no afecta los resultados potenciales de otras (ni efectos de equilibrio general).

Supuestos de identificación: gráficamente



- No se requiere que $\mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 1] \implies$ se permiten diferencias sistemáticas entre los grupos.

- Bajo los supuestos descritos

$$\tau_{DiD} = \Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t} | D_i = 1] - \Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t} | D_i = 0] = \tau_{ATT}.$$

Modelo de diferencias en diferencias

- Bajo los supuestos descritos

$$\tau_{DiD} = \Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i = 1] - \Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i = 0] = \tau_{ATT}.$$

Notar que $\tau_{Snow} \neq \tau_{DiD}$ a menos que $\mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 0]$.

Modelo de diferencias en diferencias

- Bajo los supuestos descritos

$$\tau_{DiD} = \Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i = 1] - \Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i = 0] = \tau_{ATT}.$$

Notar que $\tau_{Snow} \neq \tau_{DiD}$ a menos que $\mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 0]$.

- Bajo **tendencias paralelas**, al hacer las diferencias en el tiempo se elimina el componente sistemático.
 - El supuesto de tendencias paralelas puede ser más “suave” que el supuesto de no diferencias sistemáticas.
 - Es posible validar (**parcialmente**) este supuesto si hay más de un periodo pre.

1. Experimentos naturales y modelo de diferencias
2. Modelo de diferencias en diferencias (DiD)
 - Gráficamente
 - Resultados potenciales
 - Modelo de regresión
3. Ejemplo: Card and Krueger (1994)

$$\begin{aligned}\tau_{ATT} &= \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(1)|D_i = 1]}_{\text{Obs.}} - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 1]}_{\text{No Obs.}} \\ &= \mathbb{E}[Y_{i,1}|D_i = 1] - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 1]}_{\text{No Obs.}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tau_{ATT} &= \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(1)|D_i = 1]}_{\text{Obs.}} - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 1]}_{\text{No Obs.}} \\ &= \mathbb{E}[Y_{i,1}|D_i = 1] - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 1]}_{\text{No Obs.}}\end{aligned}$$

- En el modelo de diferencias “simples” se asume que **no hay selección**:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 1]}_{\text{No Obs.}} = \mathbb{E}[Y_{i,1}|D_i = 0],$$

pero puede ser un **supuesto muy fuerte**.

Resultados potenciales II

- ¿Qué resultados potenciales puedo observar?
 - $\mathbb{E}[Y_{i,0}(0)|D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 0]$.
 - $\mathbb{E}[Y_{i,1}(1)|D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{i,1}|D_i = 1]$.
 - $\mathbb{E}[Y_{i,0}(0)|D_i = 1] = \mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 1]$ si **no hay anticipación**.
 - $\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 0] = \mathbb{E}[Y_{i,1}|D_i = 0]$ si se cumple **SUTVA**.

	Pre ($t = 0$)	Post ($t = 1$)
Tratado ($D_i = 1$)	$\mathbb{E}[Y_{i,0}(0) D_i = 1]$	$\mathbb{E}[Y_{i,1}(1) D_i = 1]$
Control ($D_i = 0$)	$\mathbb{E}[Y_{i,0}(0) D_i = 0]$	$\mathbb{E}[Y_{i,1}(0) D_i = 0]$

- Si se cumple **tendencias paralelas**:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 1]}_{\text{No Obs.}} - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,0}(0)|D_i = 1]}_{\text{Obs.}} = \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 0]}_{\text{Obs.}} - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,0}(0)|D_i = 0]}_{\text{Obs.}}.$$

- Si se cumple **tendencias paralelas**:

$$\underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 1]}_{\text{No Obs.}} - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,0}(0)|D_i = 1]}_{\text{Obs.}} = \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 0]}_{\text{Obs.}} - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,0}(0)|D_i = 0]}_{\text{Obs.}}.$$

Resolviendo para el componente no observado:

$$\begin{aligned}\underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 1]}_{\text{No Obs.}} &= \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,0}(0)|D_i = 1]}_{\text{Obs.}} + \left(\underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 0]}_{\text{Obs.}} - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,0}(0)|D_i = 0]}_{\text{Obs.}} \right) \\ &= \mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 1] + \left(\mathbb{E}[Y_{i,1}|D_i = 0] - \mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 0] \right).\end{aligned}$$

Resultados potenciales III

$$\begin{aligned}\tau_{ATT} &= \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(1)|D_i = 1]}_{\text{Obs.}} - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 1]}_{\text{No Obs.}} \\ &= \mathbb{E}[Y_{i,1}|D_i = 1] - \underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}(0)|D_i = 1]}_{\text{No Obs.}}\end{aligned}$$

- Reemplazando:

$$\tau_{ATT} = \left(\underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}|D_i = 1] - \mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 1]}_{\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i=1]} \right) - \left(\underbrace{\mathbb{E}[Y_{i,1}|D_i = 0] - \mathbb{E}[Y_{i,0}|D_i = 0]}_{\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i=0]} \right).$$

En palabras, si se cumplen los supuestos de identificación $\tau_{ATT} = \tau_{DiD}$.

1. Experimentos naturales y modelo de diferencias
2. Modelo de diferencias en diferencias (DiD)
 - Gráficamente
 - Resultados potenciales
 - Modelo de regresión
3. Ejemplo: Card and Krueger (1994)

Modelo de regresión lineal

- Modelo de regresión:

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Post_t + \beta_2 D_i + \beta_3 (D_i \times Post_t) + e_{i,t}$$

Modelo de regresión lineal

- Modelo de regresión:

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Post_t + \beta_2 D_i + \beta_3 (D_i \times Post_t) + e_{i,t}$$

1. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 1, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$

Modelo de regresión lineal

- Modelo de regresión:

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Post_t + \beta_2 D_i + \beta_3 (D_i \times Post_t) + e_{i,t}$$

1. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 1, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$
2. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 0, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_2$

Modelo de regresión lineal

- Modelo de regresión:

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Post_t + \beta_2 D_i + \beta_3 (D_i \times Post_t) + e_{i,t}$$

1. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 1, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$
2. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 0, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_2$
3. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 1, D_i = 0] = \beta_0 + \beta_1$

Modelo de regresión lineal

- Modelo de regresión:

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Post_t + \beta_2 D_i + \beta_3 (D_i \times Post_t) + e_{i,t}$$

1. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 1, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$
2. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 0, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_2$
3. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 1, D_i = 0] = \beta_0 + \beta_1$
4. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 0, D_i = 0] = \beta_0$

Modelo de regresión lineal

- Modelo de regresión:

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Post_t + \beta_2 D_i + \beta_3 (D_i \times Post_t) + e_{i,t}$$

1. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 1, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$
2. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 0, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_2$
3. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 1, D_i = 0] = \beta_0 + \beta_1$
4. $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 0, D_i = 0] = \beta_0$

Diferencias en el tiempo para cada grupo ($\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t} | D_i]$):

- a. $(1) - (2) = \beta_1 + \beta_3$
- b. $(3) - (4) = \beta_1$

Modelo de regresión lineal

- Modelo de regresión:

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Post_t + \beta_2 D_i + \beta_3 (D_i \times Post_t) + e_{i,t}$$

- $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 1, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3$
- $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 0, D_i = 1] = \beta_0 + \beta_2$
- $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 1, D_i = 0] = \beta_0 + \beta_1$
- $\mathbb{E}[Y_{i,t} | Post_t = 0, D_i = 0] = \beta_0$

Diferencias en el tiempo para cada grupo ($\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t} | D_i]$):

- $(1) - (2) = \beta_1 + \beta_3$
- $(3) - (4) = \beta_1$

DiD ($\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t} | D_i = 1] - \Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t} | D_i = 0]$):

- $\tau_{DiD} \equiv (a) - (b) = \beta_3$

- Modelo de regresión (alternativa en primeras diferencias):

$$\Delta_t Y_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 D_i + e_{i,t}$$

Modelo de regresión en primeras diferencias

- Modelo de regresión (alternativa en primeras diferencias):

$$\Delta_t Y_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 D_i + e_{i,t}$$

- **Diferencias en el tiempo para cada grupo** ($\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i]$):

1. $\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i = 1] = \gamma_0 + \gamma_1$
2. $\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i = 0] = \gamma_0$

Modelo de regresión en primeras diferencias

- Modelo de regresión (alternativa en primeras diferencias):

$$\Delta_t Y_{i,t} = \gamma_0 + \gamma_1 D_i + e_{i,t}$$

- **Diferencias en el tiempo para cada grupo** ($\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i]$):

1. $\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i = 1] = \gamma_0 + \gamma_1$
2. $\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i = 0] = \gamma_0$

DiD ($\Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i = 1] - \Delta_t \mathbb{E}[Y_{i,t}|D_i = 0]$):

- $\tau_{DiD} \equiv (1) - (2) = \gamma_1$

Algunas ventajas del modelo de regresión

1. Podemos agregar controles (si son necesarios).
 - Controles que hacen que el supuesto de **tendencias paralelas** sea más plausible.
 - Reducen la varianza residual $\implies$ mejora la precisión del estimador.
 - Evitar usar variables de control que puedan estar afectadas por el tratamiento.
2. Permite calcular errores estándar directamente.
3. Se puede generalizar fácilmente a más de dos periodos. Esto a su vez permite testear **parcialmente** el supuesto de tendencias paralelas (próximas diapositivas).
4. Se puede generalizar a tratamientos que no son binarios. Por ejemplo, diferentes intensidades del tratamiento (próximas diapositivas).


Ejemplo: Card and Krueger (1994)

Card and Krueger (1994)

- ¿Cuál es el efecto de incrementar el salario mínimo sobre el nivel de empleo/desempleo?


Card and Krueger (1994)

- ¿Cuál es el efecto de incrementar el salario mínimo sobre el nivel de empleo/desempleo?
- Si hay competencia perfecta en el mercado laboral, $\uparrow$ salario mínimo $\downarrow$ el nivel de empleo.



Card and Krueger (1994)


- ¿Cuál es el efecto de incrementar el salario mínimo sobre el nivel de empleo/desempleo?
- Si hay competencia perfecta en el mercado laboral, $\uparrow$ salario mínimo $\downarrow$ el nivel de empleo.



- Es posible afectar negativamente grupos que en principio se buscaba ayudar.

Card and Krueger (1994)

- ¿Cuál es el efecto de incrementar el salario mínimo sobre el nivel de empleo/desempleo?
- Si hay competencia perfecta en el mercado laboral, $\uparrow$ salario mínimo $\downarrow$ el nivel de empleo.



- Es posible afectar negativamente grupos que en principio se buscaba ayudar.
- La predicción teórica no tiene ambigüedad (al menos en este contexto), pero la evidencia empírica no ha sido concluyente.

- En abril 1992, el estado de **New Jersey (NJ)** **aumentó el salario mínimo** de \$4.25 a \$5.05 dólares por hora (18.8 %). El aumento había sido decretado en 1990.

Card and Krueger (1994)


- En abril 1992, el estado de **New Jersey (NJ)** **aumentó el salario mínimo** de \$4.25 a \$5.05 dólares por hora (18.8 %). El aumento había sido decretado en 1990.
- Card y Krueger recolectaron información de 410 restaurantes de comida rápida (e.g., Burger King, KFC, etc.) en el estado NJ y Pensilvania (estado vecino de NJ donde el **salario mínimo se mantuvo en \$4.25**).

Card and Krueger (1994)

- En abril 1992, el estado de **New Jersey (NJ)** **aumentó el salario mínimo** de \$4.25 a \$5.05 dólares por hora (18.8 %). El aumento había sido decretado en 1990.
- Card y Krueger recolectaron información de 410 restaurantes de comida rápida (e.g., Burger King, KFC, etc.) en el estado NJ y Pensilvania (estado vecino de NJ donde el **salario mínimo se mantuvo en \$4.25**).
- Información pre: febrero-marzo de 1992. Información post: noviembre-diciembre de 1992.

$$\Delta E_i = \alpha + \tau NJ_i + \mathbf{X}_i' \beta + \epsilon_i.$$


Card and Krueger (1994)




Card and Krueger (1994)

Distribución del Salario de Entrada por Estado

(a) Febrero 1992



(b) Noviembre 1992



Barra negra (NJ)

Card and Krueger (1994)

(a) Diferencias de Promedios

Variable	Stores by state		
	PA (i)	NJ (ii)	Difference, NJ - PA (iii)
1. FTE employment before, all available observations	23.33 (1.35)	20.44 (0.51)	- 2.89 (1.44)
2. FTE employment after, all available observations	21.17 (0.94)	21.03 (0.52)	- 0.14 (1.07)
3. Change in mean FTE employment	- 2.16 (1.25)	0.59 (0.54)	2.76 (1.36)
4. Change in mean FTE employment, balanced sample of stores ^c	- 2.28 (1.25)	0.47 (0.48)	2.75 (1.34)
5. Change in mean FTE employment, setting FTE at temporarily closed stores to 0 ^d	- 2.28 (1.25)	0.23 (0.49)	2.51 (1.35)

(b) Modelo de Regresión

Independent variable	(i)	(ii)
1. New Jersey dummy	2.33 (1.19)	2.30 (1.20)
2. Initial wage gap ^a	—	—
3. Controls for chain and ownership ^b	no	yes
4. Controls for region ^c	no	no
5. Standard error of regression	8.79	8.78
6. Probability value for controls ^d	—	0.34

No se encuentra ningún efecto sobre el empleo.