MATHS ASSIGNMENT

Q1 $px - qy = y^2 - x^2$

Soln $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{y^2 - x^2}$

$\frac{x\,dx + y\,dy + z\,dz}{\cancel{x^2} - \cancel{y^2} + \cancel{y^2} - \cancel{x^2}}$

taking first 2 fractions

$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{-y}$

$\log x = -\log y + \log c$

$\log x + \log y = \log c$

$\boxed{xy = c_1}$

$\frac{dx}{x} = \frac{x\,dy + y\,dy + dz}{0}$

$x\,dx + y\,dy + dz = 0$

$x^2 + y^2 + 2z = c_2$

$f(xy,\ x^2 + y^2 + 2z)$

Q2. Solve $(z^2 - 2yz - y^2)p + (xy + zx)q = xy - zx$

Soln $\frac{dx}{z^2 - 2yz - y^2} = \frac{dy}{xy + zx} = \frac{dz}{xy - zx}$

classmate
Date
Page

using x, y, z as multiplier

each fraction $= \dfrac{x\,dx + y\,dy + z\,dz}{x(z^2-2yz-y^2) + y(xy+zx) + z(xy-zx)}$

$= \dfrac{x\,dx + y\,dy + z\,dz}{0}$

$x\,dx + y\,dy + z\,dz = 0$

Integrate $= \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{y^2}{2} + \dfrac{z^2}{2} = c_1$

$x^2 + y^2 + z^2 = 2c_1$

$\dfrac{dy}{x(y+z)} = \dfrac{dz}{x(y-z)}$

$\dfrac{dy}{y+z} = \dfrac{dz}{y-z}$

$(y-z)\,dy = (y+z)\,dz$

$y\,dy - z\,dy - y\,dz - z\,dz = 0$

$y\,dy - (y\,dz + z\,dy) - z\,dz = 0$

$y\,dy - d(yz) - z\,dz = 0$

Integrating

$y^2 - 2yz - z^2 = c_2$

$f(u,v) = F(x^2+y^2+z^2,\ y^2-2yz-z^2) = 0$

Q3 $\quad p\tan x + q\tan y = \tan z$

$$\frac{dx}{\tan x} = \frac{dy}{\tan y} = \frac{dz}{\tan z}$$

$$dx \cot x = dy \cot y = \cot z\, dz$$

taking ① & ②

$$dx \cot x = y \cot y\, dy$$

Integrate

$$\log \sin x = \log \sin y + \log c_2$$

$$\frac{\sin x}{\sin y} = c_2$$

taking last 2 fractions

$$dy \cot y = \cot z\, dz$$

$$\log \sin y = \log \sin x = \log c_2$$

$$\frac{\sin y}{\sin z} = c_2$$

$$F\left(\frac{\sin x}{\sin y}, \frac{\sin y}{\sin z}\right) = 0$$

classmate

Date

Page

Q4 $y^2p - xyq = x(z-2y)$

Soln Subsidiary eq^n

$(p - xyq) = x(z-2y)$

$$\frac{dx}{y^2} = \frac{dy}{-xy} = \frac{dz}{x(z-2y)}$$

Taking first two fraction

$$\frac{dx}{y^2} = \frac{-dy}{xy}$$

$$xdx - ydy = 0$$

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = c$$

$$\boxed{x^2 - y^2 = c}$$

Taking last two fraction

$$\frac{dy}{xy} = \frac{dz}{\cancel{x}(z-2y)}$$

$$(z-2y)dy = ydz$$

$$ydz + zdy - 2ydy = 0$$

$$d(yz) - 2ydy = 0$$

$$yz - y^2 = c_2$$

$$f(x^2 + y^2, yz - y^2)$$

Q5 $(x^2-y^2-z^2)p + 2xyq = 2xz$

$$\frac{dx}{x^2-y^2-z^2} = \frac{dy}{2xy} = \frac{dz}{2xz}$$

last 2 fractions

$$\frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$$

$$\log y = \log z + \log c_1$$

$$\boxed{\frac{y}{z} = c_1}$$

using x, y, z multiplier

$$\frac{x\,dx + y\,dy + z\,dz}{x(x^2-y^2-z^2) + 2xy^2 + 2xz^2}$$

$$= \frac{x\,dx + y\,dy + z\,dz}{x^3 + xy^2 + xz^2}$$

$$= \frac{x\,dx + y\,dy + z\,dz}{x(x^2+y^2+z^2)}$$

Taking,

classmate
Date
Page

$$\frac{dy}{2\cancel{x}y} = \frac{x\,dx + y\,dy + z\,dx}{\cancel{x}(x^2+y^2+z^2)}$$

$$\log y = \log(x^2+y^2+z^2) + \log c_2$$

$$\boxed{c_2 = \frac{y}{x^2+y^2+z^2}}$$

$$F\left(\frac{y}{z}, \frac{y}{x^2+y^2+z^2}\right) = 0$$

Q6 $p - q = \log(x+y)$

$$dx = -dy = \frac{dz}{\log(x+y)}$$

$$dx = -dy$$

$$\boxed{x+y=c_1}$$

Taking Ist and last fraction

$$\frac{dx}{} = \frac{dz}{\log(x+y)}$$

$$dx = \frac{dz}{\log(x+y)}$$

$\Rightarrow$ $(\log(x+y))\,dx = dz$

$\Rightarrow$ $(\log(c_1))\cdot dx = dz$

$\log c_1\, x = \cancel{d}z + c_2$

$$\boxed{x\log(x+y)-z=c_2}$$

$$\boxed{f\left(x+y,\ x\log(x+y)-z\right)=0}$$ Ans

Q7 $(x^2-yz)p+(y^2-zx)q=(z^2-xy)$

each fracⁿ $= \dfrac{dx+dy+dz}{x^2-yz+y^2-zx+z^2-xy}$

$= \dfrac{dx+dy+dz}{x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx}$

$= \dfrac{x\,dx+y\,dy+z\,dz}{(x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)}$

(i) = (ii)

$$\frac{x\,dx+y\,dy+z\,dz}{(x+y+z)\cancel{(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)}} = \frac{dx+dy+dz}{\cancel{(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)}}$$

$$\frac{x\,dx+y\,dy+z\,dz}{(x+y+z)} = \frac{dx+dy+dz}{1}$$

$$x\,dx+y\,dy+z\,dz = (x+y+z)\,d(x+y+z)$$

$$x^2+y^2+z^2 = (x+y+z)^2+c_1$$

$$\boxed{c_1 = xy+yz+zx}$$

Date
Page

each fraction $= \dfrac{dx-dy}{(x^2-yz)-(y^2-zx)} = \dfrac{dy-dz}{(y^2-zx)-(z^2-xy)}$

$$\frac{d(x-y)}{(x-y)(x+\cancel{y+z})} = \frac{d(y-z)}{(y-z)(x+\cancel{y+z})}$$

$$\log(x-y) = \log(y-z) + \log c_2$$

$$\boxed{\frac{x-y}{y-z} = c_2}$$

$$\boxed{f\left(xy+yz+zx\ ,\ \frac{x-y}{y-z}\right) = 0}$$

Q8 $\quad x^2(y-z)p + y^2(z-x)q = z^2(x-y)$

$$\frac{dx}{x^2(y-z)} = \frac{dy}{y^2(z-x)} = \frac{dz}{z^2(x-y)}$$

us'g $\dfrac{1}{x^2}, \dfrac{1}{y^2}, \dfrac{1}{z}$ as multipliers

each fraction $- \dfrac{\dfrac{dx}{x^2} + \dfrac{dy}{y^2} + \dfrac{dz}{z^2}}{\cancel{y}-\cancel{z}+\cancel{z}-\cancel{x}+\cancel{x}-\cancel{y}}$

$$\frac{dx}{x^2} + \frac{dy}{y^2} + \frac{dz}{z^2} = 0$$

$$\boxed{\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = c_1}$$

Page

$\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ as multiplier

each fraction = $\dfrac{\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} + \frac{dz}{z}}{x(y-z) + y(z-x) + z(x-y)} \longrightarrow 0$

$$\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} + \frac{dz}{z} = 0$$

$$\log x + \log y + \log z = \log c_2$$

$$\boxed{c_2 = xyz}$$

$$\boxed{f\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}, \ xyz\right) = 0}$$

Q9 $x(y^2 - z^2)p + y(z^2 - x^2)q = z(x^2 - y^2)$

use x, y, z as multipliers

$$\frac{xdx + ydy + zdz}{x^2y^2 - x^2z^2 + y^2z^2 - x^2y^2 + z^2x^2 - z^2y^2} \longrightarrow 0$$

$$xdx + ydy + zdz = 0$$

Integrate

$$\boxed{\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2} = c_1}$$

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 = c_1}$$

Using $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ as multiplier

$$\frac{\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} + \frac{dz}{z}}{0}$$

$$\log x + \log y + \log z = \log c_2$$

$$\boxed{xyz = c_2}$$

$$\boxed{f(x^2+y^2+z^2, xyz) = 0}$$