

Lista de Exercícios 2

Gustavo Higuchi

August 16, 2016

Contents

| | |
|-------------|---|
| Exercício 1 | 2 |
| Exercício 2 | 6 |

Exercício 1

(a)

Teorema 1. Para qualquer $n \in \mathbb{Z}^+$, a seguinte equação é verdadeira.

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \quad (1)$$

Proof. Para $n = 1$, isso é verdade?

$$\begin{aligned} 1^3 &= \frac{1^2(1+1)^2}{4} \\ 1 &= \frac{1(2)^2}{4} \\ 1 &= \frac{4}{4} = 1 \end{aligned} \quad (2)$$

Sim! É verdade. E para $n = 2$?

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 &= \frac{2^2(2+1)^2}{4} \\ 1 + 8 &= \frac{2^2(2+1)^2}{4} \\ 9 &= \frac{4(9)}{4} = 9 \end{aligned} \quad (3)$$

Vou supor que para um $n = k$ dá certo também, então para $n = k + 1$ dá certo?

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 &= \frac{(k+1)^2((k+1)+1)^2}{4} \\ \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ \frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3}{4} &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ \frac{(k+1)^2(k^2 + 4(k+1))}{4} &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ \frac{(k+1)^2(k^2 + 4k + 4)}{4} &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} &= \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \end{aligned} \quad (4)$$

Dá! Sucesso! Provado por indução!

□

(b)

Teorema 1. Para qualquer $n \in \mathbb{N}$ e todo $c \in \mathbb{C} - 1, 0$, a seguinte equação é verdadeira.

$$\sum_{i=0}^n c^i = \frac{c^{n+1} - 1}{c - 1} \quad (5)$$

Proof. Para $n = 0$, temos

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^0 c^i &= \frac{c^{0+1} - 1}{c - 1} \\
c + 1 &= \frac{c^2 - 1}{c - 1} \\
(c + 1)(c - 1) &= c^2 - 1 \\
c^2 - c + c - 1 &= \\
c^2 - 1 &= c^2 - 1
\end{aligned} \tag{6}$$

Para $n = 1$, temos

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^1 c^i &= \frac{c^{1+1} - 1}{c - 1} \\
c^2 + c + 1 &= \frac{c^3 - 1}{c - 1} \\
(c^2 + c + 1)(c - 1) &= c^3 - 1 \\
c^3 - c^2 + c^2 - c + c - 1 &= \\
c^3 - 1 &= c^3 - 1
\end{aligned} \tag{7}$$

É verdade, então vamos supor que o teorema é válido para $n = k$, assim

$$\sum_{i=0}^k c^i = \frac{c^{k+1} - 1}{c - 1} \tag{8}$$

Então, vamos verificar se para $n = k + 1$ isso também vale, temos

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{k+1} c^i &= \frac{c^{k+2} - 1}{c - 1} \\
\sum_{i=0}^k c^i c^{k+1} &= \frac{c^{k+2} - 1}{c - 1} \\
\frac{c^{k+1} - 1}{c - 1} + (c^{k+1})(c - 1) &= \frac{c^{k+2} - 1}{c - 1} \\
\frac{c^{k+1} - 1 + c^{k+2} - c^{k+1}}{c - 1} &= \frac{c^{k+2} - 1}{c - 1} \\
\frac{c^{k+2} - 1}{c - 1} &= \frac{c^{k+2} - 1}{c - 1}
\end{aligned} \tag{9}$$

É verdade também

□

(c)

Teorema 1. $n^3 + 2n$ é divisível por 3 para todo $n \in \mathbb{N}^+$

Proof. Para $n = 0$, temos

$$\frac{0^3 + 2 * 0}{3} = 0 \quad (10)$$

Para $n = 1$, temos

$$\frac{1^3 + 2 * 1}{3} = \frac{3}{3} = 1 \quad (11)$$

Para $n = 2$, temos

$$\frac{2^3 + 2 * 2}{3} = \frac{8 + 4}{3} = 4 \quad (12)$$

Para $n = 3$, temos

$$\frac{3^3 + 2 * 3}{3} = \frac{9 + 6}{3} = 5 \quad (13)$$

Para $n = 4$, temos

$$\frac{4^3 + 2 * 4}{3} = \frac{64 + 8}{3} = 24 \quad (14)$$

Então vamos supor que para um $n = k$ isso também dá certo.

$$\frac{k^3 + 2k}{3} = ?? \quad (15)$$

□

(d)

Teorema 1. $9^n - 1$ é divisível por 8 para qualquer $n \in \mathbb{N}^+$

Proof. Para $n = 0$, temos

$$\frac{9^0 - 1}{8} = 0 \quad (16)$$

Para $n = 1$, temos

$$\frac{9^1 - 1}{8} = \frac{8}{8} = 1 \quad (17)$$

Para $n = 2$, temos

$$\frac{9^2 - 1}{8} = \frac{80}{8} = 10 \quad (18)$$

Então vamos supor que para um $n = k$ isso também dá certo.

$$\frac{9^k - 1}{8} = ?? \quad (19)$$

□

(e)

Teorema 1. $n^2 - 1$ é divisível por 8 para qualquer $n \in \mathbb{N}$ ímpar

Proof. Para $n = 0$, temos

$$\frac{0^2 - 1}{8} = 0 \quad (20)$$

Para $n = 1$, temos

$$\frac{1^2 - 1}{8} = 0 \quad (21)$$

Para $n = 3$, temos

$$\frac{3^2 - 1}{8} = \frac{8}{8} = 1 \quad (22)$$

Então vamos supor que para um $n = k$ isso também dá certo.

$$\frac{k^2 - 1}{8} = ?? \quad (23)$$

□

(f)

Teorema 1. $\sum_{i=1}^n i * (i + 1) = \frac{n(n + 1)(n + 2)}{3}$

Proof. Para $n = 1$, temos

$$\begin{aligned} 1 * 2 &= \frac{1 * (1 + 1) * (1 + 2)}{3} \\ 2 &= \frac{6}{3} = 2 \end{aligned} \quad (24)$$

Para $n = 2$ temos

$$\begin{aligned} (1 * 2) + (2 * 3) &= \frac{2 * (2 + 1)(2 + 2)}{3} \\ 8 &= \frac{24}{3} = 8 \end{aligned} \quad (25)$$

Assumindo que seja verdade para $n = k$,

$$\sum_{i=1}^k i * (i + 1) = \frac{k(k + 1)(k + 2)}{3} \quad (26)$$

vamos provar para $n = k + 1$

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{k+1} i * (i+1) &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \\
\sum_{i=1}^k i * (i+1) + (k+1)(k+2) &= \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} \\
\frac{k(k+1)(k+2)}{3} + (k^2 + 3k + 2) &= \\
\frac{k(k+1)(k+2) + 3 * (k^2 + 3k + 2)}{3} &= \\
\frac{k^3 + 3k^2 + 2k + 3k^2 + 9k + 6}{3} &= \\
\frac{k^3 + 6k^2 + 11k + 6}{3} &= \\
\frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3} &=
\end{aligned} \tag{27}$$

□

(g)

Teorema 1. $2^{n+2} + 3^{2n+1}$ é divisível por 7 para todo $n \in \mathbb{N}^+$

Proof. Para $n = 0$

$$\frac{2^{0+2} + 3^{0+1}}{7} = \frac{4 + 3}{7} = 1 \tag{28}$$

Para $n = 1$ temos

$$\frac{2^{1+2} + 3^{2+1}}{7} = \frac{8 + 27}{7} = 5 \tag{29}$$

Para $n = 2$ temos

$$\frac{2^{2+2} + 3^{4+1}}{7} = \frac{16 + 243}{7} = 37 \tag{30}$$

Vamos supor que para $n = k$ também é verdade

$$\frac{2^{n+2} + 3^{2n+1}}{7} = ?? \tag{31}$$

□

Exercício 2

Olha só