


## TRAUMATOLOGIA FORENSE – ENERGIAS MECÂNICAS III

### HEMATOMAS

Extensa lesão com acúmulo de sangue em uma quantidade razoável dentro de uma cavidade ou retida no interior dos tecidos.

- Vasos calibrosos, veias e artérias rompidos.
- Apalpação dá a sensação de flutuação.
- Maior volume de sangue que na equimose e na bossa.



ANOTAÇÕES


## FERIDAS CONTUSAS

### Feridas contusas

#### Características

- **Forma** estrelada, sinuosa ou retilínea;
- **Bordas irregulares;**
- **Pouco sangrantes;**
- Podem causar fraturas;
- Podem causar TCE.




Essas lesões podem ser caracterizadas por exclusão. Se não forem causadas por projétil, faca ou facão ou lâmina, é uma ferida contusa.

ANOTAÇÕES


## FRATURAS


- Solução de continuidade dos ossos (quebra).
- Flexão, torção, compressão.
- Direta: região atingida.
- Indireta: precipitação em pé com fratura da base do crânio por contragolpe, pois a energia que atinge as pernas se propaga ao longo de todo o esqueleto.
- Um traço, vários traços ou cominutiva (ocorre o esfarelamento).
- Fechada (subcutânea) ou exposta.
- Exumações, fraturas em vida: infiltração hemorrágica no foco da fratura.



ANOTAÇÕES



## LUXAÇÕES

Desencaixe de articulação. Pode ser causado por lesão por instrumento contundente.



## ENTORSES

Lesão de ligamentos por movimentos exagerados de articulações.



ANOTAÇÕES






## DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE-CEBRASPE/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA/CURSO DE FORMAÇÃO/2020) Julgue o próximo item, acerca da aplicação pericial. Situação hipotética: vítima de lesão corporal dolosa apresentou, como resultado da agressão, somente uma fratura mandibular alinhada, perfeitamente recuperada após seis semanas de bloqueio intermaxilar. Assertiva: segundo o art. 129 do Código Penal, nesse caso ocorreu lesão corporal grave.



## COMENTÁRIO

De acordo com o art. 129, uma das possibilidades que caracterizam lesão corporal grave é a incapacidade para as funções habituais por mais de 30 dias.

2. (IADES/PC-DF/PERITO CRIMINAL/PROVA CF/2019). Um caso público, divulgado pela imprensa, apresenta o seguinte trecho na reportagem: “as imagens anexadas, que não serão reproduzidas pela reportagem, para preservar a suposta vítima, mostram grandes áreas roxas. Essas imagens são das nádegas e coxas e foram produzidas seis dias depois do encontro do suposto agressor com a suposta vítima.” Esse tipo de observação sugere que tipo de lesão corporal?
- a. Hematoma.
  - b. Escoriação.
  - c. Equimose.
  - d. Edema traumático.
  - e. Necrose.

ANOTAÇÕES


## COMENTÁRIO

A lesão em que é possível correlacionar a cor com o tempo da lesão é a equimose.



1º dia	2º ao 3º	4º ao 6º	7º ao 10º	10º ao 12º	12º ao 17º dia
vermelho-bronzeada	arroxeadado	azul	esverdeada	amarelo-esverdeada	amarelada



3. (INSTITUTO AOCP/PC-ES/MÉDICO LEGISTA/2019) Em um exame de uma criança com diversas lesões e feridas no corpo, o médico-legista suspeitou estar diante de um caso da Síndrome da Criança Maltratada. Como ele NÃO deveria agir para alcançar tal diagnóstico?
- Descrever as lesões quanto à forma, ao tipo, à localização e ao número.
  - Realizar estudo radiológico para verificar fraturas e calcificações ósseas em diferentes estágios.
  - Realizar a entrevista, sempre que possível, na presença do responsável.
  - Verificar a escassez de tecido subcutâneo relacionado à privação de alimento.
  - Verificar presença de infestações de parasitas relacionadas à negligência.

ANOTAÇÕES


## COMENTÁRIO

Sobre a síndrome da criança maltratada (também pode acontecer com idosos e pessoas com deficiências), em grande parte dos casos a vítima foi agredida por uma pessoa da família. Então, um dos cuidados que se deve ter diante de um exame no IML é evitar que, durante a análise, o parente próximo participe de toda a consulta. A vítima pode se sentir intimidada e não vai relatar as agressões. É importante alguma autoridade perto durante os processos.

4. (FGV/PC-RJ/PERITO LEGISTA/ODONTOLOGIA/2011) Cianose, equimoses subconjuntivais, otorragias e manchas de Tardieu são sinais anatomopatológicos de:
- traumatismo de face.
  - asfixia.
  - reação alérgica.
  - reação anafilactóide.
  - metemoglobinemia.

## COMENTÁRIO

Cianose: rouxidão da face ou da língua.

Equimose subconjuntival: é na região das conjuntivas, interna do olho.

Otorragia: extravasamento de sangue pelos ouvidos.

Mancha de Tardieu: pequena equimose no coração, no pulmão.


São sinais de asfixia.



20m

ANOTAÇÕES


5. (FGV/PC-RJ/PERITO LEGISTA/ODONTOLOGIA/2011) As fraturas cranianas tipo mapa-mundi são características de lesões causadas por instrumentos:



- a. lacerantes.
- b. perfurantes.
- c. cortantes.
- d. contundentes.
- e. pérfuro-cortantes.

### COMENTÁRIO

Esse tipo de fratura é causada por instrumentos contundentes (exemplo: martelo, pedra ou porrete).

6. (DELEGADO/CE/ADAPTAÇÃO/2014) A equimose é a expressão final da infiltração hemorrágica nas malhas dos tecidos; apesar disso, ela tem pouca importância médico-legal, uma vez que não é possível correlacioná-la de forma temporal com o evento, lesão ou trauma.

### COMENTÁRIO

A equimose tem grande importância médico-legal.

ANOTAÇÕES




7. (DELEGADO/SP/ADAPTAÇÃO/2014) É uma característica da morfologia de uma ferida contusa a presença de bordas irregulares e de hemorragia não abundante.

## COMENTÁRIO

Bordas irregulares e hemorragia não abundante são características de ferida contusa.

## GABARITO

1. C
2. c
3. c
4. b
5. d
6. E
7. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada ministrada pelo professor Laécio Carneiro Rodrigues.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.