



@professorlaecio.csi



YouTube Perito e Professor Laécio Carneiro



Laécio Carneiro Rodrigues

Criminalística

Perito Criminal Laécio C. Rodrigues

Grancursos On Line

Drogas Depressoras - psicolépticas

1. Álcool etílico em bebidas;
2. Barbitúricos e benzodiazepínicos;
3. Opiáceos e opióides;
4. Solventes e inalantes.

Drogas Depressoras - Psicolépticas

1. ÁLCOOL ETÍLICO

- Presente nas bebidas alcoólicas: cerveja, cachaças, vinhos, licores, *whiskies*...;
- Obtenção: fermentação;
- Droga de abuso mais consumida no Brasil:
 1. Baixo custo; Legal;
 2. Facilidade na aquisição;
 3. Cultural;
 4. Aceitabilidade social.

Fermentação Alcoólica

Glicose \rightarrow álcool etílico + CO₂ + 2 ATP

Estatísticas: álcool X atos ilícitos:

- Alemanha: 50% dos crimes;
- Inglaterra: 60% dos homicídios;
- Inglaterra: 80% dos crimes de menor potencial ofensivo;
- Bélgica: 46,5% dos crimes; usuários crônicos;



Drogas Depressoras - psicodélicas

1. ÁLCOOL ETÍLICO

- Efeito: DOSE DEPENDENTE!

1º momento: efeitos desejados...

- Ação euforizante;
- Desinibição comportamental;
- Hilaridade;
- Aumento das expressões afetivas;
- Diminuição da autocrítica...



Intoxicação aguda

- **Período de euforia:** extroversão, desinibição;
- **Período médico-legal:** autocontrole, faculdades mentais, coordenação e alteradas;
- **Período comatoso:** atonia, midríase, queda na f.c., hipotermia, náuseas, vômitos, morte por parada respiratória.

2. BARBITÚRICOS

- Usos: **sedativos e anticonvulsivantes**;
- Doses terapêuticas: redução da ansiedade; relaxamento muscular; hipnose; diminuição da PA e FC;
- Intoxicação: semelhante ao álcool; fala enrolada; ataxia; cefaléia; confusão mental;
- Casos graves: coma; perda dos reflexos; hipotermia; depressão cardiorrespiratória; óbito;
- Uso prolongado, suspensão: abstinência



3. BENZODIAZEPÍNICOS

- Substitutos menos tóxicos para os barbitúricos;
- Mais seguros, menos efeitos colaterais;
- Usos: ansiedades, insônias, miorrelaxantes, anticonvulsivantes;
- Muito usados: 95% dos idosos em BH!



Toxicologia dos benzodiazepínicos

- Doses terapêuticas amplas: seguros;
- Intoxicação aguda: ataxia; fala enrolada; sonolência; coma; depressão respiratória;
- Overdose: rara; mas ocorre associado a outros depressores (etanol e barbitúricos);
- Amnésia anterógrada: uso criminoso = “boa noite Cinderela”;
- Uso prolongado, suspensão: abstinência!