Alt subiect

19.01.2025 19:56



II RLG ⇔ RE from FA [q3 final state]
q1
q2
q3
0,1
1
0
1

$\delta(q_1, 0) = q_2$ $\delta(q_2, 1) = q_3$

$\delta(q_1, 1) = q_2$ $\delta(q_3, 0) = q_2$

$\delta(q_2, 0) = q_2$ $\delta(q_3, 1) = q_1$

P: $q_1 \to 0q_2 \mid 1q_2$

$q_2 \to 0q_2 \mid 1q_3 \mid 1$

$q_3 \to 0q_2 \mid 1q_1$

$X = aX + b$ $X = X_a + b$

$X = a^*b$ $X = ba^*$

$q_1 = q_3 1 + \varepsilon$

$q_2 = q_2 0 + q_1 0 + q_1 1 + q_3 0$

$q_3 = q_2 1$

$q_1 = q_2 11 + \varepsilon$

$q_2 = q_2 0 + (q_2 11 + \varepsilon)0 + (q_2 11 + \varepsilon)1 + q_2 10$

$q_2 = q_2 0 + q_2 110 + 0 + q_2 111 + 1 + q_2 10$

$q_2 = q_2 (0 + 110 + 111 + 10) + 0 + 1$

$q_2 = (0+1)(0 + 110 + 111 + 10)^*$

$q_3 = (0+1)(0 + 110 + 111 + 10)^* 1$



III $L = \{(ab)^n c^n \mid n > 0\}$





IV G = ({Secv, Inst}, {a, b, ;, >>}, P, Secv)
P: Secv -> Secv ; Inst | Inst
Inst -> a >> Inst | b
LR(0) canonical collection.



$S_0 = cl(\{[S' \to \bullet Secv]\}) = \{[S' \to \bullet Secv], [Secv \to \bullet Secv ; Inst], [Secv \to \bullet Inst], [Inst \to \bullet a \gg Inst], [Inst \to \bullet b]\}$

$S_1 = goto(S_0, Secv) = cl(\{[S' \to Secv \bullet]\}) = \{[S' \to Secv \bullet], [Secv \to Secv \bullet ; Inst]\}$

$S_2 = goto(S_0, Inst) = cl(\{[Secv \to Inst \bullet]\}) = \{[Secv \to Inst \bullet]\}$

$S_3 = goto(S_0, a) = cl(\{[Inst \to a \bullet \gg Inst]\}) = \{[Inst \to a \bullet \gg Inst]\}$

$S_4 = goto(S_0, b) = cl(\{[Inst \to b \bullet]\}) = \{[Inst \to b \bullet]\}$

$S_5 = goto(S_1, ;) = cl(\{Secv \to Secv ; \bullet Inst\}) = \{\{Secv \to Secv ; \bullet Inst\}, \{Inst \to \bullet a \gg Inst\}, \{Inst \to \bullet b\}\}$

$S_7 = goto(S_5, Inst) = \{[Secv \to Secv ; Inst \bullet]\}$

$S_6 = goto(S_5, a) = \{[Inst \to a \bullet \gg Inst], [Inst \to \bullet a \gg Inst], [Inst \to \bullet b]\}$

$S_4 = goto(S_6, b)$

$S_4 = goto(S_5, b)$

$S_8 = goto(S_6, Inst) = \{[Inst \to a \gg Inst \bullet]\}$

$S_3 = goto(S_6, a)$

$S_3 = goto(S_5, a)$

$S_4 = goto(S_6, b)$

$S_4 = goto(S_5, b)$

$S_8 = goto(S_6, Inst)$

$S_7 = goto(S_5, Inst)$

la mama lui Hori continuă

I a := 0 ; flag := true ; for i := 1 to n do if (a > 3) or (j < 10) and flag then flag := false else a := j * a := a + j * i