# Q - 1 கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதீத உப்புச் செறிவு உள்ள சூழலில் காணப்படுபவை எவை ?

- அ) ஆர்க்கி பாக்டீரியா
- ஆ) யூபாக்டீரியா
- இ) சயனோ பாக்டீரியா
- ஈ) மைக்கோபாக்டீரியா

Q - 1 கீழ்க்கண்டவற்றுள் அதீத உப்புச் செறிவு உள்ள சூழலில் காணப்படுபவை எவை ?

அ) ஆர்க்கி பாக்டீரியா

## Q - 2 சரியாக பொருந்தாத இணையைத் தேர்ந்தெடு

- அ) ப்ராங்கியா- அல்னஸ்
- ஆ) ரோடோஸ்பைரில்லம் பூஞ்சைவேரி
- இ) அனபீனா நைட்ரஜன் நிலைபடுத்தி
- ஈ) ரைசோபியம் -அல்பா அல்பா

Q - 2 சரியாக பொருந்தாத இணையைத் தேர்ந்தெடு

ஆ) ரோடோஸ்பைரில்லம் - பூஞ்சைவேரி

Q - 3 கீழ்காண்பவைகளில் எவை நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட செல்சுவர் கொண்டிராத, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் நோய் தொற்றக்கூடிய, ஆக்சிஜன் இன்றி உயிர்வாழக்கூடிய உயிருள்ள சிறிய செல்களாகும்?

- அ) பேசில்லஸ்
- ஆ) சூடோமோனாஸ்
- இ) மைக்கோபிளாஸ்மா
- ஈ) நாஸ்டாக்

Q - 3 கீழ்காண்பவைகளில் எவை நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட செல்சுவர் கொண்டிராத, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் நோய் தொற்றக்கூடிய, ஆக்சிஜன் இன்றி உயிர்வாழக்கூடிய உயிருள்ள சிறிய செல்களாகும்?

இ) மைக்கோபிளாஸ்மா

- Q 4 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள (அமுதல் உ) கூற்றுகளை படித்து சரியான கூற்றுகளைக் கொண்ட பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அ) மாஸ்களும், லைக்கென்களும் வெற்றுப்பாறைகளில் கூட்டமாக வாழும் முதல் உயிரினங்களாகும். ஆ) செலாஜினெல்லா ஒத்தவித்துத்தன்மை கொண்ட ஒரு டெரிடோஃபைட் ஆகும்.
- இ) சைகஸ் பவழ வேர்கள் VAM கொண்டிருக்கின்றன.
- ஈ) பிரையோஃபைட்களில் முக்கிய தாவர உடலம் கேமீட்டக தாவரங்களாகும் அதேசமயம் டெரிடோஃபைட்களில் வித்தகதாவரங்களாகும்.
- உ) ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் ஆண் மற்றும் பெண் கேமீட்டக தாவரங்கள் வித்தகதாவரங்களில் அமைந்துள்ள வித்தகங்களில் காணப்படுகின்றன.
- அ) ஆ, இ மற்றும் உ
- ஆ) அ, இ மற்றும் ஈ
- இ) ஆ, இ மற்றும் ஈ
- ஈ) அ, ஈ மற்றும் உ

https://dailypractice.info/neet

- Q 4 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள (அமுதல் உ) கூற்றுகளை படித்து சரியான கூற்றுகளைக் கொண்ட பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அ) மாஸ்களும், லைக்கென்களும் வெற்றுப்பாறைகளில் கூட்டமாக வாழும் முதல் உயிரினங்களாகும். ஆ) செலாஜினெல்லா ஒத்தவித்துத்தன்மை கொண்ட ஒரு டெரிடோஃபைட் ஆகும்.
- இ) சைகஸ் பவழ வேர்கள் VAM கொண்டிருக்கின்றன.
- ஈ) பிரையோஃபைட்களில் முக்கிய தாவர உடலம் கேமீட்டக தாவரங்களாகும் அதேசமயம் டெரிடோஃபைட்களில் வித்தகதாவரங்களாகும்.
- உ) ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் ஆண் மற்றும் பெண் கேமீட்டக தாவரங்கள் வித்தகதாவரங்களில் அமைந்துள்ள வித்தகங்களில் காணப்படுகின்றன.

இ) ஆ, இ மற்றும் ஈ

## Q - 5 காலனி உடலம் கொண்ட பாசிக்கு எடுத்துக்காட்டு

- அ) குளோரெல்லா
- ஆ) வால்வாக்ஸ்
- இ) யுலோத்ரிக்ஸ்
- ஈ) ஸ்பைரோகைரா

Q - 5 காலனி உடலம் கொண்ட பாசிக்கு எடுத்துக்காட்டு

ஆ) வால்வாக்ஸ்

Q - 6 R.H. விட்டாக்கர் என்பவரல் முன்மொழியப்பட்ட ஐந்து உலக வகைப்பாடு இதன் அடிப்படையில் அமையவில்லை.

- அ) நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட உட்கரு கொண்டது அல்லது அற்றது
- ஆ) இனப்பெருக்க முறை
- இ) உணவூட்ட முறை
- ஈ) சிக்கலான உடல் அமைப்பு

Q - 6 R.H. விட்டாக்கர் என்பவரல் முன்மொழியப்பட்ட ஐந்து உலக வகைப்பாடு இதன் அடிப்படையில் அமையவில்லை.

ஆ) இனப்பெருக்க முறை

# Q - 7 பூஞ்சைவேரி இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகும்

- அ) பூஞ்சையின் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவை
- ஆ) கூட்டுவாழ்வு
- இ) உயிர் எதிர்ப்பொருள்
- ஈ) பகிர் வாழ்வு

Q - 7 பூஞ்சைவேரி இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகும்

இ) உயிர் எதிர்ப்பொருள்

# Q - 8 கீழ்காண்பவைகளில் எவற்றில் சுருண்ட RNA மற்றும் கேப்சோமியர்கள் காணப்படுகிறது?

- அ) போலியோ வைரஸ்
- ஆ) புகையிலை தேமல் வைரஸ்
- இ) தட்டம்மை வைரஸ்
- ஈ) ரெட்ரோ வைரஸ்

Q - 8 கீழ்காண்பவைகளில் எவற்றில் சுருண்ட RNA மற்றும் கேப்சோமியர்கள் காணப்படுகிறது?

ஆ) புகையிலை தேமல் வைரஸ்

#### Q - 9 வீராய்டுகள் எவ்வகையில் வைரஸ்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது?

- அ) DNA மூலக்கூறை சூழ்ந்து புரத உறை காணப்படுகிறது.
- ஆ) DNA மூலக்கூறை சூழ்ந்து புரத உறை காணப்படவில்லை.
- இ) RNA மூலக்கூறை சூழ்ந்து புரத உறை காணப்படுகிறது.
- ஈ) RNA மூலக்கூறை சூழ்ந்து புரத உறை காணப்படவில்லை .

- Q 9 வீராய்டுகள் எவ்வகையில் வைரஸ்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது?
- இ) RNA மூலக்கூறை சூழ்ந்து புரத உறை காணப்படுகிறது.

#### Q - 10 தவறான இணையைத் தேர்ந்தெடு

- அ) பைனஸ் இருபால் வகைத் தாவரம்
- ஆ) சைகஸ் ஒருபால் வகைத் தாவரம்
- இ) சால்வினியா மாற்றுவித்துத்தன்மை
- ஈ) ஈக்விசிட்டம் ஒத்த வித்துத்தன்மை

Q - 10 தவறான இணையைத் தேர்ந்தெடு

இ) சால்வினியா - மாற்றுவித்துத்தன்மை

## Q - 11 எக்டோகார்பஸ் மற்றும் ஃபியூகஸ் வாழ்க்கை வட்டம் முறையே

- அ) ஒற்றை மடிய உயிரி, இரட்டை மடிய உயிரி வாழ்க்கை விட்டம்
- ஆ) இரட்டை மடிய உயிரி, ஒற்றை இரட்டை மடிய உயிரி வாழ்க்கை விட்டம்
- இ) ஒற்றை இரட்டை மடிய உயிரி, இரட்டை மடிய உயிரி வாழ்க்கை விட்டம்
- ஈ) ஒற்றை இரட்டை மடிய உயிரி, ஒற்றை மடிய உயிரி வாழ்க்கை விட்டம்

Q - 11 எக்டோகார்பஸ் மற்றும் ஃபியூகஸ் வாழ்க்கை வட்டம் முறையே

இ) ஒற்றை இரட்டை மடிய உயிரி, இரட்டை மடிய உயிரி வாழ்க்கை விட்டம்

# Q - 12 கருமுட்டையில் குன்றல் பகுப்பு நடைபெறுவது இதன் சிறப்பாகும்

- அ) மார்கான்ஷியா
- ஆ) ஃபியூகஸ்
- இ) ஃபியூனேரியா
- ஈ) கிளாமிடோமோனஸ்

Q - 12 கருமுட்டையில் குன்றல் பகுப்பு நடைபெறுவது இதன் சிறப்பாகும்

ஈ) கிளாமிடோமோனஸ்

# Q - 13 கீழ்காண்பவைகளில் எது அவைகள் உற்பத்தி செய்யும் பொருளோடு சரியாக பொருந்தியுள்ளது?

- அ) அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டை : உயிர் எதிர்ப்பொருட்கள்
- ஆ) மெத்தனோபாக்டீரியம் : லாக்டிக் அமிலம்
- இ) பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் : அசிட்டிக் அமிலம்
- ஈ) சக்காரோமைசிஸ் செரிவிசியே : எத்தனால்

Q - 13 கீழ்காண்பவைகளில் எது அவைகள் உற்பத்தி செய்யும் பொருளோடு சரியாக பொருந்தியுள்ளது?

ஆ) மெத்தனோபாக்டீரியம் : லாக்டிக் அமிலம்

# Q - 14 கீழ்காண்பவைகளில் எந்த பகுதி பாக்டீரிய செல்லிற்கு ஒட்டும் பண்பை தருகிறது?

- அ) செல்சுவர்
- ஆ) உட்கரு சவ்வு
- இ) பிளாஸ்மா சவ்வு
- ஈ) கிளைக்கோகேலிக்ஸ்

Q - 14 கீழ்காண்பவைகளில் எந்த பகுதி பாக்டீரிய செல்லிற்கு ஒட்டும் பண்பை தருகிறது?

ஆ) உட்கரு சவ்வு

## Q - 15 கீழ்க்கண்டவற்றில் எது வீராய்டுகள் பற்றிய தவறான கூற்றாகும்?

- அ) புரத உறை இல்லாமல் இருத்தல்
- ஆ) வைரஸ்களை விட சிறியவை
- இ) தோற்று நோயை உண்டாக்கக்கூடியவை
- ஈ) இவற்றின் RNA அதிக மூலக்கூறு எடையைக் கொண்டது.

Q - 15 கீழ்க்கண்டவற்றில் எது வீராய்டுகள் பற்றிய தவறான கூற்றாகும்?

ஈ) இவற்றின் RNA அதிக மூலக்கூறு எடையைக் கொண்டது.

Q - 16 பிரையோஃபைட்கள் மற்றும் டெரிடோஃபைட்களில் ஆண் கேமீட்டுகள் இடம்பெயர தேவையானது

- அ) காற்று
- ஆ) பூச்சிகள்
- இ) பறவைகள்
- ஈ) நீர்

Q - 16 பிரையோஃபைட்கள் மற்றும் டெரிடோஃபைட்களில் ஆண் கேமீட்டுகள் இடம்பெயர தேவையானது

ஈ) நீர்

Q - 17 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் எத்தனை உயிரிகள் தற்சார்பு ஊட்டம் உடையவை? லாக்டோபே சில்லஸ், நாஸ்டாக், கேரா, நைட்ரசோமோனாஸ், நைட்ரோபாக்டர், ஸ்டெப்ரோமைசஸ், சக்காரோமைசஸ், டிரிப்பனோசோமா, போர்ஃபைரா, உல்ஃபியா

- அ) நான்கு
- ஆ) ஐந்து
- இ) ஆறு
- ஈ) மூன்று

Q - 17 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் எத்தனை உயிரிகள் தற்சார்பு ஊட்டம் உடையவை? லாக்டோபே சில்லஸ், நாஸ்டாக், கேரா, நைட்ரசோமோனாஸ், நைட்ரோபாக்டர், ஸ்டெப்ரோமைசஸ், சக்காரோமைசஸ், டிரிப்பனோசோமா, போர்ஃபைரா, உல்ஃபியா

இ) ஆறு

Q - 18 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் வெற்றுப் பாறைகளின் மீது காணப்படும் முன்னோடி உயிரினங்கள் எவை ?

- அ) லைக்கென்கள்
- ஆ) ஈரல் தாவரங்கள்
- இ) மாஸ்கள்
- ஈ) பச்சை பாசிகள்

Q - 18 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் வெற்றுப் பாறைகளின் மீது காணப்படும் முன்னோடி உயிரினங்கள் எவை ?

அ) லைக்கென்கள்

Q - 19 இருபால் வகை கேரா தாவரம் கீழ்க்கண்டவாறு இருப்பிடத்தை காட்டுகிறது.

அ) ஒரே தாவரத்தில் மகரந்ததாள், சூலகமும் காணப்படுதல்.

ஆ) ஒரே தாவரத்தில் மேற்பகுதியில் ஆந்தரீடியமும், கீழ்பகுதியில் ஊகோணியமும் காணப்படுதல்.

இ) ஒரே தாவரத்தில் கீழ்பகுதியில் ஊகோணியமும் மேற்பகுதியில் ஆந்தரீடியமும் காணப்படுதல்.

ஈ) ஒரே தாவரத்தில் ஆந்தரிடிய தாங்கியும், ஆர்க்கிகோணிய தாங்கியும் காணப்படுதல்.

Q - 19 இருபால் வகை கேரா தாவரம் கீழ்க்கண்டவாறு இருப்பிடத்தை காட்டுகிறது.

ஆ) ஒரே தாவரத்தில் மேற்பகுதியில் ஆந்தரீடியமும், கீழ்பகுதியில் ஊகோணியமும் காணப்படுதல்.

- Q 20 அமுதல் உவரை கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகள படித்து பின்னர் கீழே கேட்க்கப்பட்ட வினாவிற்கு விடையளிக்கவும். அ) ஈக்விசிட்டம் பெண்கேமீட்டகதாவரமானது பெற்றோர் வித்தகத்தாவரத்தில் நிலைத்திருக்கும்.
- ஆ) ஜிங்கோவின் ஆண்கே மீட்டக தாவரம் தற்சார்பு அற்றது.
- இ) ஜிங்கோ, பாலிடிரைக்கத்தின் வித்தகத் தாவரத்தைவிட ரிக்சியாவின் வித்தகத் தாவரம் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
- ஈ) வால்வாக்ஸின் பாலினப்பெருக்கம் ஒத்தகேமீட்களின் இணைவு வகையைச் சார்ந்தது.
- உ) ஸ்லைம் மோல்டுகளின் வித்துகள் செல் சுவரற்றவை. மேலே கூறப்பட்டுள்ளவைகளில் எத்தனை கூற்றுகள் சரியானவை ?
- அ) இரண்டு
- ஆ) மூன்று
- இ) நான்கு
- ஈ) ஒன்று

https://dailypractice.info/neet

- Q 20 அமுதல் உவரை கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகள படித்து பின்னர் கீழே கேட்க்கப்பட்ட வினாவிற்கு விடையளிக்கவும். அ) ஈக்விசிட்டம் பெண்கேமீட்டகதாவரமானது பெற்றோர் வித்தகத்தாவரத்தில் நிலைத்திருக்கும்.
- ஆ) ஜிங்கோவின் ஆண்கே மீட்டக தாவரம் தற்சார்பு அற்றது.
- இ) ஜிங்கோ, பாலிடிரைக்கத்தின் வித்தகத் தாவரத்தைவிட ரிக்சியாவின் வித்தகத் தாவரம் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
- ஈ) வால்வாக்ஸின் பாலினப்பெருக்கம் ஒத்தகேமீட்களின் இணைவு வகையைச் சார்ந்தது.
- உ) ஸ்லைம் மோல்டுகளின் வித்துகள் செல் சுவரற்றவை. மேலே கூறப்பட்டுள்ளவைகளில் எத்தனை கூற்றுகள் சரியானவை ?

ஆ) மூன்று

## Q - 21 பெரும்பாலான பூஞ்சைகளின் செல் சுவரில் காணக்கூடிய முக்கியமானதொரு பகுதிப்பொருள்

- அ) கைட்டின்
- ஆ) பெப்டிடோகிளைக்கான்
- இ) செல்லுலோஸ்
- ஈ) ஹெமிசெல்லுலோஸ்

Q - 21 பெரும்பாலான பூஞ்சைகளின் செல் சுவரில் காணக்கூடிய முக்கியமானதொரு பகுதிப்பொருள்

அ) கைட்டின்

### Q - 22 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் தவறானது எது?

- அ) சயனோ பாக்டீயங்கள் நீலப் பசும்பாசிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
- ஆ) தங்க நிறப்பாசிகள் டெஸ்மிடுகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.
- இ) யூபாக்டீயாக்கள் போலியான பாக்டீரியங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.
- ஈ) பைக்கோமைசீட்ஸ் பாசிப் பூஞ்சைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

Q - 22 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் தவறானது எது?

இ) யூபாக்டீயாக்கள் போலியான பாக்டீரியங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

## Q - 23 பின்வரும் எந்த இணைகளின் மூன்றிலும் கசையிழைகளைக் கொண்ட ஆண்கே மீட்கள் காணப்படுகின்றன?

- அ) ரிக்சியா, டிரையாப்டெ ரிஸ், சைகஸ்
- ஆ) ஆந்தோசெராஸ், ஃபியூனேரியா, ஸ்பைரோகைரா
- இ) சைக்னிமா, சாப்ரோலெகினியா, ஹைட்ரில்லா
- ஈ) ஃபியூகஸ், மார் சீலியா, கலோட்ராபிஸ்

Q - 23 பின்வரும் எந்த இணைகளின் மூன்றிலும் கசையிழைகளைக் கொண்ட ஆண்கே மீட்கள் காணப்படுகின்றன?

அ) ரிக்சியா, டிரையாப்டெ ரிஸ், சைகஸ்

# Q - 24 வெளிப்புற ஃபுளோயம்சூழ் சைபனோஸ்டீல் இதில் காணப்படுகிறது.

- அ) அடியாண்டம் மற்றும் குக்கர் பிட்டேசி
- ஆ) ஆஸ்முண்டா மற்றும் ஈக்விசிட்டம்
- இ) மார்சிலியா மற்றும் பாட்டிரிக்கியம்
- ஈ) டிக்சோனியா மற்றும் மங்கையர் கூந்தல் பெரணி

Q - 24 வெளிப்புற ஃபுளோயம்சூழ் சைபனோஸ்டீல் இதில் காணப்படுகிறது.

ஆ) ஆஸ்முண்டா மற்றும் ஈக்விசிட்டம்

Q - 25 மெலோய்டோகைனி இன்கோஜினிடாவால் தாக்கப்படும் புகையிலைத் தாவரத்தின் பகுதி எது?

- அ) மலர்
- ஆ) இலை
- இ) தண்டு
- ஈ) வேர்

Q - 25 மெலோய்டோகைனி இன்கோஜினிடாவால் தாக்கப்படும் புகையிலைத் தாவரத்தின் பகுதி எது?

ஈ) வேர்

### Q - 26 சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

- அ) ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் ஒத்தவித்துத்தன்மை மற்றும் மாற்று வித்துத்தன்மை கொண்டவை .
- ஆ) சால்வினியா, ஜிங்கோ மற்றும் பைனஸ் அனைத்தும் ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்
- இ) செக்கோயா உயரமான மரங்களில் ஒன்று.
- ஈ) ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் இலைகள் அதீத சூழ்நிலைக்கான தகவமைப்பை பெற்றிருக்கவில்லை.

Q - 26 சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

இ) செக்கோயா உயரமான மரங்களில் ஒன்று.

# Q - 27 பூக்கும் தாவரங்களில் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் விதை உருவாகும் நிகழ்வு

- அ) வித்து உருவாக்கம்
- ஆ) மொட்டுவிடுதல்
- இ) உடல இனக்கலப்பு
- ஈ) அப்போமிக்ஸிஸ்

Q - 27 பூக்கும் தாவரங்களில் கருவுறுதல் நடைபெறாமல் விதை உருவாகும் நிகழ்வு

ஈ) அப்போமிக்ஸிஸ்

Q - 28 கிரைசோஃபைட்கள், யூக்ளினாய்டுகள், டைனோஃபிளாச ஜெல்லேட்டுகள் மற்றும் ஸ்லைம் மோல்டுகள் இவை அனைத்தும் உள்ளடங்கிய பெரும்பிரிவு

- அ) விலங்குகள்
- ஆ) மொனிரா
- இ) புரோட்டிஸ்டா
- ஈ) பூஞ்சைகள்

Q - 28 கிரைசோஃபைட்கள், யூக்ளினாய்டுகள், டைனோஃபிளாச ஜெல்லேட்டுகள் மற்றும் ஸ்லைம் மோல்டுகள் இவை அனைத்தும் உள்ளடங்கிய பெரும்பிரிவு

ஆ) மொனிரா

Q - 29 அசைபோடும் விலங்குகளின் சாணத்திலிருந்து உயிரிவெளி உற்பத்தி செய்யப் பயன்படும் முன்னோடி தொல்லுட்கரு உயிரிகள்

- அ) ஹாலோஃபைல்ஸ்
- ஆ) தெர்மோஅசிடோஃபைல்ஸ்
- இ) மெத்தனோஜென்ஸ்
- ஈ) யூபாக்டீரியா

Q - 29 அசைபோடும் விலங்குகளின் சாணத்திலிருந்து உயிரிவெளி உற்பத்தி செய்யப் பயன்படும் முன்னோடி தொல்லுட்கரு உயிரிகள்

இ) மெத்தனோஜென்ஸ்

## Q - 30 . இலைகள், முட்களாக மாறுபாடடைந்தவை

- அ) இலவம் பஞ்சு
- ஆ) ஒபன்ஷியா
- இ) பட்டாணி
- ஈ) வெங்காயம்

Q - 30 . இலைகள், முட்களாக மாறுபாடடைந்தவை

ஆ) ஒபன்ஷியா

## Q - 31 படகு அல்லி என்ற சிறப்புப் பண்பு காணப்படும் மலர்

- அ) தக்காளி
- ஆ) துலிப்
- இ) இண்டிகோஃபெரா
- ஈ) அலோ

Q - 31 படகு அல்லி என்ற சிறப்புப் பண்பு காணப்படும் மலர்

இ) இண்டிகோஃபெரா

### Q - 32 பெரிகைனஸ் (சூலகச்சூழ் மலர்) மலர்கள் இதில் காணப்படுகிறது

- அ) ரோஜா
- ஆ) கொய்யா
- இ) வெள்ளரி
- ஈ) சீன ரோஜா

Q - 32 பெரிகைனஸ் (சூலகச்சூழ் மலர்) மலர்கள் இதில் காணப்படுகிறது

அ) ரோஜா

### Q - 33 கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எந்த ஒரு கூற்று சரியானது

- அ) புற்களின் விதைகளில் கருவூண் திசுக்கள் காணப்படுவதில்லை .
- ஆ) மா ஒரு கருவுறாக் கனியாகும்.
- இ) மக்காச்சோள விதையில் புரதத்தாலான அலுரான் அடுக்கு காணப்படுகிறது.
- ஈ) மலட்டு சூலகம், மலட்டு மகரந்தத்தாள்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

Q - 33 கொடுக்கப்பட்டவைகளில் எந்த ஒரு கூற்று சரியானது

இ) மக்காச்சோள விதையில் புரதத்தாலான அலுரான் அடுக்கு காணப்படுகிறது.

### Q - 34 உண்ணும் தரைக்கீழ்த்தண்டிற்கு உதாரணம்

- அ) கேரட்
- ஆ) நிலக்கடலை
- இ) சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு
- ஈ) உருளைக் கிழங்கு

Q - 34 உண்ணும் தரைக்கீழ்த்தண்டிற்கு உதாரணம்

ஈ) உருளைக் கிழங்கு

Q - 35 சூல் ஒட்டுத்திசு மற்றும் கனித்தோல் ஆகிய இரண்டும் உண்ணும் பகுதியாக இருப்பது

- அ) ஆப்பிள்
- ஆ) வாழை
- இ) தக்காளி
- ஈ) உருளைக்கிழங்கு

Q - 35 சூல் ஒட்டுத்திசு மற்றும் கனித்தோல் ஆகிய இரண்டும் உண்ணும் பகுதியாக இருப்பது

இ) தக்காளி

Q - 36 அல்லிவட்டம் அல்லது புல்லிவட்டம் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று தழுவி ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் அமையாமல் இருக்கும் நிலைக்கு

- அ) வெக்ஸில்லரி
- ஆ) அடுக்கு இதழமைவு
- இ) திருகு இதழமைவு
- ஈ) தொடு இதழமைவு

Q - 36 அல்லிவட்டம் அல்லது புல்லிவட்டம் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று தழுவி ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் அமையாமல் இருக்கும் நிலைக்கு

ஆ) அடுக்கு இதழமைவு

## Q - 37 திரள்கனிகள் எதிலிருந்து உருவாகிறது.

- அ) இணைந்த பல சூலிலை சூலகம்
- ஆ) இணையாத பல சூலிலை சூலகம்
- இ) முழு மஞ்சரி
- ஈ) பல சூலிலைகள் கொண்ட மேல்மட்ட சூற்பை

Q - 37 திரள்கனிகள் எதிலிருந்து உருவாகிறது.

ஆ) இணையாத பல சூலிலை சூலகம்

#### Q - 38 கருப்புரதமற்ற திசுக்கள் விதைகள் இதில் உருவாகிறது

- அ) மக்காச்சோளம்
- ஆ) ஆமணக்கு
- இ) கோதுமை
- ஈ) பட்டாணி

Q - 38 கருப்புரதமற்ற திசுக்கள் விதைகள் இதில் உருவாகிறது

ஈ) பட்டாணி

#### Q - 39 விதையுறை மென்மையாகவோ, சவ்வுபோன்றோ கிடையாது

- அ) தென்னை
- ஆ) நிலக்கடலை
- இ) பருப்பு
- ஈ) மக்காச்சோளம்

Q - 39 விதையுறை மென்மையாகவோ, சவ்வுபோன்றோ கிடையாது

அ) தென்னை

#### Q - 40 சீன ரோஜா மலரானது

- அ) ஆரச்சீருடையது, கீழ்மட்ட சூற்பை , தொடு இதழ் அமைவு உடையது.
- ஆ) ஆரச்சீருடையது, கீழ்மட்ட சூற்பை , தொடு இதழ் அமைவு உடையது.
- இ) இருபக்கச் சீருடையது, கீழ்மட்ட சூற்பை திருகு இதழமைவு உடையது.
- ஈ) ஆரச் சீருடையது, மேல்மட்ட சூற்பை , திருகு இதழமைவு உடையது.

Q - 40 சீன ரோஜா மலரானது

ஈ) ஆரச் சீருடையது, மேல்மட்ட சூற்பை , திருகு இதழமைவு உடையது.

#### Q - 41 தக்காளி மற்றும் எலுமிச்சையில் சூல்ஒட்டுமுறை

- அ) விளிம்பு சூல் ஒட்டுமுறை
- ஆ) அச்சு சூல் ஒட்டுமுறை
- இ) சுவர் சூல் ஒட்டுமுறை
- ஈ) தனித்த மைய சூல் ஒட்டுமுறை

Q - 41 தக்காளி மற்றும் எலுமிச்சையில் சூல்ஒட்டுமுறை

ஆ) அச்சு சூல் ஒட்டுமுறை

## Q - 42 வெக்ஸில்லரி இதழமைவு எக்குடும்பத்தின் சிறப்பமைவு

- அ) சொலானேசி
- ஆ) பிராஸ்ஸிக்கேசி
- இ) ஃபேபேசி
- ஈ) ஆஸ்டரேசி

Q - 42 வெக்ஸில்லரி இதழமைவு எக்குடும்பத்தின் சிறப்பமைவு

இ) ஃபேபேசி

## Q - 43 இலைத்தொழில்காம்பு (Phyllode) இதில் காணப்படுகிறது.

- அ) ஆஸ்திரேலிய அக்கேசியா
- ஆ) ஒபன்ஷியா
- இ) ஆஸ்பரகஸ்
- ஈ) யூபோர்ஃபியா

Q - 43 இலைத்தொழில்காம்பு (Phyllode) இதில் காணப்படுகிறது.

அ) ஆஸ்திரேலிய அக்கேசியா

Q - 44 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் எத்தனை தாவரம் கூட்டுக்கனிகளை மஞ்சரியிலிருந்து உருவாக்குகிறது? வால்நட், கசகசா, முள்ளங்கி, அத்தி, அன்னாசி, ஆப்பிள், தக்காளி, மல்பெரி

- அ) இரண்டு
- ஆ) மூன்று
- இ) நான்கு
- ஈ) ஐந்து

Q - 44 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் எத்தனை தாவரம் கூட்டுக்கனிகளை மஞ்சரியிலிருந்து உருவாக்குகிறது? வால்நட், கசகசா, முள்ளங்கி, அத்தி, அன்னாசி, ஆப்பிள், தக்காளி, மல்பெரி

ஆ) மூன்று

## Q - 45 சைமோஸ் மஞ்சரி இதில் காணப்படுகிறது.

- அ) ட்ரைஃபோலியம்
- ஆ) பிராஸ்ஸிக்கா
- இ) சொலானம்
- ஈ) செஸ்பேனியா

Q - 45 சைமோஸ் மஞ்சரி இதில் காணப்படுகிறது.

இ) சொலானம்

Q - 46 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எந்த ஒரு உயிரினத்தில் மூன்று பண்புகளும் பொருத்தமாக உள்ளது.

அ) பட்டாணி : C3 வழித்தடம், கருவூண்திசு பெற்ற விதை, வெக்ஸில்லரி இதழமைவு

ஆ) தக்காளி : திருகு இதழமைவு, அச்சு சூல் ஒட்டுமுறை, பெர்ரி

இ) வெங்காயம் : குமிழம், அடுக்கு இதழமைவு, அச்சு சூல் ஒட்டுமுறை

ஈ) மக்காச்சோளம் : C3 வழித்தடம், மூடிய வாஸ்குலக் கற்றை, ஸ்குட்டெல்லம்

Q - 46 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எந்த ஒரு உயிரினத்தில் மூன்று பண்புகளும் பொருத்தமாக உள்ளது.

ஈ) மக்காச்சோளம் : C3 வழித்தடம், மூடிய வாஸ்குலக் கற்றை, ஸ்குட்டெல்லம்

Q - 47 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எத்தனை தாவரங்களில் விளிம்பு சூல் ஒட்டுமுறை காணப்படுகிறது? கடுகு, பருப்பு, டூளிப், ஆஸ்பாரகஸ், ஆர்கார், சணப்பை, மிளகாய், கால்சிசின், வெங்காயம், பச்சைப்பயறு, பட்டாணி, புகையிலை, லுப்பின்

- அ) நான்கு
- ஆ) ஐந்து
- இ) ஆறு
- ஈ) மூன்று

Q - 47 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எத்தனை தாவரங்களில் விளிம்பு சூல் ஒட்டுமுறை காணப்படுகிறது? கடுகு, பருப்பு, டூளிப், ஆஸ்பாரகஸ், ஆர்கார், சணப்பை, மிளகாய், கால்சிசின், வெங்காயம், பச்சைப்பயறு, பட்டாணி, புகையிலை, லுப்பின்

இ) ஆறு

#### Q - 48 உருளைக்கிழங்கில் காணப்படும் கண்கள்

- அ) கக்க மொட்டுகள்
- ஆ) வேர் மொட்டுகள்
- இ) மலர் மொட்டுகள்
- ஈ) தண்டு மொட்டுகள்

Q - 48 உருளைக்கிழங்கில் காணப்படும் கண்கள்

அ) கக்க மொட்டுகள்

#### Q - 49 கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எந்த ஒரு கூற்று சரியானது

- அ) டூலிப் மலர்கள் தண்டின் உருமாற்றம்
- ஆ) தக்காளி ஒரு வகை வெடியாக்கனி
- இ) ஆர்க்கிட் விதைகள் அதிக எண்ணெய் கொண்டுள்ள கருவூண் திசு பெற்றுள்ளது
- ஈ) ப்ரிம் ரோஜாவில்(Primrose) அடிசூல் ஒட்டு முறை காணப்படுகிறது.

Q - 49 கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எந்த ஒரு கூற்று சரியானது

ஈ) ப்ரிம் ரோஜாவில்(Primrose) அடிசூல் ஒட்டு முறை காணப்படுகிறது.

# Q - 50 ட்ரூப் இதில் உருவாகிறது

- அ) தக்காளி
- ஆ) மா
- இ) கோதுமை
- ஈ) பட்டாணி

Q - 50 ட்ரூப் இதில் உருவாகிறது

ஆ) மா

## Q - 51 மின்னனு நுண்ணோக்கியை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

- அ) ஜேன்சென்
- ஆ) எடிசன்
- இ) நால் மற்றும் ரஸ்கா
- ஈ) லேண்ட்ஸ்டெய்னர்

Q - 51 மின்னனு நுண்ணோக்கியை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

இ) நால் மற்றும் ரஸ்கா

# Q - 52 செல்லுக்குள் பொருட்களையும், செய்திகளையும் கடத்தும் செயலில் எந்த குறிப்பிட்ட புரதம் ஈடுபடுகிறது?

- அ) சவ்வு ஏற்பிகள்
- ஆ) கடத்தும் புரதங்கள்
- இ) ஒருங்கிணைந்த புரதங்கள்
- ஈ) மேற்கூறியவற்றில் ஏதுவுமில்லை

Q - 52 செல்லுக்குள் பொருட்களையும், செய்திகளையும் கடத்தும் செயலில் எந்த குறிப்பிட்ட புரதம் ஈடுபடுகிறது?

ஆ) கடத்தும் புரதங்கள்

# Q - 53 ஓம்னிஸ் செல்லுலா–ஈ–செல்லுலா (Omnis – Cellula – e – Cellula) என்ற கூற்றை தந்தவர்:-

- அ) விர்ச்சௌ
- ஆ) ஹூக்
- இ) லூவன் ஹுக்
- ஈ) இராபரட் பிரௌன்

Q - 53 ஓம்னிஸ் செல்லுலா–ஈ–செல்லுலா (Omnis – Cellula – e – Cellula) என்ற கூற்றை தந்தவர்:-

அ) விர்ச்சௌ

Q - 54 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது உறுதியைத் தருவதுடன், புரதச் சேர்க்கையிலும் மற்றும் நோதிகளை கடத்துவதிலும் ஈடுபடுகிறது?

- அ) செல்சவ்வு
- ஆ) மைட்டோகாண்டிரியா
- இ) டிக்டியோசோம்கள்
- ஈ) எண்டோபிளாச வலை

Q - 54 கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது உறுதியைத் தருவதுடன், புரதச் சேர்க்கையிலும் மற்றும் நோதிகளை கடத்துவதிலும் ஈடுபடுகிறது?

ஈ) எண்டோபிளாச வலை

Q - 55 யூகேரியோட்டிக் செல்களில் உள்ள ஜீன்கள் சைட்டோபிளாசத்தில் இங்கு காணப்படுகிறது.

அ) மைட்டோகாண்டிரியா மற்றும் பாரம்பரிய வழிவந்த கருமுட்டையின் சைட்டோபிளாசம்.

ஆ) லைசோசோம்கள் மற்றும் பெராக்ஸிசோம்கள்

இ) கோல்கை உடலங்கள் மற்றும் வழவழப்பான எண்டோபிளாச வலை

ஈ) ஆண் கேமீட்களின் பாரம்பரியவழி கணிகங்கள்

Q - 55 யூகேரியோட்டிக் செல்களில் உள்ள ஜீன்கள் சைட்டோபிளாசத்தில் இங்கு காணப்படுகிறது.

அ) மைட்டோகாண்டிரியா மற்றும் பாரம்பரிய வழிவந்த கருமுட்டையின் சைட்டோபிளாசம்.

# Q - 56 கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் கிளையாக்சிசோமில் காணப்படுகிறது என்று நீ கருதுகிறாய்?

- அ) கோதுமையின் கருவூண்திசு
- ஆ) ஆமணக்கின் கருவூண்திசு
- இ) இலையின் பாலிசேட் செல்கள்
- ஈ) வேர்த்தூவிகள்

Q - 56 கீழ்க்கண்டவற்றில் எதில் கிளையாக்சிசோமில் காணப்படுகிறது என்று நீ கருதுகிறாய்?

ஆ) ஆமணக்கின் கருவுண்திசு

## Q - 57 குவான்டோசோம் இவற்றில் காணப்படுகிறது.

- அ) மைட்டோகாண்டிரியா
- ஆ) பசுங்கணிகம்
- இ) கோல்கை உடலங்கள்
- ஈ) எண்டோபிளாச வலை

Q - 57 குவான்டோசோம் இவற்றில் காணப்படுகிறது.

ஆ) பசுங்கணிகம்

Q - 58 சைட்டோகுரோம் ஆக்சிடேஸ் என்ற நொதி மைட்டோகாண்டிரியாவில் காணப்படும் இடம்

- அ) மைட்டோகாண்டிரியாவின் வெளிச்சவ்வு
- ஆ) மைட்டோகாண்டிரியாவின் உட்சவ்வு
- இ) ஸ்ட்ரோமா
- ஈ) கிரானம்

Q - 58 சைட்டோகுரோம் ஆக்சிடேஸ் என்ற நொதி மைட்டோகாண்டிரியாவில் காணப்படும் இடம்

ஆ) மைட்டோகாண்டிரியாவின் உட்சவ்வு

# Q - 59 சுரக்கும் செல்கள் அதிகளவில் காணக்கூடிய செல் நுண்ணுறுப்பு எது?

- அ) மைட்டோகாண்டிரியா
- ஆ) பசுங்கணிகம்
- இ) உட்கரு
- ஈ) டிக்டியோசோம்கள்

Q - 59 சுரக்கும் செல்கள் அதிகளவில் காணக்கூடிய செல் நுண்ணுறுப்பு எது?

ஈ) டிக்டியோசோம்கள்

## Q - 60 லிப்பிடுகள் அதிகளவில் உற்பத்தியாகும் இடம்?

- அ) சொரசொரப்பான எண்டோபிளாச வலை
- ஆ) வழவழப்பான எண்டோபிளாச வலை
- இ) சென்ட்ரியோல்
- ஈ) லைசோசோம்

Q - 60 லிப்பிடுகள் அதிகளவில் உற்பத்தியாகும் இடம்?

அ) சொரசொரப்பான எண்டோபிளாச வலை

#### Q - 61 கோல்கை உடலங்கள் இதில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.

அ) புரதங்கள் மொழியாக்கத்திற்குப் பின்பு மாறுபாடு அடைதல் மற்றும் லிப்பிடுகளின் கிளைக்கோஸிடேசன்

ஆ) புரதங்களை மொழிபெயர்த்தல்

இ) புரதங்களை படியெடுத்தல்

ஈ) லிப்பிடு உற்பத்தி

Q - 61 கோல்கை உடலங்கள் இதில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன.

ஆ) புரதங்களை மொழிபெயர்த்தல்

# Q - 62 செல்லின் பலவகையான பணிகளை மேற்கொள்ளும் பரப்பாக விளங்குவது

- அ) உட்கரு
- ஆ) மைட்டோகாண்டிரியா
- இ) சைட்டோபிளாசம்
- ஈ) பசுங்கணிகம்

Q - 62 செல்லின் பலவகையான பணிகளை மேற்கொள்ளும் பரப்பாக விளங்குவது

இ) சைட்டோபிளாசம்

#### Q - 63 பசுங்கணிகத்தில் தைலகாய்டுகள் அமைந்துள்ள விதம்

- அ) முறையான வளையங்கள்
- ஆ) நீண்ட வரிசை
- இ) மூலைவிட்ட திசையில்
- ஈ) அடுக்கப்பட்ட தட்டுகள் போன்று

Q - 63 பசுங்கணிகத்தில் தைலகாய்டுகள் அமைந்துள்ள விதம்

ஈ) அடுக்கப்பட்ட தட்டுகள் போன்று

Q - 64 கீழ்க்காணும் எதன் வரிசைகள் பைலோஜெனி பற்றி அறிய உதவுகிறது?

- அ) mRNA
- ஆ) rRNA
- (a) tRNA
- ¬¬) HnRNA

Q - 64 கீழ்க்காணும் எதன் வரிசைகள் பைலோஜெனி பற்றி அறிய உதவுகிறது?

ஆ) rRNA

Q - 65 இரண்டு அருகருகே அமைந்த செல்களுக்கு இடையே உள்ள எந்த அமைப்பு பயனுள்ள கடத்தலின் வழியாக அமைகிறது?

- அ) பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா
- ஆ) மையத்தட்டு
- இ) இரண்டாம் நிலைச்சுவர் அடுக்கு
- ஈ) முதன்மைச்சுவர் அடுக்கு

Q - 65 இரண்டு அருகருகே அமைந்த செல்களுக்கு இடையே உள்ள எந்த அமைப்பு பயனுள்ள கடத்தலின் வழியாக அமைகிறது?

அ) பிளாஸ்மோடெஸ்மேட்டா

# Q - 66 ஆற்றல்சார் கடத்தலில் கடத்தும் புரதங்கள் ஆற்றலை ATP வடிவில் இதற்காக பயன்படுத்துகின்றன.

- அ) கடத்தப்படும் மூலக்கூறுகள் செல் சுவரின் செறிவுசரிவிற்கு எதிராக உள்ளது.
- ஆ) கடத்தப்படும் மூலக்கூறுகள் செல் சவ்வின் செறிவுசரிவோடு சேர்ந்துள்ளது.
- இ) கடத்தப்படும் மூலக்கூறுகள் செல் சவ்வின் செறிவுசரிவிற்கு எதிராக உள்ளது.
- ஈ) கடத்தப்படும் மூலக்கூறுகள் செல் சுவரின் செறிவுசரிவோடு சேர்ந்துள்ளது.

Q - 66 ஆற்றல்சார் கடத்தலில் கடத்தும் புரதங்கள் ஆற்றலை ATP வடிவில் இதற்காக பயன்படுத்துகின்றன.

இ) கடத்தப்படும் மூலக்கூறுகள் செல் சவ்வின் செறிவுசரிவிற்கு எதிராக உள்ளது.

Q - 67 புதிதாக உருவாக்கப்படும் புரதங்களை மாற்றி அமைத்து அதை தகுந்த இடத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கும் முக்கிய உள்ளுறுப்பு.

- அ) மைட்டோகாண்டிரியா
- ஆ) கிளையாக்ஸிசோம்கள்
- இ) ஸ்பீரோசோம்கள்
- ஈ) எண்டோபிளாச வலை

Q - 67 புதிதாக உருவாக்கப்படும் புரதங்களை மாற்றி அமைத்து அதை தகுந்த இடத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கும் முக்கிய உள்ளுறுப்பு.

ஈ) எண்டோபிளாச வலை

## Q - 68 ஆல்காவின் செல் சுவர் இவற்றால் ஆனது

- அ) செல்லுலோஸ், கேலக்டான்ஸ் மற்றும் மன்னான்ஸ்
- ஆ) செல்லுலோஸ், கைட்டின் மற்றும் குளுக்கான்
- இ) செல்லுலோஸ், மன்னான் மற்றும் பெப்டிடோகிளைக்கான்
- ஈ) முராமிக் அமிலம் மற்றும் கேலக்டன்ஸ்

Q - 68 ஆல்காவின் செல் சுவர் இவற்றால் ஆனது

ஆ) செல்லுலோஸ், கைட்டின் மற்றும் குளுக்கான்

## Q - 69 டைலோசஸ்களில் பலூன் போன்ற அமைப்பு

- அ) சைலக் குழாய்களின் செல் உள் வெளிப்பகுதியிலிருந்து தோன்றுகிறது.
- ஆ) சாற்றுக் கட்டையின் முக்கிய பண்பாகும்
- இ) சைலக்குழாய்களின் உள்வெளிப்பகுதி அருகிலுள்ள பாரங்கைமா செல்களிலிருந்து தோன்றும் உள் வளரிகள்
- ஈ) சைலக் குழாய்களின் சாறேற்றத்துடன் தொடர்புடையது.

Q - 69 டைலோசஸ்களில் பலூன் போன்ற அமைப்பு

இ) சைலக்குழாய்களின் உள்வெளிப்பகுதி அருகிலுள்ள பாரங்கைமா செல்களிலிருந்து தோன்றும் உள் வளரிகள்

## Q - 70 புறணி இதன் நடுப்பகுதியில் காணப்படுகிறது.

- அ) புறத்தோல் மற்றும் ஸ்டீல்
- ஆ) பெரிசைகிள் மற்றும் அகத்தோல்
- இ) அகத்தோல் மற்றும் பித்
- ஈ) அகத்தோல் மற்றும் வாஸ்குலத்தொகுப்பு

Q - 70 புறணி இதன் நடுப்பகுதியில் காணப்படுகிறது.

அ) புறத்தோல் மற்றும் ஸ்டீல்

Q - 71 கீழ்கண்ட I முதல் IV வரை உள்ள விடைகளை படித்து இருவிதையிலை கட்டையின் கூறுகளை வெளிப்பகுதியிலிருந்து உள்நோக்கி சரியான வரிசையில் கண்டறிக I) இரண்டாம் நிலை புறணி II) கட்டை III) இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயம் IV) ஃபெல்லம்

- அ) III, IV, II மற்றும் I
- ஆ) I ,II , IV, மற்றும் III
- இ) IV, I, III மற்றும் II
- ஈ) IV ,III ,I மற்றும் II

Q - 71 கீழ்கண்ட I முதல் IV வரை உள்ள விடைகளை படித்து இருவிதையிலை கட்டையின் கூறுகளை வெளிப்பகுதியிலிருந்து உள்நோக்கி சரியான வரிசையில் கண்டறிக I) இரண்டாம் நிலை புறணி II) கட்டை III) இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயம் IV) ஃபெல்லம்

இ) IV, I, III மற்றும் II

Q - 72 உங்களிடன் முதிர்ந்த இருவிதையிலை தண்டு மற்றும் இருவிதையிலை வேர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்கண்ட எந்த உள்ளமைப்பியல் பண்பின் அடிப்படையில் அவற்றை வேறுபடுத்தி அறிவாய்?

- அ) இரண்டாம் நிலை சைலம்
- ஆ) இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயம்
- இ) புரோட்டோ சைலம்
- ஈ) புறணி செல்கள்

Q - 72 உங்களிடன் முதிர்ந்த இருவிதையிலை தண்டு மற்றும் இருவிதையிலை வேர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கீழ்கண்ட எந்த உள்ளமைப்பியல் பண்பின் அடிப்படையில் அவற்றை வேறுபடுத்தி அறிவாய்?

இ) புரோட்டோ சைலம்

## Q - 73 வைரக்கட்டையிலிருந்து சாற்றுக்கட்டை எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

- அ) கதிர் மற்றும் நார்கள் காணப்படுகிறது
- ஆ) சைலக்குழாய்கள் மற்றும் பாரங்கைமா காணப்படுவதில்லை
- இ) இறந்த மற்றும் கடத்தும் கூறுகள் அற்றது.
- ஈ) பூச்சிகள் மற்றும் நோய் கிருமிகளால் பாதிக்கபடுபவை

Q - 73 வைரக்கட்டையிலிருந்து சாற்றுக்கட்டை எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

இ) இறந்த மற்றும் கடத்தும் கூறுகள் அற்றது.

Q - 74 வேர் அல்லது தண்டில் கடத்தும் கூறுகளான புரோட்டோ சைலத்தில் வளைய மற்றும் சுருள் தடிப்புகள் உண்டாக்கப்படுவது இதற்காக.

- அ) முதிர்ச்சியடைய
- ஆ) நீட்சியடைய
- இ) அகலபடுத்த
- ஈ) வேறுபாடு அடைய

Q - 74 வேர் அல்லது தண்டில் கடத்தும் கூறுகளான புரோட்டோ சைலத்தில் வளைய மற்றும் சுருள் தடிப்புகள் உண்டாக்கப்படுவது இதற்காக.

இ) அகலபடுத்த

# Q - 75 முதிர்ந்த இருவித்திலை வேரிலிருந்து இருவித்திலை தண்டினை எவ்வாறு வேறுபாடுத்தி அறிவாய்?

- அ) இரண்டாம் நிலை சைலம் காணப்படுவதில்லை
- ஆ) இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயம் காணப்படுவதில்லை
- இ) புறணி காணப்படுகிறது
- ஈ) புரோட்டோ சைலத்தின் அமைவிடம்

Q - 75 முதிர்ந்த இருவித்திலை வேரிலிருந்து இருவித்திலை தண்டினை எவ்வாறு வேறுபாடுத்தி அறிவாய்?

ஈ) புரோட்டோ சைலத்தின் அமைவிடம்

#### Q - 76 பார்லி தாவரத்தின் வாஸ்குலத் தொகுப்புகள்

- அ) திறந்தது மற்றும் சிதறியது
- ஆ) மூடியது மற்றும் சிதறியது
- இ) திறந்தது மற்றும் வளைய வடிவமானது
- ஈ) மூடியது மற்றும் ஆரப்போக்கானது

Q - 76 பார்லி தாவரத்தின் வாஸ்குலத் தொகுப்புகள்

ஆ) மூடியது மற்றும் சிதறியது

# Q - 77 பாலிசேடு பாரங்ககைமா கீழ்கண்ட எந்த தாவர இலையில் காணப்படுவதில்லை

- அ) சோளம்
- ஆ) கடுகு
- இ) சோயா
- ஈ) பயிறு

Q - 77 பாலிசேடு பாரங்ககைமா கீழ்கண்ட எந்த தாவர இலையில் காணப்படுவதில்லை

அ) சோளம்

#### Q - 78 கரும்பு தாவரத்தில் காணப்படுவது

- அ) வலை பின்னல் நரம்பமைவு
- ஆ) வெடிகனி
- இ) ஐந்தங்க மலர்கள்
- ஈ) சப்ளாக் கட்டை வடிவ காப்புச்செல்கள்

Q - 78 கரும்பு தாவரத்தில் காணப்படுவது

ஈ) சப்ளாக் கட்டை வடிவ காப்புச்செல்கள்

Q - 79 பூக்கும் தாவரங்களில் வாஸ்குலார் திசுக்கள் இதிலிருந்து தோன்றுகிறது.

- அ) ஃபெல்லோஜென்
- ஆ) பிளிரோம்
- இ) பெரிபுளம்
- ஈ) டெர்மடோஜென்

Q - 79 பூக்கும் தாவரங்களில் வாஸ்குலார் திசுக்கள் இதிலிருந்து தோன்றுகிறது.

ஆ) பிளிரோம்

#### Q - 80 கரும்பு தண்டின் கணுவிடை நீள வேறுபாட்டின் காரணம்

- அ) தண்டின் நுனி ஆக்குத்திசு
- ஆ) கணுவிடை மொட்டின் நிலை
- இ) ஒவ்வொரு கணுவிடையின் கணுப்பகுதியில் காணப்படும் இலைப்பரப்பின் அளவு
- ஈ) இடையாக்குத்திசு

Q - 80 கரும்பு தண்டின் கணுவிடை நீள வேறுபாட்டின் காரணம்

ஈ) இடையாக்குத்திசு

#### Q - 81 மெல்லிய சுவருடைய வழிச்செல்கள் காணப்படுவது

- அ) வேரின் அகத்தோலில் நீரானது புறணியிலிருந்து பெரிசைகிளுக்கு கடத்த உதவுகிறது
- ஆ) சல்லடை கூறுகள் பொருட்களை மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்லும் நுழைவு புள்ளிகளாக செயல்படுகிறது.
- இ) விதை முளைத்தலின் போது கரு அச்சு வளர்ச்சியானது விதை வெளிஉறைலிருந்து வெளிவருகிறது.
- ஈ) மகரந்த குழல் சூலக தன்டு மையப் பகுதி வழியாக சூலகத்தை அடைகிறது

Q - 81 மெல்லிய சுவருடைய வழிச்செல்கள் காணப்படுவது

அ) வேரின் அகத்தோலில் நீரானது புறணியிலிருந்து பெரிசைகிளுக்கு கடத்த உதவுகிறது

## Q - 82 கீழ் கண்டவற்றில் எது பக்க ஆக்குத்திசு இல்லை

- அ) கற்றை இடை கேம்பியம்
- ஆ) ஃபெல்லோஜென்
- இ) இடையாக்கு திசு
- ஈ) கற்றையினுள் அமை கேம்பியம்

Q - 82 கீழ் கண்டவற்றில் எது பக்க ஆக்குத்திசு இல்லை

இ) இடையாக்கு திசு

## Q - 83 சைலக்குழாய் மற்றும் சல்லடை குழாய்களில் காணப்படும் பொதுவான பண்பு

- அ) நியூக்ளியஸ் அற்றது
- ஆ) பு. புரதம் காணப்படுகிறது
- இ) தடித்த இரண்டாம் நிலை சுவர
- ஈ) பக்க நார்களில் துளைகள் காணப்படுகிறது.

Q - 83 சைலக்குழாய் மற்றும் சல்லடை குழாய்களில் காணப்படும் பொதுவான பண்பு

அ) நியூக்ளியஸ் அற்றது

## Q - 84 வேரின் நீள்வெட்டுத்தோற்றத்தில் நுனியிலிருந்து மேல்நோக்கி காணப்படும் பகுதிகள் வரிசைப்படுத்துக

- அ) வேர்மூடி, செல்பிரிதல், செல் நீட்சியடைதல், செல் முதிர்ச்சியடைதல்
- ஆ) வேர்மூடி, செல்பிரிதல், செல் முதிர்ச்சியடைதல், செல் பெரிதாகுதல்
- இ) செல் பிரிதல், செல் பெரிதாகுதல், செல்முதிர்ச்சியடைதல், வேர் மூடி
- ஈ) செல் பிரிதல் செல் முதிர்ச்சி அடைதல், செல்பெரிதாகுதல், வேர் மூடி

Q - 84 வேரின் நீள்வெட்டுத்தோற்றத்தில் நுனியிலிருந்து மேல்நோக்கி காணப்படும் பகுதிகள் வரிசைப்படுத்துக

அ) வேர்மூடி, செல்பிரிதல், செல் நீட்சியடைதல், செல் முதிர்ச்சியடைதல்

#### Q - 85 உறக்க மையத்தின் செல்களில் காணப்படும் பண்பு

- அ) அடர்ந்த சைட்டோபிளாசம் மற்றும் சிறிய உட்கரு
- ஆ) நீர்த்த சைட்டோபிளாசம் மற்றும் சிறிய உட்கரு
- இ) வழக்கமாக பகுப்படைந்து கார்பஸ் உண்டாக்குவது
- ஈ) வழக்கமாக பகுப்படைந்து டூனிகா உண்டாக்குவது

Q - 85 உறக்க மையத்தின் செல்களில் காணப்படும் பண்பு

அ) அடர்ந்த சைட்டோபிளாசம் மற்றும் சிறிய உட்கரு

## Q - 86 பி-புரோட் டின் இதில் காணப்படுகிறது

- அ) பாரங்கைமா
- ஆ) கோலங்கைமா
- இ) சல்லடைகுழாய்
- ஈ) சைலம்

Q - 86 பி-புரோட் டின் இதில் காணப்படுகிறது

இ) சல்லடைகுழாய்

## Q - 87 சிறப்பான பறத்தோல் செல்களில் காப்பு செல்களை சூழ்ந்து காணப்படும் செல்கள்

- அ) குமிழுருச்செல்கள்
- ஆ) பட்டைத் துளைகள்
- இ) நிரப்பிச்செல்கள்
- ஈ) துணைச் செல்கள்

Q - 87 சிறப்பான பறத்தோல் செல்களில் காப்பு செல்களை சூழ்ந்து காணப்படும் செல்கள்

ஈ) துணைச் செல்கள்

## Q - 88 question not typed

- அ)
- ஆ)
- **@**)
- /<del>T</del>·)

Q - 88 question not typed

https://dailypractice.info/neet

## Q - 89 question not typed

அ)

ஆ)

**@**)

/<del>T</del>·)

Q - 89 question not typed

#### Q - 90 வைரக்கட்டை இதில் காணப்படுகிறது.

- அ) இரண்டாம் நிலை கட்டையின் உள்பகுதியில்
- ஆ) சாற்று கட்டையின் ஒரு பகுதி
- இ) இரண்டாம் நிலை கட்டையின் வெளிப்பகுதியில்
- ஈ) பெரிசைக்கிள்

Q - 90 வைரக்கட்டை இதில் காணப்படுகிறது.

அ) இரண்டாம் நிலை கட்டையின் உள்பகுதியில்

#### Q - 91 சைலயிடைப் ஃபுளோயம் காணப்படும் தண்டு

- அ) குக்கர் பிட்டா
- ஆ) சால்வியா
- இ) எருக்கு
- ஈ) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

Q - 91 சைலயிடைப் ஃபுளோயம் காணப்படும் தண்டு

இ) எருக்கு

#### Q - 92 காயங்களிலிருந்து சேதபடுத்தப்பட்ட திசுக்களை புதுப்பிப்பது

- அ) கீழ்புற ஆக்குத்திசு
- ஆ) இரண்டாம் நிலை ஆக்குத்திசு
- இ) முதலாம் நிலை ஆக்குத்திசு
- ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

Q - 92 காயங்களிலிருந்து சேதபடுத்தப்பட்ட திசுக்களை புதுப்பிப்பது

ஆ) இரண்டாம் நிலை ஆக்குத்திசு

#### Q - 93 கீழ்கண்ட திசுக்களில் எது உயிருள்ள செல்களை கொண்டது

- அ) சைலக்குழாய்கள்
- ஆ) டிரக்கீடுகள்
- இ) சல்லடைசெல்கள்
- ஈ) ஸ்கிலிரங்கைமா

Q - 93 கீழ்கண்ட திசுக்களில் எது உயிருள்ள செல்களை கொண்டது

இ) சல்லடைசெல்கள்

#### Q - 94 வேர் ஆக்குத்திசுவில் உறக்கமைய பகுதியின் வேலையாது

- அ) முதிர்ச் சி அடைவதற்கு தேவையான உணவினை சேமிக்கும் பகுதி
- ஆ) தாவர வளர்ச்சிப்பொருட்களை சேமிக்கும் பகுதி
- இ) ஆக்குத்திசுவில் சேதமுற்ற செல்களை புதுபிக்க தேவையான சேமிக்கும் பகுதி
- ஈ) தண்ணீரை உறுஞ்சும் பகுதி

Q - 94 வேர் ஆக்குத்திசுவில் உறக்கமைய பகுதியின் வேலையாது

இ) ஆக்குத்திசுவில் சேதமுற்ற செல்களை புதுபிக்க தேவையான சேமிக்கும் பகுதி

#### Q - 95 சல்லடை கூறுகளில் பி.புரதத்தின் மிக முக்கியமான வேலை

- அ) சல்லடை தட்டுக்களில் கேலோஸ் படிவதற்கு
- ஆ) உணவு கடத்தலுக்கு தேவையான சக்தியை அளிப்பது
- இ) தன்னை தானே அழிக்கும் நொதி
- ஈ) சேதமுற்ற செல்களை சரி செய்வதற்கான செயலில் பங்கேற்பது.

Q - 95 சல்லடை கூறுகளில் பி.புரதத்தின் மிக முக்கியமான வேலை

ஈ) சேதமுற்ற செல்களை சரி செய்வதற்கான செயலில் பங்கேற்பது.

#### Q - 96 கீழ்கண்டவற்றில் எது உயிரற்ற செல்களை கொண்டது

- அ) சைலம் பாரங்கைமா
- ஆ) கோலங்கைமா
- இ) ஃபெல்லம்
- ஈ) ஃபுளோயம்

Q - 96 கீழ்கண்டவற்றில் எது உயிரற்ற செல்களை கொண்டது

இ) ஃபெல்லம்

#### Q - 97 வாஸ்குலார்கேம்பியம் பொதுவாக உருவாக்குவது

- அ) ஃபெல்லோடெர்ம்
- ஆ) முதல்நிலை ஃபுளோயம்
- இ) இரண்டாம் நிலை சைலம்
- ஈ) பெரிடெர்ம்

Q - 97 வாஸ்குலார்கேம்பியம் பொதுவாக உருவாக்குவது

இ) இரண்டாம் நிலை சைலம்

# Q - 98 கீழ்கண்ட எந்த தாவரத்தில் பல அடுக்கு புறத்தோல் காணப்படுகிறது

- அ) குரோட்டன்
- ஆ) வெங்காயம்
- இ) நீரியம்
- ஈ) குக்கர்பிட்டா

Q - 98 கீழ்கண்ட எந்த தாவரத்தில் பல அடுக்கு புறத்தோல் காணப்படுகிறது

இ) நீரியம்

#### Q - 99 தூய நீரின் நீரியல் திறன்

- அ) பூச்சியத்தினை விட குறைவு
- ஆ) பூச்சியத்தினை விட அதிகம், ஆனால் ஒன்றை விட குறைவு
- இ) ஒன்றை விட அதிகம்
- ஈ) பூச்சியம்

Q - 99 தூய நீரின் நீரியல் திறன்

ஈ) பூச்சியம்

# Q - 100 நீராவிப்போக்கு மற்றும் வேரழுத்தம் ஆகியவை தாவரத்தில் நீரினை,

- அ) மேல் நோக்கி இழுக்கின்றன
- ஆ) முறையே இழுத்தல் மற்றும் தள்ளுதல்
- இ) மேல் நோக்கி தள்ளுதல்
- ஈ) முறையே தள்ளுதல் மற்றும் இழுத்தல்

Q - 100 நீராவிப்போக்கு மற்றும் வேரழுத்தம் ஆகியவை தாவரத்தில் நீரினை,

ஆ) முறையே இழுத்தல் மற்றும் தள்ளுதல்

Q - 101 மின்- வேதி சரிவு வாட்டத்திற்கு எதிரான திசையில் அயனிகளும் மூலக்கூறுகளும் செல்வது

- அ) ஆற்றல்சார் கடத்தல்
- ஆ) பிநோசைட்டோஸிஸ்
- இ) பிரௌனியன் இயக்கம்
- ஈ) பரவல்

Q - 101 மின்- வேதி சரிவு வாட்டத்திற்கு எதிரான திசையில் அயனிகளும் மூலக்கூறுகளும் செல்வது

அ) ஆற்றல்சார் கடத்தல்

#### Q - 102 வாடல் ஏற்படும் நிகழ்வின் சரியான வரிசை,

- அ) வெளிச்சவ்வூடுபரவல் பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர வாடல்
- ஆ) வெளிச்சவ்வூடுபரவல் பிளாஸ்மா சிதைவு தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர வாடல்
- இ) உட்சவ்வூடுபரவல் பிளாஸ்மா சிதைவு தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர வாடல்
- ஈ) வெளிச்சவ்வூடுபரவல் பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி பிளாஸ்மாசிதைவு தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர வாடல்

Q - 102 வாடல் ஏற்படும் நிகழ்வின் சரியான வரிசை,

ஆ) வெளிச்சவ்வூடுபரவல் – பிளாஸ்மா சிதைவு – தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர வாடல்

Q - 103 'A' மற்றும் 'B' ஆகிய இரு சவ்வூடுபரவல் அமைப்பு ஒரு அரைக்கடத்தி சவ்வினால் பிரிக்கப்படுள்ளது. அறை 'A'வின் சவ்வூடுபரவல் திறன் -30 வளி மற்றும் விறைப்பழுத்தம் 5 வளி. அறை 'B'யின் சவ்வூடுபரவல் திறன் -10 வளி மற்றும் விரைப்பழுத்தம் 0 வளி. இந்நிலையில் நீரின் செல்லும் திசை யாது?

- அ) இரு திசையிலும் சம அளவில் செல்லும்
- ஆ) 'B' இருந்து 'A'விற்கு செல்லும்
- இ) எவ்வித இயக்கமும் இருக்காது
- ஈ) ''A'விலிருந்து Bக்கு செல்லும்

Q - 103 'A' மற்றும் 'B' ஆகிய இரு சவ்வூடுபரவல் அமைப்பு ஒரு அரைக்கடத்தி சவ்வினால் பிரிக்கப்படுள்ளது. அறை 'A'வின் சவ்வூடுபரவல் திறன் -30 வளி மற்றும் விறைப்பழுத்தம் 5 வளி. அறை 'B'யின் சவ்வூடுபரவல் திறன் -10 வளி மற்றும் விரைப்பழுத்தம் 0 வளி. இந்நிலையில் நீரின் செல்லும் திசை யாது?

ஆ) 'B' இருந்து 'A'விற்கு செல்லும்

## Q - 104 பெருக்கமடைந்த வாக்குவோல்களால் செல்சுவர் மீது ஏற்படுத்தும் அழுத்தம்

- அ) சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம்
- ஆ) சுவர் அழுத்தம்
- இ) விறைப்பழுத்தம்
- ஈ) பரவல் அழுத்தப் பற்றாக்குறை

Q - 104 பெருக்கமடைந்த வாக்குவோல்களால் செல்சுவர் மீது ஏற்படுத்தும் அழுத்தம்

இ) விறைப்பழுத்தம்

## Q - 105 நீராவிப்போக்கு ஒரு தேவையான தீமை என குறிப்பிட்டவர்

- அ) கர்டிஸ்
- ஆ) ஸ்டீவார்ட்
- இ) ஆண்டர்சன்
- ஈ) ஜே .சி.போஸ்

Q - 105 நீராவிப்போக்கு ஒரு தேவையான தீமை என குறிப்பிட்டவர்

அ) கர்டிஸ்

# Q - 106 கீழ்கண்டவற்றுள் எது இலைத்துளை இயக்கத்தினைப் பற்றிய சரியான தற்கால விளக்கம்?

- அ) நீராவிப்போக்கு
- ஆ) பொட்டாசியத்தின் உட்புகல் மற்றும் வெளிப்புகல்
- இ) தரசத்தின் நீரார்பகுத்தல்
- ஈ) காப்பு செல்களின் ஒளிச்சேர்க்கை

Q - 106 கீழ்கண்டவற்றுள் எது இலைத்துளை இயக்கத்தினைப் பற்றிய சரியான தற்கால விளக்கம்?

ஆ) பொட்டாசியத்தின் உட்புகல் மற்றும் வெளிப்புகல்

#### Q - 107 தாங்கிப்புரதங்களுடன் தொடர்புடையது எது?

- அ) அயனிகளின் ஆற்றல்சார் கடத்தல்
- ஆ) அயனிகளின் ஆற்றல்சாரா கடத்தல்
- இ) நீர்கடத்தல்
- ஈ) நீர் ஆவியாதல்

Q - 107 தாங்கிப்புரதங்களுடன் தொடர்புடையது எது?

அ) அயனிகளின் ஆற்றல்சார் கடத்தல்

#### Q - 108 செல்லில் ஆற்றல் சார் அயனிக் கடத்தலுக்கு தேவை

- அ) அதிக வெப்பநிலை
- ஆ) ஏ.டி.பி (ATP)
- இ) காரத்தன்மை கொண்ட pH
- ஈ) உப்பு

Q - 108 செல்லில் ஆற்றல் சார் அயனிக் கடத்தலுக்கு தேவை

ஆ) ஏ.டி.பி (ATP)

### Q - 109 நீர்வடிதலின்போது உருவாகும் திரவம்

- அ) தூய நீர்
- ஆ) நீர் மற்றும் கனிம உப்புகள் சேர்ந்தது
- இ) நீர் மற்றும் நோதிகள் சேர்ந்தது
- ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

Q - 109 நீர்வடிதலின்போது உருவாகும் திரவம்

ஆ) நீர் மற்றும் கனிம உப்புகள் சேர்ந்தது

#### Q - 110 தாவரங்களில் இலைத் துளைத் திறப்பிற்கு காரணமாவது

- அ) பொட்டாசியம் அயனியின் உட்புகல்
- ஆ) பொட்டாசியம் அயனியின் வெளிப்புகல்
- இ) ஹைட்ரஜன் அயனியின் உட்புகல்
- ஈ) கால்சியம் அயனியின் உட்புகல்

Q - 110 தாவரங்களில் இலைத் துளைத் திறப்பிற்கு காரணமாவது

அ) பொட்டாசியம் அயனியின் உட்புகல்

### Q - 111 போட்டோமீட்டர் எதன் அடிப்படையில் இயங்குகிறது?

- அ) சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம்
- ஆ) நீர் உறிஞ்சப்படுவதன் சமமான அளவிற்கு நீராவிப்போக்கு நடைபெறும் காரணத்தால்
- இ) குழாயின் முனைக்கும் தாவரத்திற்கும் இடையே உள்ள திறன் வேறுபாடு காரணமாக
- ஈ) வேர் அழுத்தம்

Q - 111 போட்டோமீட்டர் எதன் அடிப்படையில் இயங்குகிறது?

ஆ) நீர் உறிஞ்சப்படுவதன் சமமான அளவிற்கு நீராவிப்போக்கு நடைபெறும் காரணத்தால்

#### Q - 112 சாற்றேற்றத்தினை விளக்கும் சரியான கோட்பாடு,

- அ) நீராவிப்போக்கின் இழுவை மற்றும் டிக்ஸன் ஜாலியின் ஒட்டிணைவு கொள்கை
- ஆ) ஜே .சி. போஸின் உயிர்துடிப்பு கொள்கை
- இ) காட்லிவிஸ்கியின் ரிலே -பம்ப் கோட்பாடு
- ஈ) மேற்கண்டவற்றுள் ஏதுமில்லை

Q - 112 சாற்றேற்றத்தினை விளக்கும் சரியான கோட்பாடு,

அ) நீராவிப்போக்கின் இழுவை மற்றும் டிக்ஸன் – ஜாலியின் ஒட்டிணைவு கொள்கை

Q - 113 ஒரு தாவரசெல்லினை கரைச லில் வைக்கும்போது பிளாஸ்மா சிதைவுமீட்சி நடைபெற்றால் அக்கரைசலின் செறிவு

- அ) செறிவற்றது
- ஆ) ஹைப்பர்டானிக்
- இ) ஐசோடானிக்
- ஈ) ஹைப்போடானிக்

Q - 113 ஒரு தாவரசெல்லினை கரைச லில் வைக்கும்போது பிளாஸ்மா சிதைவுமீட்சி நடைபெற்றால் அக்கரைசலின் செறிவு

ஆ) ஹைப்பர்டானிக்

## Q - 114 வேர்நுனியின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமான தனிமம்

- *அ*) Zn
- *ஆ*) Fe
- (ഇ) Ca
- *ஈ*) Mn

Q - 114 வேர்நுனியின் வளர்ச்சிக்கு அவசியமான தனிமம்

**ത്ത)** Ca

Q - 115 பச்சைய சோகை அறிகுறிகள் இலையில் தோன்றுவது நைட்ரஜன் குறைபாட்டினால் என்பதனை மாணவன் அறிந்தபின் அதனை உறுதிபடுத்தும்படி மஞ்சள் நிறம் முதலில் தோன்றுவது

- அ) வயதான இலைகள்
- ஆ) இளம் இலைகள்
- இ) இளம் இலைகள் முதலிலும் அதனை தொடர்ந்து முதிர்ந்த இலைகள்
- ஈ) முதிர்ந்த இலைகளை தொடர்ந்து இளம் இலைகள்

Q - 115 பச்சைய சோகை அறிகுறிகள் இலையில் தோன்றுவது நைட்ரஜன் குறைபாட்டினால் என்பதனை மாணவன் அறிந்தபின் அதனை உறுதிபடுத்தும்படி மஞ்சள் நிறம் முதலில் தோன்றுவது

அ) வயதான இலைகள்

### Q - 116 சைட்டோகுரோம் ஆக்ஸிடேஸில் காணப்படும் கனிமம்

- அ) இரும்பு
- ஆ) மெக்னீசியம்
- இ) துத்தநாகம்
- ஈ) தாமிரம்

Q - 116 சைட்டோகுரோம் ஆக்ஸிடேஸில் காணப்படும் கனிமம்

ஈ) தாமிரம்

### Q - 117 சாறுண்ணி ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் பற்றிய சரியான கூற்று

- அ) உடலுக்கு வெளியே நொதியை சுரந்து உறிஞ்சுகிறது.
- ஆ) வேர் பூஞ்சையை கொண்டவை
- இ) உணவை எடுத்துக்கொண்டு பின்னர் சொரிமானம் செய்கிறது
- ஈ) ஒளிச்சேர்க்கை செய்பவை.

Q - 117 சாறுண்ணி ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் பற்றிய சரியான கூற்று

அ) உடலுக்கு வெளியே நொதியை சுரந்து உறிஞ்சுகிறது.

# Q - 118 வீனஸ் பிளை ட்ரப் பூச்சிகளை பிடிப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது

- அ) பூச்சிகளின் வேதி தூண்டல்
- ஆ) செயலற்ற முறை சிறப்பு அமைப்புகள் இல்லை
- இ) தசைபோன்ற செல்கள்
- ஈ) விரைவான விறைப்பழுத்த மாற்றம்

Q - 118 வீனஸ் பிளை ட்ரப் பூச்சிகளை பிடிப்பதற்கு காரணமாக இருப்பது

ஈ) விரைவான விறைப்பழுத்த மாற்றம்

#### Q - 119 தாவரங்களில் போரானின் செயல்பாட்டு பங்களிப்பு

- அ) ஒளிச்சேர்க்கை
- ஆ) சர்க்கரை கடத்தல்
- இ) நொதிகளின் செயல்பாட்டினை தூண்டுதல்
- ஈ) துணை நொதியாக செயல்படுதல்.

Q - 119 தாவரங்களில் போரானின் செயல்பாட்டு பங்களிப்பு

ஆ) சர்க்கரை கடத்தல்

Q - 120 Ca2+ உறிஞ்சுதல் மற்றும் பிளாஸ்மா சவ்வின் செயல்பாட்டிற்கு காரணமான கனிமம்

- அ) பாஸ்பரஸ்
- ஆ) மாலிப்டினம்
- இ) மாங்கனீசு
- ஈ) போரான்

Q - 120 Ca2+ உறிஞ்சுதல் மற்றும் பிளாஸ்மா சவ்வின் செயல்பாட்டிற்கு காரணமான கனிமம்

ஈ) போரான்

## Q - 121 கீழ்கண்டவற்றில் சல்பர் இல்லாதது

- அ) சிஸ்டின்
- ஆ) மெதியோனின்
- இ) பெர்ரடாக்ஸின்
- ஈ) பைரிடாக்ஸின்

Q - 121 கீழ்கண்டவற்றில் சல்பர் இல்லாதது

ஈ) பைரிடாக்ஸின்

## Q - 122 நைட்ரஜன் மற்றும் பொட்டா சியத்தின் குறைபாட்டு அறிகுறிகள் முதலில் தோன்றுவது

- அ) வயதான இலைகள்
- ஆ) இளம் இலைகள்
- இ) வேர்கள்
- ஈ) மொட்டுகள்

Q - 122 நைட்ரஜன் மற்றும் பொட்டா சியத்தின் குறைபாட்டு அறிகுறிகள் முதலில் தோன்றுவது

ஆ) இளம் இலைகள்

### Q - 123 நிலைநிறுத்தத்தில் தோன்றும் முதல் நிலையான பொருள்.......

- அ) NO-3
- ஆ) குளுட்டாமேட்
- (a) NO-2
- ஈ) அம்மோனியா

Q - 123 நிலைநிறுத்தத்தில் தோன்றும் முதல் நிலையான பொருள்.......

ஈ) அம்மோனியா

# Q - 124 C3 தாவரங்களை விட C4 தாவரங்கள் அதிக ஒளிச்சேர்க்கைதிறன் பெற்றிருப்பதன் காரணம்

- அ) மெல்லிய கியுடிக்கிள் பெற்றிருத்தல்
- ஆ) குறைந்த ஒளிச்சுவாசம்
- இ) அதிக இலைப்பரப்பு
- ஈ) இலையின் அதிக எண்ணிக்கையிலான பசுங்கணிகங்கள்

Q - 124 C3 தாவரங்களை விட C4 தாவரங்கள் அதிக ஒளிச்சேர்க்கைதிறன் பெற்றிருப்பதன் காரணம்

ஆ) குறைந்த ஒளிச்சுவாசம்

#### Q - 125 பச்சையம் b மூலக்கூறு வாய்பாடு ...

- அ) C54 H70 O5 N4 Mg
- ஆ) C55 H70 O6 N4 Mg
- (a) C55 H72 O5 N4 Mg
- *न*ः) С45 H72 O5 N4 Mg

Q - 125 பச்சையம் b மூலக்கூறு வாய்பாடு ...

*ച്ച*) C55 H70 O6 N4 Mg

### Q - 126 பசுங்கணிக கிரானாவில் ADP + Pi ATP உருவாகும் நிகழ்வு

- அ) பாஸ்பரிகரணம்
- ஆ) ஒளி பாஸ்பரிகரணம்
- இ) ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம்
- ஈ) நீரின் ஒளிபிளத்தல்

Q - 126 பசுங்கணிக கிரானாவில் ADP + Pi ATP உருவாகும் நிகழ்வு

ஆ) ஒளி பாஸ்பரிகரணம்

#### Q - 127 பசுங்கணிகத்தில் பச்சையம் காணப்படும் இடம் .

- அ) ஸ்ட்ரோமா
- ஆ) வெளிச்சவ்வு
- இ) உள்ச்சவ்வு
- ஈ) தைலகாய்டுகள்

Q - 127 பசுங்கணிகத்தில் பச்சையம் காணப்படும் இடம் .

ஈ) தைலகாய்டுகள்

Q - 128 நிறமி அமைப் பு II-இல் கிளர்வுற்ற பச்சைய மூலக்கூறிலிருந்து விடுபடும் எலக்ட்ரான்களை ஏற்கும் முதல் பொருள்...

- அ) குயினோன்
- ஆ) பெர்ரடாக்சின்
- இ) சைட்டோகுரோம் b
- ஈ) சைட்டோகுரோம் f

Q - 128 நிறமி அமைப் பு II-இல் கிளர்வுற்ற பச்சைய மூலக்கூறிலிருந்து விடுபடும் எலக்ட்ரான்களை ஏற்கும் முதல் பொருள்...

அ) குயினோன்

Q - 129 கீழ்க்கண்ட நான்கு கூற்றுகளில் எது சரியானது என கண்டறிக அ. Z வழி ஒளிவினை நிகழ்வில் பங்கு பெறுவது PS I மட்டுமே ஆ சுழல் ஒளிபாஸ்பரிகரணத்தில் PS I மட்டும் பங்கேற்கிறது இ. சுழல் ஒளிபாஸ்பரிகரணத்தில் ATP மற்றும் NADPH2 உருவாகிறது ஈ. ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லாக்களில் PS II மற்றும் NADP காணப்படுவதில்லை

- அ) அமற்றும் ஆ
- ஆ) ஆ மற்றும் இ
- இ) இ மற்றும் ஈ
- ஈ) ஆ மற்றும் ஈ

Q - 129 கீழ்க்கண்ட நான்கு கூற்றுகளில் எது சரியானது என கண்டறிக அ. Z வழி ஒளிவினை நிகழ்வில் பங்கு பெறுவது PS I மட்டுமே ஆ சுழல் ஒளிபாஸ்பரிகரணத்தில் PS I மட்டும் பங்கேற்கிறது இ. சுழல் ஒளிபாஸ்பரிகரணத்தில் ATP மற்றும் NADPH2 உருவாகிறது ஈ. ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லாக்களில் PS II மற்றும் NADP காணப்படுவதில்லை

ஈ) ஆ மற்றும் ஈ

## Q - 130 ஒளிவினையின் ஒளியின் நீராற்பகுத்தலின் போது ஒரு நீர் மூலக்கூறிலிருந்து உருவாவது

- அ) 2 எலக்ட்ரான் 4 புரோட்டான்
- ஆ) 4 எலக்ட்ரான் 4 புரோட்டான்
- இ) 4 எலக்ட்ரான் 3 புரோட்டான்
- ஈ) 2 எலக்ட்ரான் 2 புரோட்டான்

Q - 130 ஒளிவினையின் ஒளியின் நீராற்பகுத்தலின் போது ஒரு நீர் மூலக்கூறிலிருந்து உருவாவது

ஈ) 2 எலக்ட்ரான் 2 புரோட்டான்

# Q - 131 ஒளிச்சேர்க்கையின் செயல்படு கதிர்வீச்சின் (PAR) அலைநீளத்தின் அளவு

- அ) 400 700 nm
- *ஆ*) 450 920 nm
- (a) 340 450 nm
- *न*) 500 600 nm

Q - 131 ஒளிச்சேர்க்கையின் செயல்படு கதிர்வீச்சின் (PAR) அலைநீளத்தின் அளவு

அ) 400 - 700 nm

Q - 132 பாஸ்போ ஈனால் பைருவேட் (PEP) முதன்மை CO2 ஏற்பியாக செயல்படுவது. தாவரம்

- அ) C3
- ஆ) C4
- (a) C2
- ஈ) C3 மற்றும் C4

Q - 132 பாஸ்போ ஈனால் பைருவேட் (PEP) முதன்மை CO2 ஏற்பியாக செயல்படுவது. தாவரம்

ஆ) C4

## Q - 133 ஒளிச்சேர்க்கையை பாதிக்கும் காரணிகளுக்கான கூற்றுகளில் எது தவறான கூற்று

- அ) CO2 நிலைநிறுத்தத்திற்கான ஒளியின் செறிவூட்டல் 10% சூரிய ஒளியில் நிகழ்கிறது.
- ஆ) கார்பன்டை ஆக்ஸைடு நிலைநிறுத்தம் வளிமண்டல CO2 அதிகரிப்பு 0.05% வரை அதிகரிக்கிறது.
- இ) ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் அதிகரிப்பு C3 தாவரங்களில் அதிக வெப்பநிலையிலும் C4 தாவரங்களில் குறைந்த வெப்பநிலையிலும் நிகழ்கிறது.
- ஈ) தக்காளியானது ஒரு பசுமை இல்ல தாவரமாகும் CO2 செறிவு அதிகமான இடங்களில் விளைச்சல் அதிகரிக்கும்

Q - 133 ஒளிச்சேர்க்கையை பாதிக்கும் காரணிகளுக்கான கூற்றுகளில் எது தவறான கூற்று

இ) ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் அதிகரிப்பு C3 தாவரங்களில் அதிக வெப்பநிலையிலும் C4 தாவரங்களில் குறைந்த வெப்பநிலையிலும் நிகழ்கிறது.

Q - 134 உனது தோட்டத்தில் வளரும் ஒரு தாவரமானது ஒளிசுவாச இழப்பினை தவிர்க்கிறது, நீரை பயன்படுத்தும் திறன், அதிக வெப்பத்தில் அதிக ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் மற்றும் அதிக நைட்ரஜன் பயன்படுத்தும் திறன் பெற்றுள்ள இத்தாவரத்தினை கண்டறிக

- அ) C4
- ஆ) CAM
- இ) நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தி
- *ஈ*) C3

Q - 134 உனது தோட்டத்தில் வளரும் ஒரு தாவரமானது ஒளிசுவாச இழப்பினை தவிர்க்கிறது, நீரை பயன்படுத்தும் திறன், அதிக வெப்பத்தில் அதிக ஒளிச்சேர்க்கை வீதம் மற்றும் அதிக நைட்ரஜன் பயன்படுத்தும் திறன் பெற்றுள்ள இத்தாவரத்தினை கண்டறிக

அ) C4

Q - 135 எமர்சன் மேம்ப டுத்தப்பட்ட விளைவு மற்றும் சிவப்பு வீழ்ச்சி இரண்டும் இதனை கண்டறிய தூண்டுகோலாய் இருந்தது.

- அ) இரண்டு ஒளிஅமைப்புகள் ஒரே நேரத்தில் செயல்படுகிறது
- ஆ) ஒளிபாஸ்பரிகரணம்மற்றும் சுழற்சி எலக்ட்ரான் கடத்தல்
- இ) ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம்
- ஈ) ஒளிபாஸ்பரிகரணம் மற்றும் சுழலா எலக்ட்ரான் கடத்தல்

Q - 135 எமர்சன் மேம்ப டுத்தப்பட்ட விளைவு மற்றும் சிவப்பு வீழ்ச்சி இரண்டும் இதனை கண்டறிய தூண்டுகோலாய் இருந்தது.

அ) இரண்டு ஒளிஅமைப்புகள் ஒரே நேரத்தில் செயல்படுகிறது

## Q - 136 C3 மற்றும் C4 தாவரங்களுக்கிடையே முக்கிய வேறுபாட்டினை உருவாக்கும் செயல்முறை

- அ) கிளைக்காலிசிஸ்
- ஆ) கால்வின் சுழற்சி
- இ) ஒளிச்சுவாசம்
- ஈ) சுவாசித்தல்

Q - 136 C3 மற்றும் C4 தாவரங்களுக்கிடையே முக்கிய வேறுபாட்டினை உருவாக்கும் செயல்முறை

இ) ஒளிச்சுவாசம்

## Q - 137 பசுங்கணிகத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்கள் காணப்படுவது

- அ) தைலகாய்டு உள் இடைவெளி
- ஆ) சவ்வுகளுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி
- இ) ஏற்பி கூட்டமைப்பு
- ஈ) ஸ்ட்ரோமா

Q - 137 பசுங்கணிகத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்கள் காணப்படுவது

அ) தைலகாய்டு உள் இடைவெளி

## Q - 138 ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம் என்பது

- அ) தளப்பொருளிலிருந்து பாஸ்பேட் தொகுதி ADP க்கு மாற்றப்பட்டு ATP உருவாகிறது
- ஆ) ATPயில் பாஸ்பேட் தொகுதி ஆக்ஸிஜனேற்றமடைதல்
- இ) ATPயில் பாஸ்பேட் தொகுதி சேர்க்கப்படுதல்
- ஈ) தளப்பொருள் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் போது எலக்ட்ரான்களில் வெளியேரும் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி ATP உருவாகிறது.

Q - 138 ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம் என்பது

ஈ) தளப்பொருள் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் போது எலக்ட்ரான்களில் வெளியேரும் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி ATP உருவாகிறது.

Q - 139 கொழுப்பு, கார்போஹைட்ரேட்கள் மற்றும் புரதங்களின் சுவாசித்தல் வழி உடைதலுக்கு எந்த உயிரி மூலக்கூறு பொதுவானது?

- அ) குளுக்கோஸ் -6-பாஸ்பேட்
- ஆ) ப்ரக்டோஸ் -1,6-பிஸ்பாஸ்பேட்
- இ) பெருவிக்அமிலம்
- ஈ) அசிட்டைல்CoA

Q - 139 கொழுப்பு, கார்போஹைட்ரேட்கள் மற்றும் புரதங்களின் சுவாசித்தல் வழி உடைதலுக்கு எந்த உயிரி மூலக்கூறு பொதுவானது?

ஈ) அசிட்டைல்CoA

## Q - 140 கிரப்ஸ் சுழற்சியைபொருத்தவரை எது தவறான கூற்று?

- அ) இந்த சுழற்சியில் ஒரு புள்ளியில் FAD வானது FADH2வாக ஒடுக்கமடைகிறது.
- ஆ) சக்சினைல் CoA சக்சினிக் அமிலமாக மாறும்போது GTP என்றமூலக்கூறு உருவாகிறது
- இ) இந்த சுழற்சியில் அசிட்டைல் தொகுதியுடன் (அசிட்டைல் CoA) பைருவிக் அமிலத்துடன் இணைந்து சிட்ரிக்அமிலம் உருவாகிறது.
- ஈ) இந்த சுழற்சியில் மூன்று இடங்களில் NAD+னது NADH+ H+ க ஒடுக்கமடைகிறது.

Q - 140 கிரப்ஸ் சுழற்சியைபொருத்தவரை எது தவறான கூற்று?

இ) இந்த சுழற்சியில் அசிட்டைல் தொகுதியுடன் (அசிட்டைல் CoA) பெருவிக் அமிலத்துடன் இணைந்து சிட்ரிக்அமிலம் உருவாகிறது.

## Q - 141 diagram present

- அ)
- ஆ)
- **@**)
- *ा*-)

Q - 141 diagram present

Q - 142 வளர்சிதை மாற்றத்தின் போது தளப்பொருள் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் வெளியேறும் ஆற்றலை எலக்ட்ரான் ஏற்கும் நிகழ்விற்கு பெயர்

- அ) கிளைக்காலைசிஸ்
- ஆ) நொதித்தல்
- இ) காற்று சுவாசித்தல்
- ஈ) ஒளி சுவாசித்தல்

Q - 142 வளர்சிதை மாற்றத்தின் போது தளப்பொருள் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் வெளியேறும் ஆற்றலை எலக்ட்ரான் ஏற்கும் நிகழ்விற்கு பெயர்

ஆ) நொதித்தல்

## Q - 143 கிரப்ஸ் சுழற்சி அறு கார்பன் கொண்ட சேர்மம் உருவாவதற்கு

- அ) மாலிக்அமிலம், அசிட்டைல் இணைநொதி
- ஆ) ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலம், அசிட்டைல் இணைநொதி
- இ) சக்சினிக் அமிலம், பைருவிக் அமிலம்
- ஈ) பியுமாரிக்அமிலம், பைருவிக்அமிலம்

Q - 143 கிரப்ஸ் சுழற்சி ஆறு கார்பன் கொண்ட சேர்மம் உருவாவதற்கு

ஆ) ஆக்சலோ அசிட்டிக் அமிலம், அசிட்டைல் இணைநொதி

#### Q - 144 சுவாசித்தல் என்ற வினையில்

- அ) ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது
- ஆ) ஆற்றல் ADP வடிவத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது
- இ) ஆற்றல் TPவடிவத்தில் வெளியிடப்படுகிறது மற்றும் சேமிக்கப்படுகிறது
- ஈ) ஆற்றல் ஒரு போதும் வெளியிடப்படுவதில்லை

Q - 144 சுவாசித்தல் என்ற வினையில்

இ) ஆற்றல் TPவடிவத்தில் வெளியிடப்படுகிறது மற்றும் சேமிக்கப்படுகிறது

## Q - 145 காற்று மற்றும் காற்றிலா சுவாசித்தலில் பொதுவான நிலை எனப்படுவது

- அ) கிளைக்காலைசிஸ்
- ஆ) கிரப்ஸ் சுழற்சி
- இ) ட்ரைகார்பாக்ஸிலிக் அமிலசுழற்சி
- ஈ) ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம்

Q - 145 காற்று மற்றும் காற்றிலா சுவாசித்தலில் பொதுவான நிலை எனப்படுவது

அ) கிளைக்காலைசிஸ்

#### Q - 146 ATP உற்பத்திநடைபெறுவது

- அ) உட்கூழ்மம்
- ஆ) மைட்டோகாண்ட்ரிய வெளிச்சவ்வு
- இ) மைட்டோகாண்ட்ரிய உட்சவ்வு
- ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

Q - 146 ATP உற்பத்திநடைபெறுவது

இ) மைட்டோகாண்ட்ரிய உட்சவ்வு

Q - 147 கிரப்ஸ் சுழற்சியில் உள்ள எந்த 5-கார்பன் கரிமசேர்மம் N2 வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கிய சேர்மமாக உள்ள து.

- அ) சிட்ரிக் அமிலம்
- ஆ) பியூமாரிக் அமிலம்
- இ) ஆக்சலோசக்சினிக் அமிலம்
- ஈ) கீட்டோகுளூட்டாரிக்அமிலம்

Q - 147 கிரப்ஸ் சுழற்சியில் உள்ள எந்த 5-கார்பன் கரிமசேர்மம் N2 வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கிய சேர்மமாக உள்ள து.

ஈ) கீட்டோகுளூட்டாரிக்அமிலம்

#### Q - 148 கனி பழுத்தலில் பங்கு கொள்ளும் ஹார்மோன் எது?

- அ) நாப்தலீன் அசிடிக் அமிலம்
- ஆ) எத்திலின்
- இ) இண்டோல் அசிடிக் அமிலம்
- ஈ) சியாடின்

Q - 148 கனி பழுத்தலில் பங்கு கொள்ளும் ஹார்மோன் எது?

ஆ) எத்திலின்

### Q - 149 இளநீரில் காணப்படும் ஹார்மோன்

- அ) ஆக்சின்
- ஆ) ஜிப்ரலின்கள்
- இ) அப்சசிக் அமிலம்
- ஈ) சைட்டோகைனின்

Q - 149 இளநீரில் காணப்படும் ஹார்மோன்

ஈ) சைட்டோகைனின்

#### Q - 150 விதையில்லா வாழைக்கனி உருவாக காரணம்

- அ) உடலமுறை உற்பத்தி வாழைக்கனி
- ஆ) ஆக்சின் தெளித்தல்
- இ) அமற்றும் ஆ
- ஈ) மேற்கூரிய எதுவுமில்லை

Q - 150 விதையில்லா வாழைக்கனி உருவாக காரணம்

அ) உடலமுறை உற்பத்தி வாழைக்கனி

Q - 151 தாவர நுனிகள் துண்டிக்கப்பட்டு சீரமைக்கும் போது, கோண மொட்டின் வளர்ச்சி தூண்டப்பட்டு, கிளைகள் தோன்ற காரணமான ஹார்மோன்.

- அ) எத்திலின்
- ஆ) ஜிப்ரானிகள்
- (a) IAA
- ஈ) சைட்டோகைனின்

Q - 151 தாவர நுனிகள் துண்டிக்கப்பட்டு சீரமைக்கும் போது, கோண மொட்டின் வளர்ச்சி தூண்டப்பட்டு, கிளைகள் தோன்ற காரணமான ஹார்மோன்.

(മു) IAA

Q - 152 அவினா வளைவுச் சோதனை எனும் உயிரிய ஆய்வு இதன் செயல்பட்டினை அறிய உதவுகிறது

- அ) ஆக்சின்
- ஆ) எத்திலின்
- இ) ஜிப்ரலின்கள்
- ஈ) சைட்டோகைனின்

Q - 152 அவினா வளைவுச் சோதனை எனும் உயிரிய ஆய்வு இதன் செயல்பட்டினை அறிய உதவுகிறது

அ) ஆக்சின்

# Q - 153 செயற்கை ஆக்சின் என்பது எது?

- அ) IBA
- ஆ) NAA
- (a) IAA
- *ஈ*) GA

Q - 153 செயற்கை ஆக்சின் என்பது எது?

ஆ) NAA

Q - 154 கரோட்டினாய்டு எனும் நிறமியிலிருந்து பெறப்படும் ஹார்மோன்.

- அ) அப்சசிக் அமிலம்
- ஆ) இன்டோல் பியூட்டரிக் அமிலம்
- இ) இன்டோல்- 3 அசிடிக் அமிலம்
- ஈ) ஜிப்ரலிக் அமிலம்

Q - 154 கரோட்டினாய்டு எனும் நிறமியிலிருந்து பெறப்படும் ஹார்மோன்.

அ) அப்சசிக் அமிலம்

### Q - 155 ஒளிக்காலத்துவம் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட தாவரம்

- அ) பருத்தி
- ஆ) புகையிலை
- இ) உருளை
- ஈ) தக்காளி

Q - 155 ஒளிக்காலத்துவம் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்ட தாவரம்

ஆ) புகையிலை

#### Q - 156 தேயிலை பயிரிடும்போது பயன்படுத்தப்படும்

- அ) அப்சசிக் அமிலம்
- ஆ) சியாடின்
- இ) இன்டோல் -3 அசிடிக்அமிலம்
- ஈ) சியாடின்

Q - 156 தேயிலை பயிரிடும்போது பயன்படுத்தப்படும்

இ) இன்டோல் -3 அசிடிக்அமிலம்

#### Q - 157 வேர் வளர்ச்சியை தூண்டுவது.

- அ) ஆக்சின்
- ஆ) ஜிப்ரலின்
- இ) எத்திலின்
- ஈ) அப்சசிக் அமிலம்

Q - 157 வேர் வளர்ச்சியை தூண்டுவது.

Q - 158 தாவர வளர்ச்சியில் நடைபெறும் மூப்படைதல் எனும் நிகழ்ச்சியை தெரிவிப்பது.

- அ) ஓராண்டுத் தாவரங்கள்
- ஆ) மலர்கள்
- இ) சைலக்குழாய் மற்றும் டிரக்கிடு வேறுபாடு அடைதல்
- ஈ) இலை உதிர்தல்

Q - 158 தாவர வளர்ச்சியில் நடைபெறும் மூப்படைதல் எனும் நிகழ்ச்சியை தெரிவிப்பது.

ஈ) இலை உதிர்தல்

Q - 159 ஓர் செயற்கையான வளர்ப்பு முறையில் வேறுபாடு அடையச் செய்வதற்கு உங்களிடம் திசு கொடுக்கப்படுகிறது. கீழ்க்கண்ட எந்த இரண்டு ஹார்மோன்களை வளர்ப்பு ஊடகத்தில் நீங்கள் சேர்ப்பதால் திசுவிலிருந்து வேர் மற்றும் தண்டுத்தொகுப்பில் உருவாக்கப்படுகிறது.

- அ) ஜிப்ரலின்கள் மற்றும் அப்சசிக் அமிலம்
- ஆ) IAA மற்றும் ஜிப்ரலின்
- இ) ஆக்சின் மற்றும் சைட்டோகைனின்
- ஈ) ஆக்சின் மற்றும் ஜிப்ரலின்கள்

Q - 159 ஓர் செயற்கையான வளர்ப்பு முறையில் வேறுபாடு அடையச் செய்வதற்கு உங்களிடம் திசு கொடுக்கப்படுகிறது. கீழ்க்கண்ட எந்த இரண்டு ஹார்மோன்களை வளர்ப்பு ஊடகத்தில் நீங்கள் சேர்ப்பதால் திசுவிலிருந்து வேர் மற்றும் தண்டுத்தொகுப்பில் உருவாக்கப்படுகிறது.

இ) ஆக்சின் மற்றும் சைட்டோகைனின்

### Q - 160 பைட்டோகுரோம் என்பது.

- அ) குரோமோபுரோட்டீன்
- ஆ) பிளாவோபுரதம்
- இ) பிளாவோபுரதம்
- ஈ) லிப்போபுரதம்

Q - 160 பைட்டோகுரோம் என்பது.

அ) குரோமோபுரோட்டீன்