Exercise 3D

Question 21:

$x + (k + 1)y - 5 = 0$

$(k + 1)x + 9y - (8k - 1) = 0$

These are of the form

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

where $a_1 = 1$, $b_1 = (k + 1)$, $c_1 = -5$

$\quad\quad a_2 = (k + 1)$, $b_2 = 9$, $c_2 = -(8k - 1)$

For infinitely many solutions, we must have

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

$$\frac{1}{(k + 1)} = \frac{(k + 1)}{9} = \frac{-5}{-(8k - 1)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(k + 1)} = \frac{(k + 1)}{9} = \frac{5}{(8k - 1)}$$

Case I : $\quad \dfrac{1}{(k + 1)} = \dfrac{(k + 1)}{9}$ [Taking I and II]

$\Rightarrow (k + 1)^2 = 9 \Rightarrow (k + 1) = \pm 3$

$\quad k + 1 = 3 \quad$ or $\quad k + 1 = -3$

$\quad k = 2$ or $k = -4$

Case II : $\dfrac{k + 1}{9} = \dfrac{5}{8k - 1}$ [Taking II and III]

$\Rightarrow (k + 1)(8k - 1) = 45$

$\Rightarrow 8k^2 + 7k - 46 = 0$

$8k^2 + 23k - 16k - 46 = 0$

$\Rightarrow k(8k + 23) - 23(8k + 23) = 0$

$\Rightarrow k(8k + 23) - 2(8k + 23) = 0$

$\Rightarrow (k - 23)(8k + 23) = 0$

$\Rightarrow \quad\quad\quad k = \dfrac{-23}{8}$ or $k = 2$

Case III : $\dfrac{1}{(k + 1)} = \dfrac{5}{(8k - 1)}$ [Taking I and III]

$\quad 8k - 1 = 5(k + 1)$

$\quad\quad 3k = 6 \Rightarrow k = 2$

Thus, $k = 2$ is the common value for which there are infinitely many solutions

Question 22:

$(k - 1)x - y - 5 = 0$

$(k + 1)x + (1 - k)y - (3k + 1) = 0$

These are of the form

$$a_1 x + b_1 y + c_1 = 0, \quad a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$$

where, $a_1 = (k - 1)$, $b_1 = -1$, $c_1 = -5$

$a_2 = (k + 1)$, $b_2 = (1 - k)$, $c_2 = -(3k + 1)$

For infinitely many solution, we must now

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

$$\frac{k - 1}{k + 1} = \frac{-1}{-(k - 1)} = \frac{-5}{-(3k + 1)}$$

$$\frac{k - 1}{k + 1} = \frac{1}{(k - 1)} = \frac{5}{(3k + 1)}$$

Case I : $\dfrac{k - 1}{k + 1} = \dfrac{1}{(k - 1)}$ [Taking I and II]

$(k - 1)^2 = k + 1$

$\Rightarrow k^2 + 1 - 2k = k + 1$

$\Rightarrow k^2 + 1 - 1 - 2k - k = 0$

$\Rightarrow \quad k^2 = 3k \Rightarrow k = 3$

case II : $\dfrac{1}{(k - 1)} = \dfrac{5}{(3k + 1)}$ [Taking II and III]

$(3k + 1) = 5(k - 1) \Rightarrow 3k + 1 = 5k - 5$

$- 2k = -6 \Rightarrow k = 3$

Case III : $\dfrac{k - 1}{k + 1} = \dfrac{5}{(3k + 1)}$ [Taking I and III]

$(k - 1)(3k + 1) = 5(k + 1)$

$3k^2 + k - 3k - 1 = 5k + 5$

$3k^2 - 2k - 5k - 1 - 5 = 0$

$3k^2 - 7k - 6 = 0$

$3k^2 - 9k + 2k - 6 = 0$

$3k(k - 3) + 2(k - 3) = 0$

$(3k + 2)(k - 3) = 0$

$(3k + 2) = 0$ or $(k - 3) = 0$

$3k = -2$ or $k = 3$

$k = \dfrac{-2}{3}$ or $k = 3$

k = 3 is common value for which the number of solutions is infinitely many.

********** END **********