



Definite Integrals Ex 20.4A Q4

We know

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

Hence

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2}-x)}}{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2}-x)} + \sqrt{\cos(\frac{\pi}{2}-x)}} dx$$

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

If

$$I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

Then

$$I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

Hence

$$2I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} + \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$$

$$2I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} 1 dx$$

$$2I = \frac{\pi}{6}$$

$$I = \frac{\pi}{12}$$

Definite Integrals Ex 20.4A Q5

We know

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

Hence

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x}{1+e^x} dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2(-x)}{1+e^{-x}} dx$$

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x}{1+e^x} dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x}{1+e^{-x}} dx$$

If

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x}{1+e^x} dx$$

Then

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x}{1+e^{-x}} dx$$

So

$$2I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x}{1+e^x} + \frac{\tan^2 x}{1+e^{-x}} dx$$

$$2I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x}{1+e^x} + \frac{\tan^2 x}{1+e^{-x}} dx$$

$$2I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x}{1+e^x} + \frac{e^x \tan^2 x}{1+e^x} dx$$

$$2I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x + e^x \tan^2 x}{1+e^x} dx$$

$$2I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{(1+e^x) \tan^2 x}{1+e^x} dx$$

$$2I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x + e^x \tan^2 x}{1 + e^x} dx$$

$$2I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{(1 + e^x) \tan^2 x}{1 + e^x} dx$$

$$2I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$$

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$$

We know

If $f(x)$ is even

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

If $f(x)$ is odd

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

Here

$$f(x) = \tan^2 x$$

$f(x)$ is even, hence

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2 x - 1 dx$$

$$I = \left(\tan x - x \right)_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$I = 1 - \frac{\pi}{4}$$

Note: Answer given in the book is incorrect.

Definite Integrals Ex 20.4A Q6

We know

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

Hence

$$\int_{-a}^a \frac{1}{1+a^x} dx = \int_{-a}^a \frac{1}{1+a^{-x}} dx$$

If

$$I = \int_{-a}^a \frac{1}{1+a^x} dx$$

Then

$$I = \int_{-a}^a \frac{1}{1+a^{-x}} dx$$

So

$$2I = \int_{-a}^a \frac{1}{1+a^x} + \frac{1}{1+a^{-x}} dx$$

$$2I = \int_{-a}^a \frac{1}{1+a^x} + \frac{a^x}{1+a^x} dx$$

$$2I = \int_{-a}^a 1 dx$$

$$2I = 2a$$

$$I = a$$

***** END *****