


## Classical Harmonic Oscillator

Simple Harmonic Motion: Hooke's Law

$$F = -kx$$

$x(t) = \text{fcn}(t)$  i.e.  $x$  is a function of time

$$F = ma$$



---

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = -kx(t)$$

guess a solution:  $x(t) = A \sin ct$

---

LHS:  $\frac{dx(t)}{dt} = A (\cos ct) c$

---

$$\frac{d^2 x(t)}{dt^2} = -c^2 A \sin ct$$

---

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = -m c^2 A \sin ct$$

---

RHS:  $-kx(t) = -kA \sin ct$

---

LHS=RHS  $-m c^2 A \sin ct = -kA \sin ct$   
 $mc^2 = k$

---

$$c = (k/m)^{1/2} \quad x(t) = A \sin((k/m)^{1/2} t)$$

---

$$x(t) = A \sin(2\pi\nu t) \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m}$$

---

Potential:  $\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right) = -F \quad V = -\int F dx$

---

$$V = \int kx dx = \frac{1}{2} kx^2$$

---

Total Energy :  $E = E_K + V = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} kx^2 = ?$

---

when  $x(t) = A \quad E_K = 0 \quad$  then  $E = \frac{1}{2} kA^2$

---

For diatomic molecules replace  $m$  by  $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$