



<http://www.biodiversitylibrary.org>

Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...

Holmiae : Impensis Laurentii Salvii, 1753.

<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 2: <http://www.biodiversitylibrary.org/item/13830>

Page(s): Title Page, Text, Page 866, Page 867, Page 868, Page 869, Page 870, Page 871, Page 872

Contributed by: Missouri Botanical Garden

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 17 April 2011 10:33 AM

<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf3/006507500013830>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:ITIS SVECIE ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS DE STELLA POLARI;

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS II.

Cum Privilegio S. R. Mitis Sueciæ & S. R. Mitis Poloniæ ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

CAROLI LINNÆI

et Carolus Linnæus Botanicæ, Medicæ & Botanice
Professor. Upsalæ; Edidit STEPHANUS LÖNNERUS

SPECIES

PLANTARUM

EXHIBENTUR

PLANTAS RITE COGNITAS

AD

GENERATA RELATAS

COM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS

NUMERIS TRIVIALIBUS

SYNONYMIS STRICTIS

LOCIS NATURALIBUS

SECUNDUM

SYSTEMA NATURÆ

EDITIONE

TERCIÆ

Caroli Linnæi & Caroli Linnæi Botanicæ, Medicæ & Botanice
Professor. Upsalæ; Edidit STEPHANUS LÖNNERUS

HOLMÆ
LAPIDARIIS

866 SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA.

Tussilago scapo imbricato, floribus spicatis radiatis, foliis infra incanis acutis. *Gmel. sib. 2. p. 150. t. 70.*

Petasites scapo paucifloro, foliis subtus tomentosis albissimis. *Hall. helv. 707.*

Cacalia tomentosa. *Bauh. pin. 198. prodr. 102. Scheuch. alp. 130. t. 18. f. 1.*

Habitat in Alpium Lapponiæ, Helvetiæ, Sibiriaë convallibus. 4

alba.

5. **TUSSILAGO** thyrsis fastigiato, flosculis femineis nudis paucis. *Hort. cliff. 411. Fl. suec. 681. Roy. lugdb. 159.*

Petasites minor. *Bauh. pin. 197.*

Petasites flore albo. *Cam. epit. 593.*

Habitat in Europa. 4

hybrida.

6. **TUSSILAGO** thyrsis oblongo, flosculis femineis nudis plurimis. *Hort. cliff. 411. Roy. lugdb. 159. Gort. gelr. 478.*

Petasites major, floribus pedunculis longis insidentibus. *Dill. elth. 309. t. 230. f. 297.*

Petasites in medio majoribus flosculis, reliquis minoribus. *Buxb. hal. 258.*

Habitat in Germania, Hollandia. 4

Petasites.

7. **TUSSILAGO** thyrsis ovato, flosculis omnibus hermaphroditis. *Hort. cliff. 411. Fl. suec. 685. Mat. med. 390. Roy. lugdb. 159. Dalib. paris. 256.*

Tussilago major. *Cam. epit. 592.*

Petasites major & vulgaris. *Bauh. pin. 197.*

Habitat in Europa temperatiore. 4

SENECIO.

* *Floribus flosculosis.*

hieracifolius 1. **SENECIO** corollis nudis, foliis amplexicaulibus laceris, caule herbaceo erecto. *Hort. ups. 261.*

Senecio foliis lanceolatis amplexicaulibus levibus acute sinuatis denticulatis, caule herbaceo. *Hort. cliff. 406. Roy. lugdb. 163.*

Senecio americanus altissimus, blattariæ s. hieracii folio. *Herm. par. 226. t. 226.*

Habitat in America septentrionali. ☉

divaricatus. 2. **SENECIO** corollis nudis, foliis lanceolatis dentatis scabris ramulis floriferis divaricatis. *Habitat in China. Osbeck.*

Cau-

Caulis erectus, angulatus, angustus, sesquipedem altus, Folia alterna, remota, lanceolata, petiolata, serrato-dentata, tomentoso-scabra. Ramorum tantum rudimenta ex alis foliorum. Ex supremis alis foliorum aliquot ramuli cum floribus, basi admodum divaricati. Flores terminales, aliquot, pedunculati, magnitudine præcedentis, Calycibus basi squamis aliquot laxis subulatis adpersis.

3. SENECEO corollis nudis, scapo subnudo longissimo. *PseudoChina* Roy. lugdb. 164.

Senecio maderaspatanus, rapæ folio, floribus maximis, cujus radix a nonnullis China dicitur. *Dill. eit.* 345. t. 258. f. 335.

Habitat in India. ☞

4. SENECEO corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. *Roy. lugdb.* 165. *Hall. belv.* 733. *Fl. suec.* 690. *Dalib. paris.* 257.

Senecio foliis pinnatifidis denticulatis: laciniis æqualibus patentissimis: rachi lineari. *Hort. cliff.* 406.

Senecio minor vulgaris. *Bauh. pin.* 131. *Fl. lapp.* 296.

Erigerum minus. *Dod. pempt.* 641.

Habitat in Europæ cultis, ruderatis, succulentis. ☉

* *Floribus radiatis: radio revolutis.*

5. SENECEO corollis revolutis, foliis sessilibus sinuatis, trifloris. calycibus conicis: squamis minimis intactis. *Hort. ups.* 261.

Senecio foliis pinnatifidis: laciniis inæqualibus erectis. *Hort. cliff.* 406.

Senecio foliis sinuatis petiolatis, pedunculis folio longioribus, florum radiis disco brevibus. *Roy. lugdb.* 165.

Jacobæa ægyptica, senecionis folio, semiflosculis vix conspicuis. *Vaill. act.* 1720. p. 298.

Habitat in Ægypto. ☉

6. SENECEO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus ægyptius, sinuatis, squamis calycinis brevioribus integris spha-celatis. *Hort. ups.* 261. *

Jacobæa ægyptica, senecionis folio, flore minore. *Vaill. act.* 1720. p. 298.

Habitat in Ægypto. ☉

7. SENECEO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus lividius, lanceolatis dentatis, squamis calycinis brevissimis intactis. *Hort. ups.* 261. *

868 SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA.

Senecio foliis sinuatis: basi latioribus amplexicaulibus, floribus corymbosis, radiis disco brevioribus. *Roy. lugdb.* 165?

Habitat in Hispania. ☉

trilobus.

8. **SENECIO** corollis revolutis, foliis amplexicaulibus, squamis calycinis sphacelatis laceris. *Hort. ups.* 261. *
Habitat in Hispania. ☉

viscosus.

9. **SENECIO** corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. Senecio foliis pinnatifidis sessilibus: laciniis angulosis: superioribus latioribus, florum radiis disco brevioribus. *Roy. lugdb.* 142. *it. Wgth.* 142. *Dalib. paris.* 258. Senecio hirsutus viscidus graveolens. *Dill. elth.* 347. t. 258. f. 336.

Senecio incanus pingvis. *Bauh. pin.* 131.

Habitat in Europæ pagis, urbibus. ☉

sylvaticus.

10. **SENECIO** corollis revolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboso erecto. Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, florum radiis revolutis linearibus. *It. Wgth.* 326. *Fl. suec.* 689. *Dalib. paris.* 258.

Senecio minor, latiore folio, f. montanus. *Bauh. pin.* 131. *Dill. elth.* 258. t. 258. f. 337.

Jacobæa, senecionis folio incano, perennis. *Raj. hist.* 285. *Hall. jen.* 177. t. 4.

Habitat in Europæ borealis sylvis ceduis. ☉

glaucus.

11. **SENECIO** corollis revolutis, foliis amplexicaulibus, linearibus pinnato-dentatis: laciniis linearibus integris. *Roy. lugdb.* 164.

Jacobæa ægyptia annua, coronopi folio glauco. *Vaill. act.* 1720. p. 297.

Jacobea ægyptia, folio glauco coronopi. *Boerb. lugdb.* 1. p. 99.

Habitat in Ægypto. ☉

* *Floribus radiatis: radio patente, foliis pinnatifidis.*

bastatus.

12. **SENECIO** corollis radiantibus, petiolis amplexicaulibus, pedunculis folio triplo longioribus, foliis pinnato-sinuatis. *Roy. lugdb.* 164.

Jacobæa afra perennis viscosa lutea, asplenii foliis. *Vail. act.* 1720. p. 298.

Habitat in Africa.

13. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis pinnatifidis æ- *elegans.*
qualibus patentissimis: rachi inferne angustata. *Hort.*
cliff. 406. *Hort. upf.* 260.
Jacobæa africana frutescens, flore amplo purpureo ele-
gantissimo, senecionis folio. *Volck. norib.* 225. t.
225.
Aster africanus frutescens, foliis senecionis crassioribus.
Comm. hort. 2 p. 61. t. 31.
Habitat in Æthiopia.
14. **SENECIO** corollis radiantibus planis calyce longio- *squalidus.*
ribus integris, foliis pinnatifidis: laciniis linearibus di-
stantibus. *Hort. upf.* 260.
Habitat in Europa Australi. ☉
15. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis pinnatifidis den-
tatis subhirtis, caule erecto.
Senecio scanorensis. *it. scan.* 225.
Jacobea altissima, foliis crucæ artemisiæve similibus &
æmulis. *Rupp. jen.* 164.
Jacobæa incana repens. *Barr. rar.* 1075. t. 153.
Habitat in aggeribus Europæ temperatæ.
16. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis utrinque to- *incanus.*
mentosissimis semipinnatis: laciniis subdentatis, corymbo
subrotundo. *Hall. helv.* 731.
Chrysanthemum alpinum incanum, foliis laciniatis.
Bauh. pin. 133.
Chrysanthemum alpinum I. *Clus. hist.* 1. p. 333.
Jacobæa alpina incana minor. *Barr. ic.* 262.
Habitat in Alpibus Helvetiæ, Austriæ, Pyrenæo-
rum.
17. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis pinnato-multifi- *abrotanifoli-*
dis linearibus. † *us.*
Senecio foliis decompositis. *Gvett. stamp.* 360.
Chrysanthemum alpinum, foliis abrotani multifidis.
Bauh. pin. 134.
Chrysanthemum alpinum II. *Clus. hist.* 1. p. 333. t.
334.
Habitat in Alpibus Stiriæ, Pyrenæicis.
18. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis bipinnatis li- *canadensis.*
nearibus.
Habitat in Canada. *Kalm.*
Caulis erectus, lævis. Folia bipinnata, linearia, glabra:
summa simpliciter pinnata. Corymbus terminalis,
com-

compositus, fastigiatus, flavus. Calyces rufescentes.

- Jacobæa.* 19. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. *Hort. cliff.* 406. *Fl. suec.* 688. *Roy. lugdb.* 174. *Dalib. paris.* 257. *Jacobæa vulgaris laciniata. Bauh. pin.* 131. *Herba f. Jacobi. Fuchs. hist.* 742. *Habitat in Europæ pascuis.* ♀

- arenæ.* 20. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis crenatis: infimis cordatis petiolatis; superioribus pinnatifidis lyratis. *Gron. virg.* 98. *Jacobæa virginiana, foliis imis alliariæ glabris; caulescentibus barbæræ. Moris. hist.* 3. p. 110. *Raj. suppl.* 180. *Habitat in Virginia, Canada.* ♀ *Antecedenti nimis affinis.*

* *Floribus radiatis: radio patente, foliis indivisis.*

- paludosus.* 21. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis ensiformibus acute ferratis subtus subvillosis, caule stricto. *Senecio foliis integris ferratis. Gvett. stamp.* 2. p. 559. *It. scan.* 396 * *Solidago caule simplici, corymbo terminali, foliis subtus tomentosis, flosculis femineis sedecim. Lech. scan.* 68. *Fl. suec.* 686. *Jacobæa foliis longis integris & mucronatis. Moris. hist.* 3. p. 110. f. 7. t. 7. f. 22. *Conyza palustris ferratifolia. Bauh. pin.* 266. *β. Solidago palustris altissima incana & tomentosa, foliis longioribus ferratis. Amm. ruth.* 220. *Gmel. sib.* 2. p. 162. *Habitat in Europæ paludibus maritimis.* ♀ *Variat foliis utrinque tomentosis.*

- nemorensis.* 22. **SENECIO** corollis radiantibus octonis, foliis lanceolatis biferratis subtus villosis, caule ramoso. *Senecio foliis ovato-lanceolatis subtus hirsutis, floribus umbellatis. Hall. helv.* 734. *Itin.* 23. *Jacobæa nemorensis, latiore rigidior & hirsuto folio. Rupp. jen.* 142. *Solidago foliis lanceolatis ferratis, floralibus ad pedunculum minimis. Gmel. sib.* 2. p. 165. *Habitat in Germaniæ, Sibiræ nemoribus.* ♀

23. **SENECIO** corollis radiantibus, floribus corymbosis, *farracenicus*.
foliis lanceolatis ferratis glabriusculis. *Hort. ups.* 266.
Senecio foliis lanceolatis ferratis, floralibus pedunculos
æquantibus. *Vir. cliff.* 84. *Roy. lugdb.* 163. *Gort.*
gelr. 481.
Solidago caule simplici, corymbo terminali: pedunculis
partialibus alternis nudis longitudine folii. *Hort. cliff.*
410.
Solidago farracenica. *Fuchs. hist.* 728.
Virga aurea angustifolia ferrata. *Bauh. pin.* 268.
Habitat in Helvetiæ montanis, nemorosis. 2
Dignoscitur facie, latis foliis, magnitudine, radice ma-
xime reptatrice.
24. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis obovatis car-*balimifolius*.
nosis subdentatis, caule fruticoso.
Solidago foliis obverse ovatis carnosius crenatis, caule
fruticoso, corymbo ramoso. *Hort. cliff.* 411.
Doria africana arborescens, foliis crassis & succulen-
tis triplicem referentibus. *B. Dill. elth.* 124. t. 104.
f. 124.
Habitat in Æthiopia. 5
25. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis ferrato-subspi-*byzantinus*.
nosis,
Senecio foliis crenato-dentatis; inferioribus pinnato-ly-
ratis; superioribus pinnatifidis. *Roy. lugdb.* 530.
Habitat Byzantii. 3
Caulis quadripedalis, teres, striatus, viridis, adpersus
pilis albis. Rami in inferiore parte caulis, patentissi-
mi. Folia lanceolata, sessilia, amplexicaulia, revoluta,
ferrata dentibus acutis, sinibus obtusis, acuminibus
spinoso-inermibus; supra viridia, nitida, scabriuscu-
la; subtus venosa, villosa, viridia. Ramorum rudi-
menta ex singulis alis foliorum. Scapi terminales, te-
retes, caule longe angustiores, filiformes, longissimi,
leviores, striati, inferne adpersi foliis linearibus, in-
divisis, non dentatis, sed serrato-spinosis; subnudi.
Corymbi terminales, alterni, subdivisi. Calyces api-
ce sphacelati. Corollæ luteæ: Radio octiflora, ovato,
vix tridentato. Facies *Serratula arvensis*.
26. **SENECIO** corollis radiantibus, foliis sagittatis am-*ilicifolius*.
plexicaulibus dentatis, caule fruticoso. *Vir. cliff.* 84.
Hort. cliff. 406. *Roy. lugdb.* 164.

872 SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA.

Jacobæa africana frutescens, foliis incisiss & subtus cinereis. Comm. rar. 42. t. 42.

Habitat in Æthiopia. b.

rigidus.

26 **SENECIO** corollis radiantibus, foliis cordato-oblongis amplexicaulibus scabris acuminatis ferratis, caule fruticoso. *Hort. cliff. 406. Roy. lugdb. 164.*

Jacobæa africana frutescens, foliis rigidis & hirsutis. Comm. hort. 2. p. 149. t. 75.

Jacobea africana ramosissima, foliis senecionis pinguis rigidis & lucentibus subtus incanis. Raj. supp. 179.

Habitat in Æthiopia. b

ASTER

* *Integrifolii, pedunculis nudis.*

fruticosus.

1. **ASTER** foliis linearibus fasciculatis punctatis, pedunculis unifloris nudis, caule fruticoso rugoso. *Hort. cliff. 409. Roy. lugdb. 168.*

Aster africanus frutescens, foliis angustis & plerumque conjunctis. Comm. hort. 2. p. 53. t. 27

β. *Aster maritimus fruticosus, hyssopi foliis confertis, flore albo. Pluk. mant. 29. t. 340. f.*

Habitat ad Cap. b. Spei in saxosis. b

alpinus.

2. **ASTER** foliis lanceolatis hirtis: radicalibus obtusis, caule simplicissimo unifloro.

Aster montanus cæruleus, magno flore, foliis oblongis. Bauh. pin. 267?

Aster VII austriacus V. Clus. hist. 2. p. 15?

β. *Aster atticus alpinus alter. Bauh. pin. 267.*

*Aster atticus cæruleus alpinus. Bauh. pin. 905.**

γ. *Aster hirsutus austriacus cæruleus, magno flore, foliis subrotundis. Bauh. pin. 267. prodr. 124.*

Habitat in Austria, Vallesia, Helvetia, Pyrenæis. 2

sibiricus.

3. **ASTER** foliis lanceolatis venosis scabris extimoseratis, caulibus striatis, pedunculis tomentosis.

Aster foliis ovatis oblongis supra ferratis, caulibus striatis, pedunculis unifloris umbellatis. Gmel. sib. 2. p. 186. t. 80. f. 10.

Habitat in Sibiria.

Tripolium.

4. **ASTER** foliis lanceolatis integerrimis carnosiss glabris, ramis inæquatis, floribus corymbosis. *Roy. lugdb. 168. Fl. suec. 697. Gmel. sib. 2. p. 187. t. 80. f. 2.*

Aster maritimus Tripolium dictus. Raj. hist. 270. Hort. cliff. 408.

Tri-

The following text is generated from uncorrected OCR.

[Begin Page: Title Page]

SCAROLI LINNAEI L
S: R:GLC M:Tis SvaciA ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAI~.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS DE STELLA POLARI ;

SPECIES

PL WARUM,
-E...^ * EXHIBENTES
S--'LANfAS RITE COGNITAS,
AD
GENERA RELATAS,
CUM
DIFFEKiENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TXIVIALIBUS)
SYNONYMIS SELECTIS,
LoclS NATALIBUS,
SECUNDUM
STSTE MA SEXUALE
DIGESTAS.
TOMUSII.

i i | - -. '
Cwm ?rnigies S. R. Mt*r Secda c% S. R. MtLtir Peleoir ac Eldeftiri SSaxm.
SHIOLMIAE,
' 1t " -?. itrk LAURENTII SALVI.
1753. f

[Begin Page: Text]

w

=
A. I

'4- ;t:(wJ .8JiGI

#. wO' f9; I

.2~

t 4
**ic

3 . ' '6, ' . ' 4'-

e~- wzt PIZ`cc~ it Us

v-Kf~
trn t *l"
rt&e~E

~l .
tiL- t

-. x00 :

Th k '}

i \$ "
" ' *
3 r' -s;-
tA t'4p

y)

! y j '- ' r .
i "

- *----~ c "

l, -

.,'

-- - .-"-- -!' a

'SK

qlt XIV.

* /

,
v4 ~

. i j* .

f 1

s: A.

C i. ~-

r c.

[Begin Page: Page 866]

td6 SY4GEESIA:P tLAAK:.SUIPERLUA.

Tuffilago fcapo imbri ato; ftoribus fpicatis radiatir, foliis infra incanis acutis. Gmel. Jib. z. p. io.t. .70..

Petafites fcapo paucifloro, foliis fubtus tomentofis atbiffimis. Hal. belv. 707.

Cacatia tomentofa. Baub.pin.. 98. pro.dr. o%. Sctewcb. alp. 130. . 18. f. 1.

Habitat in Alpiuin Lapponia, Helvetia, Sibiris to#-vallibus. .2

'al 5. TUSSILAGO thyrafo faftigiato, flofculis femineisnudis paucis. Hort. cliff. 411. Fl. fac. 681. Roy. lgdb. 119.

Peta tes minor. B. piBn. f 197.

* Petafites flore albo. Cam. epit. 593.

Habitat in Europa. -

lir 6. TUSSILAGO thyrafooblono, flofculis femineis nudis plurimis HMort. clif. 411. Roy. lagdb. 159. Gort. elr.4,78.

Petafites major, floribus pedunculis longis infidentibus. Dill. elth. 309. t. 236. f. 297.

Peralites in medio ma oribus, flofculs, reliquis mioribus. Buxb. hal. 2z8.

Habitat in Germania, Hollandia. -:

Petnt,. 7. TUSSILAGO thyrafo ovato, flofculis omnibus hemaphroditis. Hort. liff. 411. Fl.f xec. 68. Mat. ud. 390. Roy. lugdb. f9. Dalib. patif. 2.6.

.Tuffilagomajor. Cam. epit. S92.

Petafites major & vulgaris. Bauh. pin. 197.

Habitat in Europa temperatiore. "

SENECIO,

* Floribus foliis pinnatifidis.

bisracifolius L. SENECIO corollis nudis, foliis apiculatis lobis
lanceolatis, caule herbae erecto. Hort. xpf 261.
Senecio foliis lanceolatis amplexicaulibus levibus
finuatis denticulatis, caule herbaceo. Hort. cliff 406.
Roy. Lugdb. 166.
Senecio americanus altissimus, blattaris f. hirsuti
Hort. par. 226. t; 226.
Habitat in America septentrionali. Q)
disarticulatus. a. SENECIO corollis nudis, foliis lanceolatis
fimbriatis ramulis floriferis divaricatis.
Habitat in China. Osbeck.

- Sa*

[Begin Page: Page 867]

SYNGENESIA: POLYGAM. SUPERFLUA. 867

Caulis cretus, angulatus, augustinus, foliis serratis
S Folia altissima, remote, lanceolata, petiolata
denticulata, tomentosa-fimbriata. Ramorum terminum radi-
menta ex alis foliorum. Ex supremis alis foliorum ali-
quot ramuli cum floribus, basi admodum divaricati.
Flores terminales, aliquot, pedunculati, magnitudi-
ne precedentis, Calycibus biseriatis aliformibus
fimbriatis adpressis.
3. SENECIO corollis nudis fimbriatis longistimo. pinnatifidus
Roy. Lugdb. 164.
Senecio maderapatanus, radi folio, floribus maximis,
cujus radix a nonnullis China dicitur. Dill. eit. 34t.
t. 248. f. 33\$.
Habitat in India. ?3
4. SENECIO corollis nudis, foliis pinnato-finuatis am-
plexicaulibus, floribus pinnatis. Roy. Lugdb. 16. Hall.
belv. 733. Fl. fec 690. Dalib. parif. 217.
Senecio foliis pinnatifidis denticulatis: laciniis aquali-
bus patentissimis: rachi-linearibus. Hort. cliff. 406.
Senecio minor vulgaris. Bash. pins. 131. l ffp. 194.
Erigeron minus. Dod. pempt. 641.
Habitat in Europae calidis, ruderibus, fœculis. 0
* Floribus radiatis: radiis rewlute.
1. SENECIO corollis revolutis, foliis fimbriatis finuatis, multinerviis.
calycibus conicis: squamis minimis imbricatis. Hort.
pJ. 26r.
Senecio foliis pinnatifidis: laciniis inaequalibus erecis.
Hort. cliff. 406.,
Senecio foliis finuatis petiolatis, pedunculis folio longi-
oribus, forum radiis difformibus brevibus. Rpy. lgd. 16\$.
Jacobaea arabica fenecionis folio fimbriatis vix
confunditur. Vail. at. 1710. p. 298.
Habitat in 1 Egypto. 0

6. SENEIO corollis revolutis, foliis amplexicatlibus d~at#.
fquatis, fquamis calycinis brcvioribus integris fpha-
Cetlaris. Hort. pf z6. *
wacobza agyptica fenecionis folio, fore minore. aill.
46. 17,10-. 294.
abibat i Egypto. 0
7, S ECIO corollis revolutis, foliis amplexicaulbas lividst
lanceolatis dentatis, fquamis calyc sr breviffimti itf-
k . i"ert. pf. 26-.. *

I i ii

Sene-

[Begin Page: Page 868]

SW &NGENESTA: POLYGAM.SUPERFLUA.

trilsbks.

vifcerju.

fylvatie!U.

5laucai.

bl atmu.

Senecio foliis finuatis : bafi latioribus amplexicaulibus,
floribus corymbosis, radiis difco brevioribus. Roy.
lagdb. 6y?

Habitat i Hifpania. 0 .

8. SENECIO corollis revolutis, foliis amplexicaulibus,
fquamis calycinis fphacelatis laceris. lort. upf. 261. *
Habitat it Hifpania. 0

9. SENECIO corollis raeolutis, toliis pinnatifidis vifci-
dis, iquamis calycinis laxis longitudine perianthii.
Senecio foliis pinnatifidis fevilibus: laciniis angulofis 'fa-
perroribus latioribus, florum radiis difco brevioribus,
Roy. lugdb. 142. it. (Fgotl. 142. Dalib. parif. 158.
Senecio hirtutus vifcidus graveolens. Dill. elth. 347. t.
. g8. f. 136.

Seiecio incanus pingvls. 8a*h6.:par. 131.

Habitat in Edrope pagis, urbibus. 0

io..SENECIO corollis revolutis, foliis pinnatifidis4d•nt
culatis, caule corymbpfo ere&o.

Senecio foliis pinnatifidis denticulatis, florum raditi re-
volutis linearibus. It. Wgtb. 326. Fl. fec. 689.D4lib
farj] a.8. .

Senecio minor, latiore folio, C. montanus. Baab. pit.
131. Dill. etb. 20, s. i 8. . .337.

Jacobae, fenecionis folio incano, perennis. Raj. bt.
.2.&. Hall. jea. 177.t. 4.

Habitat in Europa borealis fylvis cedais. 0

11. SENECIO corollis revolutis, fbols amplexicaulibus,
linearibus pinnato-dentatis: laciniis linearibus ltegru.
RAoe. igdb. l64.

Jah:4iegyptia annua, coronopi folio glauco. .raill.
'y. ttf :pf. "-97. -

Jacobea agyptia, folio glauco coronopi. Boeri. Idl'a
1.p. 99.

Habtta~ it -Egypto. 0 .

* Floribi radiatis: rtdi patenstoliis pinatildi

x2. SENECIO corollis radiantibus, petiolis ampleica"
libus, pedunculs folio triplo longoribus, foluis pia
nato-finuais. Roy. lhdb. 164.

Jacobma afra perennis vifcofa utea, afplcnii folii* 'l.

- Habts. l a. T?.

I

[Begin Page: Page 869]

SWYNGENESIA: POLYGAI.: SUPEREi~ LA.'S69

13. SENEGIO corollis rasantibus, foliis pianatidis a- leega/ .
qualibus *patentiflimis: rachi inferne anguftata. fort.

- ; i f 4P. H rt. upf ,260.
 Jacobaa arificaha frutfcetes, flore amplo purp rteO le-
 ' antiflimo, fenecionis folio. Voick. nori. izf. t.
 S 'zz . ' " -
 After africanmis frutefcens, f6"ls fenecionis orfioribus.
 Comm. hort. z p. 6t..t. 31.
 i Habitatin .Ethiopia.
14. SENECIO corQdi ardtanis pl is. calyce elio- ruti•
 Sribus integris, follis pinnafidis: lacinis linearibbs di-
 .~antibuS, lo... F fr.' . : . ; .
 Si.)birtat in Europ. Asftrali. -Q
- IT. SENECIO corollis radiantibus, foliis pinnatifidis den-
 tatis fubhirtis, caule ereo6.
 Senecio fcanorenfis. it. fjan.'zzsy.
 Jacshea altiffi~a, foliis eruca artemifieve fiqilibqs &
 :muis. Rupp. jer.. l6 .
 Jacibaea incana repenis: lrai.ra- 1 . yf..'... .
 „Habitat iragg'rbu `rru ue/erati ^ ""
- d1. SENECIO corollis radiantibus, fois utnoque to- incur.
 Smetolfitsr 'fc ipinnatis; -lacniis fubdentatis, corymbo
 fubrotundo. Hall. heAl. 73i.
 Chryfanthemum alpinum incanum , ffoliis lacinuatis.
 `a, pin., 133 -
 thrylanthemum alpinum i, CUf. •1 . P. J . 333-
 Jacoba alpia inc•;i m •r. . ic. .. l .
 Ai n~ur p Ai'haltx Hlvet•1, Aua•Vie, Pyreuno-
7. SENECIO corollis radian~ibus, foliis pin•ato-tnultifi- tarifo/i-
 dis linearibus. t
 Senecio fol;is decompbfitis. G •ent. ap. ~ 60.
 Chryfanthemum alpinumn, foliis abrotani multifidis.
 Boash. pis. 134.
 •hryfanthemum alpinum H. Cluf. bif. . P. 333. t
 3.'itat in Alpibus Stiriadis', Pyrenaicis.
- r8. SENECIO corollis radiantibus, foliis bipinnatis li- canadenl.
 ""eatibas.
 Habiltt in Canada. Kalm.
 Caulis etssat levis. F.OiFo bipin•sr , linearia,glabra:
 famma fimpliciter pinata. Corymbus termials,
 l i 3 tom-

[Begin Page: Page 870]

- St•IrVGENESIA: POLYGAM SUPERFL•TA.
 vetipuflixs, fafigiaatwi flavts: Callces tr4fefrte
 tar. :
 3 ,a<. 19. SENECIO corollis radiantibus, foliis pinnato-lyra-
 tis. ladrtiis lacinulatis dcaule ereeo. Hort. clff. 406..
 Fl. fuic. 688. Rby. lugdb. ' 74. Dalib. pars'f a~7.
 Jacobaa vulgaris laciniata. l3auk pia. r3t.

Hiera f. Jacobi. Fuchf. 'ift. 742.
 Habitat in Europe pafrits. 2c
 iuS, 0 o. SENECIO corollis radiantibus, foliis crepatis: in'
 'fimis coraatis petiolatis; fTterioribus' pinatifidis ly-' ;
 rais.' Grin. irg. 98:' ,
 Jacobaa virginiana, foliis imis alliararia glabris; caule-
 fcentibus barharea. MJorif. bift 3. o. . Raj.fAppl.
 abtat ix Virgini, Canada. .
 Attecedetri t sism a ri s
 * Flrtibus radiatis: radio pate•, folis indiifis
 ta What, ZI. SENECIO.corollis radiatibus,foliis eriformibus-
 cute ferratis fubtus fub•iUOs, caule ftriao.
 Senecio foliis integris ferratis. Gvett. flamp, z. p. 5ff9
 ' Soldago-eaule finfplid ;corymbt terminall, fblits fub-
 tus tomentofis, flofe~ih fertitcis fedecim. Lec.fci#.
 68. F. f~ir. 686.
 Jacoba foliis longis integris & mucrohatis. Morif •bfl.
 3. p. ii6. f 7. t. 7.. 'fz. :. l
 Conyza patultris ferratifolla. Bamt. pi.. i66.
 ig Solidago pailuftris'alstisia iricanas & lomentou, foliis
 longioribus ferratis. Amm. ruth. zzo. Gmdd;. f. 2.
 Habitat in Europa paldtbus martims. l
 Variat faliss aurirquse fle s/is. .
 asoe mft,. 22. SENECIO corollis radiantibus o.lontis, fonlls lah-
 ceolatis biferratis fubtus villofis, caule ramofo.
 Senecio foliis ovato-lanceolatis fubtus hirfitis, fldribus
 umbellatis. Hall. helv. 734. Itix. 23.
 Jacobas nemorenfis, latiore rigidiore & hifuto folik
 oidpp. fUs. 142.
 Solidago foliis lanceolatis ferratis, floralibusad pedaa-
 culum minimis. Gmel. fib. . p.6. . .
 Hltaihs ie Germanie, Sibiria w moribus. a
 22. SE*

[Begin Page: Page 871]

SYGEWESIA: PQLY4I4AfM SUP RFLUA. 87g

.,, SEhl CiO corollis radiantibus, floribus corymbosis, farracvit.
 foliis- Inceolatis ferratis glabiiufculis. Hort. pf..z66.
 Senecio foliis lanceolatis ferratis floralibus pedunculos
 pquantibus. Vir. cliff. 84. Roy. lugdb. 163. Dort.
 gelr. 4 91
 Sofdago caule fimplici, corymbo terminali: pedunculis
 partialibus alternis nudis longitudine folii. Hort. clif.
 S'410.
 Solidago farracenica. Fuchf. hbif. 728.
 'Virg aurea angiuftifolla feirata. Bauh. pi. 268&
 Habitat ti Helvetis moirtaias, 'eniTorofis. .

Dignoscitur facie, latis foliis, magnitudiue, radcie maxime reptatrice.

24. SENECIO corollis radiantibus, foliis obovatis carbalimifelis. nofis fubderitatis, caule fruticolo.

Soliago foliis obvrfe ovatis carnocis crenatis, caule fruticofo, corymbo ramofo. Hort. cliff. 411.

Doria africana arborefcens, foliis craflis & fucculgn: t s atriplicern referentibus. B. Pill, etls. 24. t. 104.

"Hbiataiin JEthiopfa, t

2f. SENECIO ccrollis radiantibus, folfis ferrato-fubfpi-yrantinws.

einecio foliis creniato-dentatis; Inferioribus pinnato-ly-1is ; fuperioribus pinnatifidis. Roy. lagdb. 530.

Habitat Byzantii.)

Caulis quadripedalis, terer, flriatst, wiridis, adfferfus pills albis. Rami is infersore a i prs , ateiti:ijf mi..Folia lanceolata, fejfilia, aesplexicaulia, revoluta, ferratt dettibus acutis, finbum obtufis, acuminibus fpi ofo-ianermibus; fu•ra viridia, itsida, fcabriufc-,a; febtus ,euofa, illofa , viridi4. Ramorum radi-menta ex fingulis alis foliorum. Scapi terminales, terrtr, caide laoge astgafltires , fliformcs , loatgif~mi, Ltviore, firtati, infcrl adfpcJ /i Folis linearibats, indiifis, non dau;gis, cd ferrata-fpfinfis; fubnudi. 'Cor mbi termintr, alt rni, fubdivifi. Calyces api-refphacelati. Corollac luteae: Radio ocliflore, ovdto, Six tridentato. Facies Serrasate ar•efis.

z6. SENECIO corollis radiantibus, foliis fagittatis amtlicifoyiW.

pltxicaulibus dentatis, caule fruticofo. Vir, clif. 84.

for. cliff. 406. Roy. lugdb. 164.

I ti4

Ja-

[Begin Page: Page 872]

S7i SYNGENESIA: POILfGAM: SUPE11-LUA.'

Jacobaa africana frut-fcens, foliis incifis & fubtts cine-reis. Comm. riir. 4.. 41.

Habitat sn JEthiop.pi ,.

rigtiar. 6 SENECIO corollis radiantibus, foliis cordato-oblongis amplexicaulibus fcabris acuminatis ferratis, <aSle fruticofo. Hort. cliff. 406. Roy. lagdb. 164.

Jacobea africana frutefcens, foliis rgidis & hrfutis.

Comm. hort. 2. p. 149. t. 75.

Jacobca africana ramofisfima, foliiS fenecionis pinguis rigidis & lucentibus fubtus incanis. R4j. fu pp. 79.

Habitat in JEthiopia. B

ASTER

' fnUg rifii, pedunculis ndis,

frntieofu. I. ASTER foliis linearibus fafciculatis punaatis, pddon-culls unilloris nudis, aalce fruticofo rugofo. Irt. cliff.

409. Roy.ligdb. 168.

After africanus frutescens, foliis atgiftis & ptermnque
conjunctis. Comm. hort. 2. p. 5. t. 27

8. After maritimus fruticosus, hyfopi foliis confertis, flore albo. Pluk. mant. 29. t. 340. f.

Habitt ad Cap. b. Spei i faxofis. -

alpina. z. ASTER folis lanceolatis hirtis: radicalibus obtusis, caule. iihpieisfimo unifloro. :

After montanus caruleus, :magnusflo e, Foliis ob)6ngis-Banb. ptiB. 267?

After VII auftriacus V. Clxf. Ab/L i. . ;f?

0. After atticus alpinus alter. Baub. pm. 267.

After atticus caeruleus alpinus. Banb.. pi . 90. o

y. After hirtus auftriacus s caeruleus, magno flore, foliis fubrorundis. Baxb. pi, 267. prodr. 124.

HeAtbitl in Antria, Vallefi, Helvetia, Pyrenais. Y

fbiics. 3. ASTER foliis lanceolatis venosis fcabris extimo-ferratis, caulibus friatis, pedunculis tomentosis.

After foliis ovatis oblongis fupr~ferratis, caulibus fristis, pedunculis unifloris umbellatis. Gmel.f/b. t.;P 86. st. So.f. 10.

Habitat ix Sibiria.

i*reswm 4. ASTER folis lanceolatis integerrimis carnosis glabratis inaequalis, floribus corymbosis. Roy. Ir .168i .

Fl. fJee. 697. Gmel.Jfi. 2. p. 1 b7. a 6. f. a.

After maritimus Tripoliuml-us. Raj. bF, z7o.Htor
clif. 408. Tn-