

1 INTRODUÇÃO

A despeito das muitas críticas, as pesquisas existentes que permitem avaliar, sob alguns aspectos, o sistema de classificação empregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para identificar grupos raciais, sugerem sua adequação à investigação empírica das desigualdades raciais na sociedade brasileira. Embora seja plausível supor que existam em algum grau imperfeições e erros na definição da pertença dos indivíduos aos grupos raciais delimitados pelas categorias da classificação, a quase totalidade das pessoas se enquadra em um dos cinco grupos disponíveis e também aponta a categoria daqueles por quem responde, como as crianças. Se há um observador externo – como um entrevistador – e a opinião deste sobre o enquadramento racial é registrada, na maior parte dos casos a escolha é referendada. Mesmo quando há total liberdade para a declaração de “cor ou raça”, sem uma classificação definida *a priori*, muitos mencionam espontaneamente um dos cinco grupos do IBGE, sem que qualquer referência a estes tenha sido feita. Essas evidências em favor do sistema classificatório de “cor ou raça” do IBGE, levantadas por várias pesquisas, foram aqui coligidas e serão apresentadas ao longo do trabalho.

Para a discussão do sistema, optou-se pelo tratamento separado de seus dois componentes principais, a classificação em si e os métodos de identificação. Todo sistema de classificação racial pode ser considerado como dotado dos dois componentes principais referidos. A classificação racial é entendida como o conjunto de categorias em que os sujeitos da classificação podem ser enquadrados. Por sua vez, o método de identificação é entendido como a forma pela qual se define a pertença dos indivíduos aos grupos raciais. Enquanto a classificação racial varia praticamente de país para país, os métodos de identificação racial são relativamente poucos, com variantes. No sistema classificatório em foco, são empregadas cinco categorias de “cor ou raça” que definem igual número de grupos raciais; e a identificação racial é realizada por meio do uso simultâneo de auto-atribuição e de heteroatribuição de pertença.

Na segunda seção, serão discutidos métodos de identificação racial; na terceira, aborda-se a classificação, que tem, atualmente, cinco categorias: branca, preta, parda, amarela e indígena. Por fim, após a conclusão, é apresentado um apêndice no qual são relacionadas as principais fontes de informação que permitem a produção de indicadores por raça.

2 MÉTODOS DE IDENTIFICAÇÃO RACIAL

Um método de identificação racial é um procedimento estabelecido para a decisão do enquadramento dos indivíduos em grupos definidos pelas categorias de uma classificação, sejam estas manifestas ou latentes. Existem basicamente três métodos de identificação racial, que podem ser aplicados com variantes.¹ O primeiro é a auto-atribuição de pertença, no qual o próprio sujeito da classificação escolhe o grupo do qual se considera

1. A auto-atribuição, por exemplo, pode ser registrada pelo próprio sujeito em um formulário ou pode ser respondida ao entrevistador que a registra.

membro. O segundo é a heteroatribuição de pertença, no qual outra pessoa² define o grupo do sujeito. O terceiro método é a identificação de grandes grupos populacionais dos quais provieram os ascendentes próximos por meio de técnicas biológicas, como a análise do DNA. Não há como garantir congruência entre as classificações dos sujeitos obtidas mediante a aplicação desses métodos. Todavia, é razoável esperar convergência quando os sujeitos da classificação se apresentarem de forma próxima ao estereótipo de um grupo, e o contrário se forem indivíduos na fronteira entre dois grupos. Nada impede que mais de um método de identificação seja empregado para a atribuição de pertença. No sistema classificatório do IBGE, são empregados simultaneamente os métodos da auto-atribuição e da heteroatribuição de pertença.³

2.1 IDENTIFICAÇÃO BIOLÓGICA

Antes de proceder-se à análise dos prós e contras da auto-atribuição e da heteroatribuição de pertença, faz-se necessário abordar brevemente os métodos biológicos de identificação racial, aparentemente revestidos da tão desejada “objetividade científica”. Com os progressos da biologia e da genética, tornou-se possível estabelecer, a partir da análise de DNA, quais seriam os grandes grupos “raciais” a que teriam pertencido os ancestrais de uma pessoa. Porém, ressalva-se de pronto que esses métodos devem ser rejeitados por uma razão muito simples: não existe correspondência direta e necessária entre os grupos “raciais” que podem ser definidos pelo emprego desses métodos e os grupos “raciais” que as sociedades reconhecem e usam para distinguir e hierarquizar seus membros. A sociedade não precisa saber quão negra é uma pessoa ou o são seus ancestrais, basta saber se, em seu contexto relacional, sua aparência a torna passível de ser enquadrada nessa categoria para considerá-la uma vítima potencial de discriminações, diretas ou estruturais. Nunca se teve notícia de um porteiro de prédio que exigisse um laudo técnico ou um microscópio eletrônico para decidir mandar o sujeito que considerou mais escuro entrar pela entrada de serviço.

Recentemente, uma firma estadunidense dedicada à pesquisa genética⁴ colocou no mercado um serviço que consiste em determinar, a partir de algumas células de uma pessoa, sua origem “racial”, fato que teve ampla divulgação na imprensa brasileira e internacional, justamente por parecer a realização do sonho da identificação racial perfeita e objetiva. Porém, não foram cientistas desse mesmo campo que no pós-guerra deram o maior peso à declaração de que não havia bases biológicas para a delimitação de raças na espécie humana? Se só existe uma raça humana, como um teste de DNA pode informar a origem racial de uma pessoa? É um paradoxo que merece maior esclarecimento.

A alegação de que biologicamente só existe uma raça humana pode ser politicamente correta, mas é extremamente problemática. Está certo que a maior parte do genoma dos indivíduos parece ser igual. Entretanto, os humanos também compartilham grande parte do genoma dos chimpanzés, que são uma espécie completamente

2. Nada impede que a identificação por heteroatribuição seja realizada por mais de um observador externo.

3. A despeito da idéia generalizada segundo a qual a identificação racial nas pesquisas do IBGE se faz exclusivamente por auto-atribuição.

4. A empresa DNAPrint Genomics, de Sarasota, Flórida, cujo sítio é <www.dnainprint.com>. Há um URL específico para o teste de ancestralidade: <www.ancestrybydna.com>.

distinta. Será que com base nesse intenso compartilhamento genético as pessoas estariam dispostas a considerar que os humanos e os chimpanzés fazem parte de uma só espécie?⁵ O conjunto de informações genéticas que diferencia espécies e indivíduos de uma mesma espécie pode ser diminuto, mas é importante. Dos bilhões de nucleotídeos que compõem o DNA, apenas uma pequena sequência de cento e poucos deles é responsável pela forma das hemácias do sangue. Porém, indivíduos que tenham apenas alguns desses nucleotídeos fora da ordem normal podem vir a ter talassemia ou anemia falciforme, o que tornará a vida e o sangue dessas pessoas completamente diferentes das demais.

É interessante fazer aqui uma analogia com outras espécies – por exemplo, os cães. Não há nenhum problema em reconhecer que um *poodle*, um labrador e um dogue alemão são cachorros de raças diferentes. Também não há problema em reconhecer que essas raças terão personalidades e comportamentos distintos, que umas se prestam à companhia e outras à guarda, que umas serão mais suscetíveis ao adestramento e outras não. Entretanto, o mapeamento do genoma dos cachorros diz que essas raças tão distintas em aparência física são praticamente idênticas geneticamente. Prosseguindo um pouco mais na genética canina, vê-se que as raças que conhecemos hoje, em sua maioria, tiveram seus “padrões” estabelecidos no século XIX: algumas já eram bem antigas, mas tinham variações que fugiam à uniformidade. Contudo, quando o homem tornou o cão seu companheiro, tal variedade não existia.

As raças caninas foram criadas artificialmente: pode-se imaginar que alguém conseguiu um cachorro que tinha uma habilidade especial muito prezada em uma comunidade, por exemplo, a da caça, e percebeu que os filhotes nasciam com tendências inatas semelhantes. Assim, por meio do controle dos cruzamentos, isto é, fazendo com que aquele cão se reproduzisse com outros de características semelhantes, as características desejáveis foram sendo reforçadas e, progressivamente, após várias gerações de cães, chegou-se a uma raça com características apropriadas para a realização de um determinado trabalho para o homem. De fato, é por meio de cruzamentos seletivos de indivíduos com características desejáveis que os criadores perpetuam as raças de cães. Os vira-latas são a prova cabal de que se *poodles* não são cruzados com *poodles* em algumas gerações, a maior parte das marcas distintivas da raça desaparece.

Assim como o dogue alemão é fisicamente muito diferente do *poodle*, embora geneticamente seja praticamente idêntico, um nórdico é geneticamente muito próximo a um pigmeu, ainda que sejam completamente distintos na aparência externa. Uma criança pigmeia pode crescer e viver na sociedade norueguesa, e o contrário também, mas tudo dependerá de como os outros encararem a diferença: se os pigmeus considerarem que, por causa da diferença de aparência, o norueguês será incapaz, estarão vaticinando uma profecia auto-realizável.

A genética evolucionista explica as diferenças físicas entre grupos de indivíduos, nas quais as sociedades vêem raças, como o produto de uma longa evolução na qual o acaso e a seleção natural tiveram papéis importantes, sendo meras especulações os julgamentos sobre a preponderância de um ou de outro fator. Comunidades humanas relativamente isoladas são por restrição geográfica endogâmicas e, ao longo da su-

5. Alguns cientistas estão. Como toda regra, esta também tem suas exceções.

cessão de muitas gerações, acabam por surgir determinados tipos de mutações genéticas em alguns indivíduos. Todavia, não se tratam de mutações radicais: como o organismo humano já alcançou um grau elevado de adaptação ao ambiente, é pouco provável que uma mutação radical proporcione a um indivíduo maior chance de sobrevivência e torne suas chances de reprodução maiores. Daí vem a extrema semelhança genética da espécie.

Porém, como mostra o geneticista italiano Cavalli-Sforza (2003), determinadas mutações pequenas podem representar vantagens para os indivíduos: assim, uma pele mais clara teria sido uma vantagem para populações que se alimentavam à base de trigo, e o cabelo encarapinhado facilitaria a refrigeração da caixa craniana dos povos caçadores-coletores de densas florestas tropicais africanas. Indivíduos que sofrem mutações vantajosas em seu meio acabam por ter maiores chances de sobreviver, de atingir a maturidade sexual e de se reproduzir, bem como seus descendentes que herdarem tais características. Assim, depois de muitas gerações, aquela característica que era originalmente idiossincrática pode tornar-se regra. No entanto, muitas mutações podem ter tido sucesso por puro acaso, como, por exemplo, por terem gerado indivíduos que eram mais “bonitos” à luz de algum padrão estético, ou por terem surgido em pessoas cuja posição social lhes conferia privilégios reprodutivos.

Cavalli-Sforza, ao estudar as populações humanas, percebeu que as grandes diferenças de padrões genéticos hoje existentes seguem a rota de ocupação do território global desvelada pelos estudos arqueológicos e paleoantropológicos, bem como pelas diferenças nas línguas. Em uma imagem simples, pode-se pensar um grupo humano que tenha um patrimônio genético e cultural em comum, incluindo a língua. Em algum momento da história desse grupo, uma pequena parte, por algum motivo, resolveu migrar, chegando a outra região, distante e separada por acidentes geográficos quase intransponíveis. Depois de muitas gerações, esse segundo grupo pode ter se tornado fisicamente bastante distinto daquele grupo original, assim como parte de seu genoma, de sua cultura e de sua língua. Uma maior clivagem entre essas características dos grupos indicaria que a dissociação teria ocorrido há mais tempo. Todavia, se esses grupos são colocados novamente em contato e passam a se reproduzir exogamicamente, novamente a sucessão das gerações encarregar-se-á de diluir as diferenças e o tempo uniformizará genética, cultura e língua.

Assim, em um certo sentido, existem raças humanas geneticamente identificáveis, portanto com base biológica, pois é possível hoje⁶ definir grandes grupos populacionais espacialmente circunscritos aos quais pertenceram os ancestrais de uma pessoa.⁷ Como há algum grau de correlação das características lingüísticas, étnicas e de aparência física das pessoas desses grandes grupos, fica-se tentado a ver neles o que as sociedades vêem como raças. Todavia, dissertando sobre o assunto, Cavalli-Sforza pondera que a diversidade humana, a despeito da uniformidade do genoma, é tão grande que, se fossem definidas raças com base em similitudes genéticas, provavelmente haveria tantas raças quanto existem línguas no mundo. Ou seja, ter-se-ia alguns milhares de raças. Mas nenhuma sociedade conhecida, mesmo as multirraciais”,

6. Cavalli-Sforza (2003) considera que essa identificação tenderá a se tornar progressivamente mais difícil em algumas gerações.

7. A firma DNAPrint Genomics, que oferece comercialmente a preço acessível teste de ancestralidade por DNA, deixa claro no seu prospecto que se trata de “biogeographical ancestry” e, não à toa, junto com os resultados do teste, o cliente recebe um mapa dos grandes fluxos migratórios do passado remoto da humanidade.