

TCGA-STAD - top-10 subtype biomarkers per omics (Ensembled Transformer-Graph Streams)
STAD_CIN
STAD_MSI
STAD_GS
STAD_EBV
STAD_POLE
RASSF10 (mRNA)
SMAD2 (mRNA)
STAT1 (mRNA)
DDX27 (mRNA)
UBE2G2 (mRNA)
GATA3 (mRNA)
BCL11B (mRNA)
ARID1B (mRNA)
BEX2 (mRNA)
RTBDN (mRNA)
hsa-miR-561-5p (miRNA)
hsa-miR-192-3p (miRNA)
hsa-miR-502-5p (miRNA)
hsa-miR-758-3p (miRNA)
hsa-miR-552-5p (miRNA)
hsa-miR-125a-3p (miRNA)
hsa-miR-335-5p (miRNA)
hsa-miR-6806-3p (miRNA)
hsa-miR-582-5p (miRNA)
hsa-miR-132-5p (miRNA)
EPM2AIP1 (Methylation)
TXNRD3IT1 (Methylation)
ZNF439 (Methylation)
ZNF22 (Methylation)
ZNF154 (Methylation)
PARP10 (Methylation)
SMAD2 (Methylation)
TUBA3E (Methylation)
MIR1284 (Methylation)
AXIN2 (Methylation)
2
1
0
−1
−2
z-score (clipped ±2.5)
Labeled patients (343), grouped by subtype