

# Bildverarbeitung

## Zusammenfassung

Manuel Pauli

Sebastian Schweikl

22. Juni 2016

## 1 Mathematische Grundlagen

**Definition 1.1** (Torus) Als *Torus* bezeichnet man die Menge der Äquivalenzklassen definiert durch

$$\mathbb{T} := \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z},$$

gesprochen » $\mathbb{R}$  modulo  $2\pi\mathbb{Z}$ «.

**Bemerkung 1.2** (Torus) Einfach gesagt: Alle reellen Zahlen, die beim Teilen durch Vielfache von  $2\pi$  den selben Rest lassen, sind äquivalent, und der Torus enthält alle möglichen Reste, die dabei auftreten können. Beispiel:

$$0/2\pi = 0 \text{ Rest } 0, \quad 2\pi/2\pi = 1 \text{ Rest } 0, \quad 4\pi/2\pi = 2 \text{ Rest } 0, \dots$$

D.h., die Zahlen  $0$ ,  $2\pi$  und  $4\pi$  sind zueinander äquivalent, da sie alle den Rest  $0$  lassen. Man sagt, sie befinden sich in einer gemeinsamen *Äquivalenzklasse*. Da es unendlich viele Zahlen gibt, die beim Teilen durch  $2\pi$  den Rest  $0$  lassen, befinden sich unendlich viele Zahlen in dieser Äquivalenzklasse. Daher sucht man sich einen Stellvertreter (einen sog. *Repräsentanten*), um vernünftig arbeiten zu können. Es bietet sich die einfachste Zahl in der Äquivalenzklasse an, in diesem Fall die  $0$ , und man schreibt dann häufig  $[0]$ , wenn alle Zahlen gemeint sind, die zur  $0$  äquivalent sind.

Nun wird dem einen oder anderen schon aufgefallen sein, dass der Torus auch unendlich viele Äquivalenzklassen besitzt (da es ja unendlich viele mögliche Reste beim Teilen gibt). Z.B. ist jede Zahl aus dem Intervall  $[0, 2\pi)$  ein Repräsentant genau einer Äquivalenzklasse, und zu jeder Äquivalenzklasse kann man einen Repräsentanten in  $[0, 2\pi)$  finden. Daher sagt man  $\mathbb{T}$  ist *isomorph* zu  $[0, 2\pi)$ , in Zeichen

$$\mathbb{T} \simeq [0, 2\pi).$$

Wichtig: Das heißt *nicht*, dass  $\mathbb{T}$  das Gleiche ist wie  $[0, 2\pi)$ !  $[0, 2\pi)$  ist immer noch ein Intervall, und die Elemente aus  $\mathbb{T}$  können zwar mit denen aus  $[0, 2\pi)$  identifiziert werden, aber  $\mathbb{T}$  hat *mehr Struktur* als  $[0, 2\pi)$ . Denn: Wenn ich z.B. die Zahl  $\pi$  aus dem Torus mit sich selber addiere, dann bekomme ich  $0$ , denn  $\pi + \pi = 2\pi$  und  $2\pi/2\pi = 1$  mit Rest  $0 \in \mathbb{T}$ . Das Ergebnis ist wieder ein Element aus dem Torus! Wenn ich aber  $\pi \in [0, 2\pi)$  betrachte, und die selbe Rechnung wiederhole, dann bekomme ich immer noch  $2\pi$ . Aber im Unterschied zu vorher gilt jetzt  $2\pi \notin [0, 2\pi)$ !

Übrigens gibt es unendlich viele Intervalle, die isomorph zu  $\mathbb{T}$  sind, z.B.

$$[-\pi, \pi), (-2\pi, 0], [-2\pi, 0), [42.5\pi, 44.5\pi), \dots$$

Jedes Intervall der Länge  $2\pi$  ist isomorph zu  $\mathbb{T}$ ! Aber man sucht sich natürlich nur die hübschen Intervalle raus, und das sind im wesentlichen eh nur  $[0, 2\pi)$  und  $[-\pi, \pi)$ .

**Definition 1.3** (Funktionsräume)

1. Wir bezeichnen mit  $L(\mathbb{R})$  die Gesamtheit aller reellwertigen Funktionen, d.h. die Menge aller Funktionen, die von  $\mathbb{R}$  nach  $\mathbb{R}$  abbilden:

$$L(\mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}.$$

Analog ist  $l(\mathbb{Z})$  die Menge aller reellwertigen Folgen, also Funktionen, die von  $\mathbb{Z}$  nach  $\mathbb{R}$  abbilden:

$$l(\mathbb{Z}) = \{c : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}\}.$$

Wichtig: Die Indexmenge der Folge kommt aus  $\mathbb{Z}$ , das Bild einer Folge das aber selbstverständlich weiterhin eine Teilmenge von  $\mathbb{R}$  sein. Wir könnten also auch schreiben:

$$l(\mathbb{Z}) = \{(c_n)_{n \in \mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{R}\}.$$

2. Die Menge aller summierbaren Funktionen  $L_1(\mathbb{R})$  ist definiert durch

$$L_1(\mathbb{R}) := \left\{ f \in L(\mathbb{R}) : \|f\|_1 := \int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt < \infty \right\}$$

und die Menge aller summierbaren Folgen durch

$$l_1(\mathbb{Z}) := \left\{ c \in l(\mathbb{Z}) : \|c\|_1 := \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c(k)| < \infty \right\}$$

3. Analog wird die Menge der quadratsummierbaren Funktionen  $L_2(\mathbb{R})$  definiert durch

$$L_2(\mathbb{R}) := \left\{ f \in L(\mathbb{R}) : \|f\|_2 := \sqrt{\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt} < \infty \right\}$$

und die Menge der quadratsummierbaren Folgen durch

$$l_2(\mathbb{Z}) := \left\{ c \in l(\mathbb{Z}) : \|c\|_2 := \sqrt{\sum_{k \in \mathbb{Z}} |c(k)|^2} < \infty \right\}$$

4. Die Menge aller beschränkten Funktionen und Folgen definiert durch

$$L_\infty(\mathbb{R}) := \left\{ f \in L(\mathbb{R}) : \|f\|_\infty := \sup_{t \in \mathbb{R}} |f(t)| < \infty \right\}$$

bzw.

$$l_\infty(\mathbb{Z}) := \left\{ c \in l(\mathbb{Z}) : \|c\|_\infty := \sup_{k \in \mathbb{Z}} |c(k)| < \infty \right\}.$$

5. Einer geht noch: Die Menge der Funktionen und Folgen mit *endlichem Träger*, geschrieben als  $L_{00}(\mathbb{R})$  bzw.  $l_{00}(\mathbb{Z})$ . Was ist mit »endlichem Träger« gemeint? Das bedeutet, dass der Bereich, auf dem die Funktion bzw. Folge lebt, nicht unendlich groß sein darf. Formal: Es existiert ein  $N \in \mathbb{N}$ , sodass

$$\left. \begin{array}{l} \{t \in \mathbb{R} : f(t) \neq 0\} \\ \{k \in \mathbb{Z} : c(k) \neq 0\} \end{array} \right\} \subseteq [-N, N].$$

**Bemerkung 1.4** ( $L_1(\mathbb{R})$ -Funktionen und  $l_1(\mathbb{Z})$ -Folgen) Wir betrachten nur Funktionen (bzw. Folgen, aber das werde ich jetzt nicht mehr dazu sagen), die »brav« sind. Damit ist gemeint, dass die Funktionen ein hinreichend schnelles Abklingverhalten gegen 0 besitzen müssen. Anschaulich gesprochen bewirkt der Betrag ja, dass wir einfach alles, was von der Funktion unterhalb der  $x$ -Achse liegt, nach oben »umklappen«, sodass es nun positiv ist. Und wenn wir jetzt darüber integrieren, darf nur was Endliches dabei herauskommen. Dies ist eine hinreichende Forderung, damit wir die Fourier-Transformation zu einer Funktion überhaupt vernünftig definieren können.

Wir stellen fest, dass in  $l_1(\mathbb{Z})$  *nur* Nullfolgen (Folgen, deren Grenzwert 0 ist) zu finden sind, z.B.  $(1/k^2)_{k \in \mathbb{Z}}$ . Achtung! Die Folge  $(1/k)_{k \in \mathbb{Z}}$  ist zwar auch eine Nullfolge, aber die Reihe dazu konvergiert nicht absolut (wir haben es hier ja mit der harmonischen Reihe zu tun), und ist daher ist die Folge auch nicht in  $l_1(\mathbb{Z})$ .

**Bemerkung 1.5** ( $L_2(\mathbb{R})$ -Funktionen und  $l_2(\mathbb{Z})$ -Folgen) Unterschied zu den »normalen« summierbaren Funktionen ist, dass hier die Zwei-Norm der Funktion kleiner als unendlich sein muss anstatt der Eins-Norm (daher kommt ja auch der Name »quadratsummerbar«). Leider gibt es hierfür keine so schöne geometrische Anschauung, da wir über ganz  $\mathbb{R}$  integrieren, aber man kann versuchen, sich das Ganze so vorzustellen: Durch das Quadrieren des Betrags erhält man sozusagen eine Fläche, und durch das Integrieren erzeugen wir ein Volumen, welches dann so wie ein Schlauch an der  $x$ -Achse entlang wabert. Durch das Wurzelziehen brechen wir das Volumen wieder herunter auf eine Fläche. Und hier endet leider schon die Analogie. Auf dem Torus würde man jetzt noch durch  $2\pi$  teilen (weil das die Länge eines Intervalls ist, welches isomorph zum Torus ist), und man könnte sich die Zwei-Norm vorstellen als Mittelwert der Fläche. Da wir aber über ganz  $\mathbb{R}$  integrieren und wir schlecht durch  $\infty$  teilen können, lass ma das hier bleiben und geben uns mit dem zufrieden, was wir schon haben.

Das führt uns unweigerlich zu einer wichtigen Frage: Warum sollte man also überhaupt den Raum  $L_2(\mathbb{R})$  definieren wollen? Die Antwort ist: Weil Mathematiker es immer cool finden, irgendwelche abgefahrenen Konzepte zu verallgemeinern. Außerdem kann man in  $L_2(\mathbb{R})$  ein Skalarprodukt von Funktionen definieren, mit dem sich recht schön rechnen lässt, was eben in  $L_1(\mathbb{R})$  nicht geht.

Für die mathematisch Interessierten unter uns:  $L_2(\mathbb{R})$  liegt dicht in  $L_1(\mathbb{R})$ , und es gilt:

$$L_1(\mathbb{R}) \not\subset L_2(\mathbb{R}) \quad \text{und} \quad L_2(\mathbb{R}) \not\subset L_1(\mathbb{R}).$$

Cool ist es aber, wenn wir Funktionen im Schnitt der beiden Funktionenräume betrachten. Für solche Funktionen kann man nämlich wieder eine Fourier-Transformierte definieren, und man hat sogar ein Skalarprodukt.

**Beispiel 1.6** (Beschränkte Folge) Betrachten wir als Beispiel einer Folge in  $l_\infty(\mathbb{Z})$  die Folge  $((-1)^n : n \in \mathbb{Z})$ . Die Folge besitzt zwei Häufungspunkte  $-1$  und  $1$ , zwischen denen sie immer hin- und herspringt. Das Supremum dieser Folge ist natürlich  $1$ , was kleiner als  $\infty$  ist. Wäre diese Folge auch in  $l_1(\mathbb{Z})$ ? Nein, wäre sie nicht, da sie ja nicht mal konvergiert.

**Beispiel 1.7** ( $L_0(\mathbb{R})$ -Funktion) Die Exponentialfunktion  $\exp$  wird niemals  $0$ , sie hat unendlichen Träger und deshalb keine  $L_0(\mathbb{R})$ -Funktion. Die Rechtecksfunktion  $\chi_{[-1,1]}$  hingegen ist nur im Intervall  $[-1, 1]$  ungleich  $0$  und daher in  $L_0(\mathbb{R})$ .

**Definition 1.8** (Dirac-Puls) Der Dirac-Puls

$$\delta(k) := \delta_{0k} := \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$$

ist eine lustige Funktion, die nur an der Stelle  $0$  gleich  $1$  ist und sonst überall  $0$ .

**Definition 1.9** (Abtastoperator) Der Abtastoperator  $S_h : L(\mathbb{R}) \rightarrow l(\mathbb{R})$  mit Schrittweite  $h$  ist für eine Funktion  $f$  definiert als

$$(S_h f)(k) := f(hk), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Das heißt, anstatt die Funktion für alle reellen Zahlen zu betrachten, tasten wir die Funktion an diskret vielen Stellen ab, welche alle im Abstand  $h \in \mathbb{R}$  zueinander sind. Wir betrachten die Funktion also nur an den Stellen  $0, h, -h, 2h, -2h, 3h, -3h, \dots$

## 2 Fourier

**Definition 2.1** (Fourier-Transformation) Für Funktionen  $f \in L_1(\mathbb{R})$  definieren wir mit

$$\widehat{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \widehat{f}(\xi) := f^\wedge(\xi) := \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\xi t} dt, \quad \xi \in \mathbb{R}$$

die Fourier-Transformierte von  $f$ .

### Bemerkung 2.2 (Fourier-Transformation)

- Was machen wir hier eigentlich? Schreiben wir einfach mal  $\widehat{f}$  als

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\xi t} dt &= \int_{\mathbb{R}} f(t) (\cos(\xi t) - i \sin(\xi t)) dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(t) \cos(\xi t) dt - i \int_{\mathbb{R}} f(t) \sin(\xi t) dt\end{aligned}$$

dann sehen wir, dass wir lediglich versuchen,  $f$  auszudrücken als Kombination von sinus- und cosinus-Termen. Wir schauen einfach, wo  $f$  und der  $\sin$  bzw.  $\cos$  eine große Ähnlichkeit zueinander haben (an der Stelle wird das Integral dann groß) und finden so heraus, welchen »Anteil« welche Frequenz  $\xi$  am Signal  $f$  hat. Dass wir hier die doofe imaginäre Einheit  $i$  mit drin haben, liegt halt einfach daran, dass wir die Identität

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$$

ausgenutzt haben, um die Fouriertransformation besonders elegant zu schreiben. Man hätte auch für Real- und Imaginärteil zwei gesonderte Fouriertransformationen definieren können. Aber das soll uns hier nicht weiter stören. Außerdem kann man halt mit einer Exponentialfunktion schöner rechnen (z.B. ist die Stammfunktion der Exponentialfunktion wieder die Exponentialfunktion). Das ist eigentlich alles, was dahinter steckt. Will man die imaginäre Einheit ganz wegbekommen, geht man im diskreten Fall einfach über zur *Diskreten Cosinus-Transformation*.

- Wichtig: Mit der Fouriertransformation finden wir zwar heraus, welche Frequenzen im Singal stecken, aber wir wissen nicht, an welcher Stelle bzw. zu welchem Zeitpunkt die entsprechende Frequenz auftritt! Wir haben keine Lokalität, da wir ja über ganz  $\mathbb{R}$  integrieren. Das ist ein wichtiger Unterschied zur *Gabor-Transformation*, wo wir unser Fensterfunktion bedienen, um so Frequenzen besser lokalisieren zu können ☺.
- Warum brachen wir  $L_1(\mathbb{R})$ -Funktionen? Wie vorher schon erwähnt, ist das eine hinreichende Bedingung, dass  $\widehat{f}$  überhaupt existiert:

$$\widehat{f} \leq |\widehat{f}| = \left| \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\xi t} dt \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(t)| \underbrace{|e^{-i\xi t}|}_{=1} dt = \int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt < \infty.$$