

Nombre: ADER MANUEL

Protocolo: A298740

Fecha protocolo: 16/04/2026

Solicitado por: --

INMUNOFENOTIPIFICACION

MATERIAL

Médula ósea.

METODOLOGIA

Se utilizó un panel de anticuerpos monoclonales conjugados en forma directa con fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), proteína peridínclorofílica (PerCP), (PerCP Cy5.5) y alofococianina (APC), tándem APC-H7, tándem PECy7, horizon V450 y V500.

La adquisición y análisis de los resultados fue realizada con un citómetro de flujo FACScantoII utilizando los software FACS DIVA e Infinicyt.

RESULTADOS

De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativos es posible identificar:

- \* Linfocitos Totales: 2.7 %
- \* Plasmocitos: < 0.1 %
- \* Monocitos: 3 %
- \* Gr. neutrófilos: 21.3 %
- \* Gr. eosinófilos: < 0.1 %
- \* Gr. basófilos: < 0.1 %
- \* Mastocitos: < 0.01 %
- \* Eritrocitos nucleados: 46.9 %

CELULAS PATOLOGICAS

\* 26.1 % blastos mieloides de tamaño mediano CD45+, CD34+, HLA-DR++, CD117+, CD38++, CD13++, CD16(-), CD11b(-), CD10(-), CD71-/+ , CD64(-), CD14(-), CD36(-), CD105(-), CD33+, CD15-/+ , CD56(-), CD7-/(42%).

OBSERVACIONES

\* Gr. Neutrófilos con marcados rasgos dishemopoyéticos en los patrones de maduración CD13/CD16/CD11b/CD10.

\* Monocitos con predominio de formas inmaduras (85% del total de la serie) y expresión parcial de CD13.

\* Serie eritroide aumentada con expresión heterogénea de CD36 y CD71.

CONCLUSIONES

Presencia de una población de blastos mieloides (26.1 %) similares a las halladas en sus antecedentes. Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

Dra. Paula Temptra  
Bioquímica  
MN 9824

Dra. Andrea Novoa  
Bioquímica  
MN 8693