

Nombre: ADER MANUEL

Protocolo: A303661

Fecha protocolo: 26/05/2026

#### INMUNOFENOTIPIFICACION

##### MATERIAL

Médula ósea.

##### METODOLOGIA

Se utilizó un panel de anticuerpos monoclonales conjugados en forma directa

con fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE), proteína

peridínclorofilica (PerCP), (PerCP

Cy5.5) y alofococianina (APC), tándem APC-H7, tándem PECy7, horizon V450 y V500.

La adquisición y análisis de los resultados fue realizada con un citómetro de

flujo FACScantoII utilizando los software FacsDIVA e Infinicyt.

##### RESULTADOS

De acuerdo con su fenotipo de membrana, tamaño y complejidad relativos es

posible identificar:

- \* Linfocitos Totales: 3,7 %

- \* Plasmocitos: < 0,1 %

- \* Monocitos: 0,2 % \* Células dendríticas: < 0,1 %

- \* Gr. neutrófilos: 11,1 %

- \* Gr. eosinófilos: 0,2 %

- \* Células CD34+: nd

- \* Eritrocitos nucleados: 84,7 %

##### OBSERVACIONES

Gr. neutrófilos con bloqueo madurativo.

Serie eritroide muy aumentada con expresión heterogénea de CD71.

La valoración de la muestra se halla limitada por baja viabilidad. El 55% de lo cuantificado corresponde a eventos no viables y/o detritus.

Los porcentajes

obtenidos podrían no representar el verdadero status medular y se ofrecen sólo

con carácter orientativo.

##### CONCLUSIONES

No se observa evidencia de elementos identificables como blastos en esta muestra y por esta metodología. Presencia de una marcada expansión de la serie eritroide en concurrencia con rasgos displásicos en gr. neutrófilos. Para llegar a una conclusión diagnóstica definitiva es necesario correlacionar estos resultados con la presentación clínica y restantes estudios complementarios.

##### NOTA

Los porcentajes de los elementos genuinamente medulares pueden encontrarse subestimados debidos a dilución con sangre periférica. Esta subestimación suele ser especialmente acentuada en plasmocitos.