

Paciente: ADER, MANUEL**Estudio: RESONANCIA CARDIACA CON CONTRASTE ENDOVENOSO**

Fecha de Nacimiento: 26/04/2004

Médico Derivante: N/D

Fecha del Estudio: 17/07/2026 12:38:34

Procedencia: Ambulatorio

RIS A. N.: 2776748

Número de Pac.: 0002201988

Estado Informe: Final

RESONANCIA CARDIACA CON CONTRASTE ENDOVENOSO

Motivo de Solicitud:	Valorar función ventricular y realce tardío.
Diagnóstico Clínico:	Sospecha de miopericarditis en paciente con LMA en recaída.
Procedencia:	Internación.

Peso:	70 Kg	Altura	177 cm	Sup.corporal	1.86 m2
FC:	92 l/m	Gadolinio	Si	Sedación:	No

TÉCNICA:

Estudio realizado con resonador Philips Achieva de 1.5 T, con uso de electrodos no ferromagnéticos para sincronización cardíaca, con sensor respiratorio y antena de superficie.

Se adquieren

.cortes anatómicos con secuencias Turbo Spin Echo-Sangre Negra en planos transversal, sagital y coronal

.secuencias de cine SENSE Balance Fast Field Echo (B-FFE) sobre planos longitudinales y transversales de las cavidades cardíacas para análisis volumétrico/feature tracking (cualitativo/cuantitativo).

.secuencias con bandas de saturación miocárdicas (tagging) para evaluación de función de fibra (cualitativo/cuantitativo).

.secuencias de contraste de fase en aorta ascendente y arteria pulmonar.

.secuencias de realce tardío a los 10 minutos de la administración de 2mmol/kg de gadolinio (gadoterato de meglumina).

CALIDAD TÉCNICA DEL ESTUDIO:

- EXCELENTE
- BUENA (X)
- ACEPTABLE
- SUBÓPTIMA

MEDICIONES VASCULARES ARTERIALES

Aorta <u>Ascendente</u>	23 mm	masculino: 27 ± 4 (19-34), femenino: 26 ± 4 (18-33)
Aorta <u>Descendente</u>	18 mm	masculino: 21 ± 3 (15-26), femenino: 19 ± 2 (15-23)
A. <u>Pulmonar</u>	20 mm	masculino 27 ± 3 (21-33), femenino 25 ± 3 (19-31)

MEDICIONES AURICULO-VENTRICULARES:

Aurícula Izquierda (área en 4 cámaras)	16 cm ²	masculino: 21 ± 5 cm ² , límites: 12-30 femenino: 19 ± 5 cm ² , límites: 10-28
Aurícula Derecha (área en 4 cámaras)	18 cm ²	masculino: 23 ± 4 cm ² , límites: 15-31 femenino: 21 ± 4 cm ² , límites: 13-29



<u>Diámetro Diastólico VI</u>	44 mm	masculino: 52 ± 5 mm, límites: 42-62 femenino: 49 ± 5 mm, límites: 39-59
<u>Diámetro Sistólico VI</u>	30 mm	masculino: 32 ± 3 mm, límites: 26-38 femenino: 28 ± 6 mm, límites: 16-40
<u>Espesor medio anterior septal</u>	10 mm	masculino: 8.3 ± 1.3 mm, límites: 6-11 femenino: 6.8 ± 1.1 mm, límites: 5-9
<u>Espesor medio posterior</u>	10 mm	masculino: 7.7 ± 1.3 mm, límites: 5-10 femenino: 6.5 ± 1.1 mm, límites: 4-9

MEDICIONES VOLUMETRICAS VENTRICULARES:

Ventrículo Izquierdo (edad 16-83 años):

Volumen de Fin de Diástole	148 ml	masculino: 145 ± 31 ml, límites: 83-207 femenino: 112 ± 21 ml, límites: 70-155
Volumen de Fin de Sístole	63 ml	masculino: 53 ± 18 ml, límites: 19-88 femenino: 39 ± 12 ml, límites: 15-64
Volumen sistólico	85 ml	masculino: 91 ± 18 ml, límites: 55-127 femenino: 73 ± 13 ml/m ² , límites: 47-99
Fracción de Eyección	57 %	masculino: 63 ± 6 %, límites: 51-76 femenino: 66 ± 7 %, límites: 52-79
Masa	113 g	masculino: $105 \text{ g} \pm 24$, límites: 57-152 femenino: $73 \text{ g} \pm 15$, límites: 43-103
Masa/Superficie corporal	60 g/m ²	masculino: $56 \text{ g/m}^2 \pm 10$, límites: 36-75

		femenino 45 g/m ² ± 7, límites: 30-59
--	--	--

Ventrículo Derecho (edad 20-79 años):

Volumen de fin de diástole	170 ml	masculino: 163 ± 27 ml, límites: 109-217 femenino: 127 ± 24 ml, límites: 79-175
Volumen de fin de sístole	66 ml	masculino: 57 ± 17 ml, límites: 23-91 femenino: 44 ± 15 ml, límites: 13-75
Volumen sistólico	103 ml	masculino: 106 ± 18 ml, límites: 71-141 femenino: 83 ± 13 ml, límites: 56-110
Fracción de eyección	60 %	masculino: 66 ± 7 %, límites: 51-80 femenino: 66 ± 7 %, límites: 52-80

(valores de referencia: Kawel-Boehm N y cols. J Cardiovasc Magn Reson. 2020;22:87)

DESCRIPCIÓN:

Los diámetros cavitarios y los espesores parietales están conservados.

La aorta ascendente, descendente y el tronco de la arteria pulmonar presentan diámetros en valores normales.

Los volúmenes de fin de diástole y fin de sístole de Ventrículo Izquierdo se encuentran dentro de límites normales, para sexo y edad. Con función sistólica global y segmentaria conservada.

Los volúmenes de fin de diástole y fin de sístole de Ventrículo Derecho se encuentran dentro de límites normales, para sexo y edad. Con función sistólica global y segmentaria conservada.

Se realizan secuencias potenciadas en T1 y T2 (con supresión grasa) con hiperintensidad de señal a predominio de cara anterior y hojas pericárdicas, sugestivo de edema.

Pericardio con espesores en límite superior normal.

No se observa derrame pericárdico ni pleural.

En las secuencias de inversión/recuperación tras la administración de material de contraste (gadolinio) se observa pequeña área de realce tardío intramiocárdico basal anterior con captación pericárdica (patrón no isquémico).

CONCLUSION:

-Estudio compatible en primera instancia con miopericarditis aguda (a correlacionar con antecedentes y contexto clínico del paciente).



HOSPITAL BRITANICO
DR. CLOS ESTEBAN
M.N. 94.037
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES