



GRADO EN FÍSICAS

Métodos Numéricos

TEMA 3. DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN

Alejandro Medina

Curso 2016/17, Octubre 2016



ESQUEMA

- 1 DERIVACIÓN
- 2 INTEGRACIÓN
- 3 EJERCICIOS



ESQUEMA

- 1 DERIVACIÓN
 - Datos discretos
 - Datos continuos

- 2 INTEGRACIÓN

- 3 EJERCICIOS



DERIVACIÓN NUMÉRICA

Cabe distinguir dos casos genéricos de derivación numérica:

- I) **Datos discretos**: se conoce el valor de la función a derivar únicamente en un conjunto discreto de puntos. Este planteamiento es interesante cuando:
 - la evaluación de la función es muy costosa por lo que es aconsejable aproximarla a partir de su valor en un cierto conjunto discreto de puntos.
 - los valores conocidos de la función tienen mucho *ruido* por lo que es conveniente derivar un polinomio de mínimos cuadrados que reproduzca su comportamiento.
- II) **Datos continuos**: la evaluación de la función se puede realizar en cualquier punto.



DERIVACIÓN: DATOS DISCRETOS

El procedimiento habitual en este caso consiste en calcular una interpolación y posteriormente diferenciar analíticamente el polinomio interpolador.

DERIVACIÓN DE UNA INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE

Dados los puntos, $\{x_0, x_1 \dots x_n\}$, y los valores de la función en dichos puntos, $\{f_0, f_1 \dots f_n\}$, se puede realizar una interpolación de Lagrange de modo que:

$$f(x) \simeq P_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i \ell_i(x) \quad \text{con} \quad \ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \sum_{i=0}^n f_i \ell'_i(x)$$



DERIVACIÓN: DATOS DISCRETOS

DERIVACIÓN DE UNA INTERPOLACIÓN POR *splines*

En cada segmento $[x_i, x_{i+1}]$ ($i = 0, \dots, n-1$) se tiene,

$$S_i(x) = a_i(x - x_i)^3 + b_i(x - x_i)^2 + c_i(x - x_i) + d_i,$$

de donde derivando se tiene que para $x \in [x_i, x_{i+1}]$ ($i = 0, 1 \dots n-1$):

$$f(x) \simeq S'_i(x) = 3a_i(x - x_i)^2 + 2b_i(x - x_i) + c_i$$



DERIVACIÓN: DATOS CONTINUOS

En este caso podemos elegir con libertad el número y las posiciones de los puntos donde se va a evaluar la función. Podría entonces esperarse que la derivada se obtenga de una manera más precisa. Veremos, sin embargo, que en este caso existen también ciertas restricciones.

MÉTODO DE LOS DECREMENTOS DE h

Supongamos que podemos evaluar una función, $f(x)$, en todos los puntos de un intervalo $[a, b]$ y que los puntos \bar{x} , $\bar{x} + h$ y $\bar{x} - h$ pertenecen a dicho intervalo. A partir del desarrollo en serie de Taylor de la función $f(x)$, podemos escribir:

$$f(\bar{x} + h) = f(\bar{x}) + hf'(\bar{x}) + \frac{h^2}{2!}f''(\bar{x}) + \dots$$

$$f(\bar{x} - h) = f(\bar{x}) - hf'(\bar{x}) + \frac{h^2}{2!}f''(\bar{x}) - \dots$$



DERIVACIÓN: DATOS CONTINUOS

Sumando y restando los 2 desarrollos, se pueden despejar la primera y segunda derivada de $f(x)$ así:

$$f'(\bar{x}) \simeq \frac{f(\bar{x} + h) - f(\bar{x} - h)}{2h} \quad (\text{fórmula simétrica})$$
$$f''(\bar{x}) \simeq \frac{f(\bar{x} - h) + f(\bar{x} + h) - 2f(\bar{x})}{h^2}$$

El error en estas aproximaciones es del orden $O(h^2)$



DERIVACIÓN: DATOS CONTINUOS


EJEMPLO:

Dada la función $f(x) = e^x$, calcularemos su derivada en $x = 1$.
Como referencia sabemos que el valor exacto de la derivada es 2,7183.
Comenzaremos con un h inicial de 0,10 y lo disminuimos hasta 0,01.

h	0,10	0,09	0,08	0,07	0,06
$f'(1, 0)$	2,7230	2,7222	2,7213	2,7207	2,7200
h	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01
$f'(1, 0)$	2,7200	2,7188	2,7200	2,72175	2,7200



DERIVACIÓN: DATOS CONTINUOS



Al disminuir h por debajo de 0,04 el resultado empeora.



EXTRAPOLACIÓN DE RICHARDSON

$$f'(\bar{x}) = -\frac{1}{6h} \left[f(\bar{x} + h) - 8f\left(\bar{x} + \frac{h}{2}\right) - f(\bar{x} - h) + 8f\left(\bar{x} - \frac{h}{2}\right) \right] + \frac{h^4}{480} f^{(V)}(\bar{x})$$

EJEMPLO:

Resultados obtenidos con 3 fórmulas de derivación diferentes: ecuación no simétrica, ecuación simétrica y fórmula de Richardson. También se representan los errores relativos correspondientes (E).

Se ha elegido como función $f(x) = e^x$ y la derivada se calcula en $x = 1$.

Se presentan también los errores relativos de los 3 procedimientos comparando con el valor analítico de la derivada.

h	$f_{\text{no sim.}}$	$f_{\text{sim.}}$	$f_{\text{Richard.}}$	$E_{\text{no sim.}}$	$E_{\text{sim.}}$	$E_{\text{Richard.}}$
0.10	0.285884E+01	0.272281E+01	0.271828E+01	.517E+01	.167E+00	.208E-04
0.09	0.284436E+01	0.272195E+01	0.271828E+01	.464E+01	.135E+00	.137E-04
0.08	0.282997E+01	0.272118E+01	0.271828E+01	.411E+01	.107E+00	.853E-05
0.07	0.281568E+01	0.272050E+01	0.271828E+01	.358E+01	.817E-01	.500E-05
0.06	0.280149E+01	0.271991E+01	0.271828E+01	.306E+01	.600E-01	.270E-05
0.05	0.278739E+01	0.271941E+01	0.271828E+01	.254E+01	.417E-01	.130E-05
0.04	0.277338E+01	0.271901E+01	0.271828E+01	.203E+01	.267E-01	.533E-06
0.03	0.275947E+01	0.271869E+01	0.271828E+01	.152E+01	.150E-01	.169E-06
0.02	0.274565E+01	0.271846E+01	0.271828E+01	.101E+01	.667E-02	.333E-07

La mejora de la fórmula de Richardson respecto a las otras es muy considerable.



ESQUEMA

1 DERIVACIÓN

2 INTEGRACIÓN

- Fórmulas de Newton-Cotes
- Fórmulas de integración general
- Cuadratura gaussiana
- Fórmulas de cuadratura compuesta
- Integrales múltiples

3 EJERCICIOS



INTEGRACIÓN

Sea una función $f(x)$ definida en un intervalo $[a, b]$. Pretendemos calcular $\int_a^b f(x) dx$.

Así pues, dados $\{x_0, x_1 \dots x_n\}$ y $\{f_0, f_1 \dots f_n\}$,

$$f(x) \simeq P_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i \ell_i(x) \quad \text{donde} \quad \ell_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

De esta forma la integral quedaría:

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \int_a^b P_n(x) dx = \sum_{i=0}^n f_i \int_a^b \ell_i(x) dx \simeq \sum_{i=0}^n A_i f_i,$$

donde $A_i = \int_a^b \ell_i(x) dx$



INTEGRACIÓN

FÓRMULAS DE NEWTON-COTES

En el caso en que los nodos $\{x_i\}$ estén equiespaciados las expresiones que se obtienen a partir de la ecuación anterior se denominan *fórmulas de Newton-Cotes*

En este caso:

$$x_0 = a, \quad x_n = b \quad \text{y} \quad x_k = a + kh,$$

siendo $k = 1, 2, \dots, n-1$ y $h = (b - a)/n$.



ERROR EN LAS FÓRMULAS DE NEWTON-COTES

TEOREMA:

Sea $f(x)$ una función $n + 2$ veces diferenciable y con continuidad en el intervalo $[a, b]$. El error de una fórmula de Newton-Cotes *cerrada* que usa un polinomio interpolador de grado n , $P_n(x)$, viene dado por:

i) Para n par:

$$E_{\text{integ},n} = c_n h^{n+3} f^{(n+2)}(\eta) \longrightarrow O \left[h^{n+3} f^{(n+2)}(\eta) \right],$$

donde $\eta \in [a, b]$ y c_n es un coeficiente calculable.

$$c_n = \frac{1}{(n+2)!} \int_0^n \mu^2 (\mu-1)(\mu-2) \dots (\mu-n) d\mu.$$

ii) Para n impar:

$$E_{\text{integ},n} = c_n h^{n+2} f^{(n+1)}(\eta) \longrightarrow O \left[h^{n+2} f^{(n+1)}(\eta) \right],$$

con $\eta \in [a, b]$.

$$c_n = \frac{1}{(n+1)!} \int_0^n \mu (\mu-1)(\mu-2) \dots (\mu-n) d\mu.$$



ERROR EN LAS FÓRMULAS DE NEWTON-COTES

TEOREMA: Sea $f(x)$ una función $n + 2$ veces diferenciable y con continuidad en el intervalo $[a, b]$. El error de una fórmula de Newton-Cotes *abierta* que utiliza un polinomio interpolador de grado n , $P_n(x)$, viene dado por:

i) Para n par:

$$E_{\text{integ},n} = c_n h^{n+3} f^{(n+2)}(\eta) \longrightarrow O \left[h^{n+3} f^{(n+2)}(\eta) \right],$$

donde $\eta \in [a, b]$ y

$$c_n = \frac{1}{(n+2)!} \int_{-1}^{n+1} \mu^2 (\mu-1)(\mu-2) \dots (\mu-n) d\mu.$$

ii) Para n impar:


$$E_{\text{integ},n} = c_n h^{n+2} f^{(n+1)}(\eta) \longrightarrow O \left[h^{n+2} f^{(n+1)}(\eta) \right],$$

con $\eta \in [a, b]$ y

$$c_n = \frac{1}{(n+1)!} \int_{-1}^{n+1} \mu (\mu-1)(\mu-2) \dots (\mu-n) d\mu.$$



REGLA DEL PUNTO MEDIO O DEL RECTÁNGULO (*abierta*, $n = 0$)




$$\int_a^b f(x) dx \simeq \int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx + \frac{1}{3}h^3 f''(\eta) = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{3}h^3 f''(\eta)$$

$$\int_a^b f(x) dx \simeq hf_{1/2} + O(h^3 f'') \quad \text{donde } h \equiv b-a.$$



REGLA DEL TRAPECIO (*cerrada*, $n = 1$)



$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\simeq \int_{x_0}^{x_1} \left[f_0 \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \right) + f_1 \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \right) \right] dx + O(h^3 f'') = \\ &= \frac{f_0}{x_0 - x_1} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_1) dx + \frac{f_1}{x_1 - x_0} \int_{x_0}^{x_1} (x - x_0) dx = \\ &= \dots = \frac{x_1 - x_0}{2} (f_0 + f_1) + O(h^3 f'') = \frac{h}{2} (f_0 + f_1) + O(h^3 f'')\end{aligned}$$


$$c_1 = \frac{1}{2} \int_0^1 \mu(\mu-1) d\mu = \frac{1}{2} \int_0^1 (\mu^2 - \mu) d\mu = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{12}$$

$$E_{\text{integ},1} = -\frac{1}{12} h^3 f''(\eta)$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \simeq \frac{h}{2} (f_0 + f_1) - \frac{1}{12} h^3 f''(\eta)$$



REGLA DE SIMPSON (*cerrada*, $n = 2$)




$$f(x) \simeq P_2(x) \implies \int_a^b f(x) dx \simeq \frac{h}{3} (f_0 + 4f_1 + f_2) - \frac{h^5}{90} f^{(IV)}(\eta)$$

donde $h = x_i - x_{i-1}$, $a = x_0$, $b = x_0 + 2h$.



REGLA DE MILNE (*abierta*, $n = 2$)



$$\int_a^b f(x) dx \simeq \frac{4h}{3} (2f_0 - f_1 + 2f_2) + \frac{14h^5}{45} f^{(IV)}(\eta)$$



EJEMPLO:

$$I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx \rightarrow \text{Valor exacto: } I = \log 2 = 0,693147$$

- Regla del punto medio:

$$I \simeq hf_{1/2} = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0,666667 \quad e_r = 4\%$$

- Regla del trapecio:

$$I \simeq \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] = 0,75 \quad e_r = 8\%$$

- Regla de Simpson:

$$h = \frac{b-a}{2} \rightarrow I \simeq \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] = 0,694444 \quad e_r = 0,2\%$$

- Regla 3/8 de Simpson:

$$h = \frac{b-a}{3} \rightarrow I \simeq \frac{b-a}{8} [f(a) + 3f(a+h) + 3f(a+2h) + f(b)] = 0,693750 \quad e_r = 0,09\%$$



MÉTODO DE LOS COEFICIENTES INDETERMINADOS

A partir de la interpolación lagrangiana hemos obtenido que,

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \sum_{i=0}^n A_i f_i \quad \text{donde} \quad A_i = \int_a^b \ell_i(x) dx. \quad (1)$$

Una vez fijados los nodos, los coeficientes A_i no dependen de la forma de $f(x)$ sino sólo de n .

Un método para calcularlos consiste en aplicar la fórmula (1) a un conjunto de *funciones de prueba*, por ejemplo, a los polinomios $\{1, x \dots x^n\}$:

$$\int_a^b x^m dx = \left. \frac{x^{m+1}}{m+1} \right]_a^b = \frac{b^{m+1} - a^{m+1}}{m+1} = \sum_{i=0}^n x_i^m A_i \quad (m = 0, 1 \dots n)$$

La última igualdad es la base del *método de los coeficientes indeterminados*: se consideran desconocidos los coeficientes A_i y esas ecuaciones se toman como un sistema de $n + 1$ ecuaciones con $n + 1$ incógnitas.



MÉTODO DE LOS COEFICIENTES INDETERMINADOS

EJEMPLO:

Supongamos que queremos calcular $\int_0^1 f(x) dx$ utilizando 3 puntos: $x_0 = 0$, $x_1 = 1/2$ y $x_2 = 1$.

$$\int_0^1 f(x) dx = A_0 f_0 + A_1 f_1 + A_2 f_2.$$

Si aplicamos esta ecuación a las funciones de prueba, $\{1, x, x^2\}$, se obtiene el siguiente sistema:

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx &= A_0 + A_1 + A_2 \implies 1 = A_0 + A_1 + A_2 \\ \int_0^1 x dx &= \frac{1}{2} A_1 + A_2 \implies \frac{1}{2} = \frac{1}{2} A_1 + A_2 \\ \int_0^1 x^2 dx &= \frac{1}{4} A_1 + A_2 \implies \frac{1}{3} = \frac{1}{4} A_1 + A_2 \end{aligned}$$

Resolviendo se obtiene: $A_0 = A_2 = 1/6$, $A_1 = 2/3$. Así pues,

$$\int_0^1 f(x) dx \simeq \frac{1}{6} f_0 + \frac{2}{3} f_1 + \frac{1}{6} f_2 = \frac{1}{6} (f_0 + 4f_1 + f_2) \longrightarrow \text{regla de Simpson}$$



FÓRMULAS DE INTEGRACIÓN GENERAL

El procedimiento que condujo a las fórmulas de Newton-Cotes, puede extenderse para obtener fórmulas de integración más generales, del tipo:

$$\int_a^b f(x) \omega(x) dx \simeq \sum_{i=0}^n \alpha_i^{(n)} f(x_i) \quad (2)$$

con $\alpha_i^{(n)} = \int_a^b \ell_i(x) \omega(x) dx$ donde $\omega(x)$ puede ser cualquier *función peso*.

Definición de **función peso**: sea $\omega(x)$ una función definida en el intervalo $[a, b]$. Se dice que es una función peso si verifica:

- A) $\omega(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$.
- B) Las integrales $\int_a^b |x|^m \omega(x) dx$ existen y están acotadas $\forall m \geq 0$.
- C) Si $\int_a^b \omega(x) g(x)^2 dx = 0$ con $g(x)$ continua, entonces $g(x) = 0$.

El interés de la ecuación (2) reside en que, $\omega(x)$, puede elegirse para que mediante un número mínimo de nodos, $\{x_i\}$, puedan calcularse las integrales con un grado de precisión máximo.



CUADRATURA GAUSSIANA

$$n = 0$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \simeq \alpha_0^{(0)} f(x_0)$$

Las condiciones a imponer son dos ($k = 0, 1$):

$$\begin{cases} 0 = E_0(1) = \int_{-1}^1 dx - \alpha_0^{(0)} & \implies \alpha_0^{(0)} = 2 \\ 0 = E_1(x) = \int_{-1}^1 x dx - \alpha_0^{(0)} x_0 & \implies x_0 = 0 \end{cases}$$

Así pues,

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \simeq 2f(0),$$

ecuación que corresponde a la regla del punto medio en el intervalo $[-1, 1]$. El grado de precisión de esta fórmula es 1.



CUADRATURA GAUSSIANA

$$n = 1$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \simeq \alpha_0^{(1)} f(x_0) + \alpha_1^{(1)} f(x_1)$$

Necesitamos 4 condiciones, pues tenemos 4 incógnitas para determinar: $E_1(x^k) = 0$ con $(k = 0, 1, 2, 3)$.

$$0 = E_1(1) = \int_{-1}^1 dx - \alpha_0^{(1)} - \alpha_1^{(1)} \implies 2 = \alpha_0^{(1)} + \alpha_1^{(1)}$$

$$0 = E_1(x) = \int_{-1}^1 x dx - \alpha_0^{(1)} x_0 - \alpha_1^{(1)} x_1 \implies 0 = \alpha_0^{(1)} x_0 + \alpha_1^{(1)} x_1$$

$$0 = E_1(x^2) = \int_{-1}^1 x^2 dx - \alpha_0^{(1)} x_0^2 - \alpha_1^{(1)} x_1^2 \implies \frac{2}{3} = \alpha_0^{(1)} x_0^2 + \alpha_1^{(1)} x_1^2$$

$$0 = E_1(x^3) = \int_{-1}^1 x^3 dx - \alpha_0^{(1)} x_0^3 - \alpha_1^{(1)} x_1^3 \implies 0 = \alpha_0^{(1)} x_0^3 + \alpha_1^{(1)} x_1^3$$

$$\text{Solución} \longrightarrow \alpha_0^{(1)} = \alpha_1^{(1)} = 1; \quad x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}; \quad x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} \implies \int_{-1}^1 f(x) dx \simeq f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$



CUADRATURA GAUSSIANA

$$n = 2$$

En este caso se puede demostrar como ejercicio que,

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \simeq \frac{5}{9}f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right).$$

Con 3 nodos se obtiene un grado de precisión 5. En cuanto a número de nodos esta fórmula es como la de Simpson, pero en aquella el grado de precisión es sólo 3.



EJEMPLO:

$$I = \int_1^2 \frac{1}{z} dz = 0,693147$$

Cambio de variables ($z \in [a, b]$; $x \in [-1, 1]$):

$$x = \frac{z - \frac{b+a}{2}}{\frac{b-a}{2}} \rightarrow x = 2 \left(z - \frac{3}{2} \right) \rightarrow z = \frac{1}{2}(x+3); \quad dz = \frac{1}{2} dx$$

$$I = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x+3} \rightarrow f(x) = \frac{1}{x+3}$$

● $n = 0$

$$I \simeq 2f(0) = \frac{2}{3} = 0,666667 \quad e_r = 4\%$$

● $n = 1$

$$I \simeq f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0,6923076 \quad e_r = 0,12\%$$

● $n = 2$

$$I \simeq \frac{5}{9}f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}f(0) + \frac{5}{9}f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = 0,693122 \quad e_r = 0,004\%$$



CUADRATURA GAUSSIANA CON POLINOMIOS ORTOGONALES

Funciones peso y familias de polinomios ortogonales

Polinomios de Legendre

- Peso: $\omega(x) = 1$.
- Intervalo: $[a, b] = [-1, 1]$.
- Expresión del polinomio de grado j (*fórmula de Rodrigues*):

$$P_j(x) = \frac{1}{2^j j!} \frac{d^j}{dx^j} (x^2 - 1)^j$$

- Relación de recurrencia:

$$(j+1)P_{j+1}(x) = (2j+1)xP_j(x) - jP_{j-1}(x).$$



n	x_i ($i = 0, 1, \dots, n$)	α_i ($i = 0, 1, \dots, n$)
1	$\pm 0,57735\ 02691\ 89626$	1,00000 00000 00000
2	0,00000 00000 00000 $\pm 0,77459\ 66692\ 41483$	0,88888 88888 88889 0,55555 55555 55556
3	$\pm 0,33998\ 10435\ 84856$ $\pm 0,86113\ 63115\ 94053$...	0,65214 51548 62546 0,34785 48451 37454 ...
9	$\pm 0,14887\ 43389\ 81631$ $\pm 0,43339\ 53941\ 29247$ $\pm 0,67940\ 95682\ 99024$ $\pm 0,86506\ 33666\ 88985$ $\pm 0,97390\ 65285\ 17172$...	0,29552 42247 14753 0,26926 67193 09996 0,21908 63625 15982 0,14945 13491 50581 0,06667 13443 08688 ...
19	$\pm 0,07652\ 65211\ 334973383$ $\pm 0,22778\ 58511\ 41645068$ $\pm 0,37370\ 60887\ 15419549$ $\pm 0,51086\ 70019\ 50827126$ $\pm 0,63605\ 36807\ 26515025$ $\pm 0,74633\ 19064\ 60150796$ $\pm 0,83911\ 69718\ 22218782$ $\pm 0,91223\ 44282\ 51325946$ $\pm 0,96397\ 19272\ 77913809$ $\pm 0,99312\ 85991\ 85094885$	0,15275 33871 30725865 0,14917 29864 72603769 0,14209 61093 18382152 0,13168 86384 49176554 0,11819 45319 61517649 0,10193 01198 17233281 0,083276 74157 67046854 0,062672 04833 41089707 0,0406014 29800 3869248 0,017614 00713 91504699



CUADRATURA GAUSSIANA CON POLINOMIOS DE LEGENDRE: IMPLEMENTACIÓN

Dado un intervalo cualquiera, $[a, b]$, y una función $F(z)$ definida en él, se pretende calcular:

$$I = \int_a^b F(z) dz$$

i) Cambio de variables:

$$x = \frac{z - \frac{1}{2}(b+a)}{\frac{1}{2}(b-a)} \quad \Longrightarrow \quad dx = \frac{dz}{\frac{1}{2}(b-a)}; \quad dz = \frac{1}{2}(b-a) dx$$

$$z = b \longrightarrow x = 1; \quad z = a \longrightarrow x = -1 \quad \Longrightarrow \quad z = \frac{1}{2}(b+a) + \frac{1}{2}(b-a)x$$

ii) Cálculo de la integral:

$$I = \frac{1}{2}(b-a) \int_{-1}^1 F\left(\frac{b+a+(b-a)x}{2}\right) dx \quad \Longrightarrow \quad \int_a^b F(z) dz \simeq \frac{1}{2}(b-a) \sum_{i=0}^n \alpha_i F\left(\frac{b+a+(b-a)x_i}{2}\right)$$

con los $\{\alpha_i, x_i\}$ tabulados anteriormente.



EJEMPLO:

$$I = \int_1^2 \frac{1}{z} dz = 0,693147$$

Cambio de variables:

$$x = 2 \left(z - \frac{3}{2} \right) \longrightarrow z = \frac{1}{2}(x + 3); \quad dz = \frac{1}{2} dx$$

$$I = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x+3} \longrightarrow f(x) = \frac{1}{x+3}$$

● $n = 1$

$$I = \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1) = f(0,577350) + f(-0,577350) = 0,692308 \quad e_r = 0,12\%$$

● $n = 2$


$$\begin{aligned} I &= \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) = \\ &= 0,888889 f(0) + 0,555556 [f(0,774597) + f(-0,774597)] = \\ &= 0,693122 \quad e_r = 0,004\% \end{aligned}$$

● $n = 3$

$$\begin{aligned} I &= \alpha_0 f(x_0) + \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \alpha_3 f(x_3) = \\ &= 0,652145 [f(0,339981) + f(-0,339981)] + 0,347855 [f(0,861136) + f(-0,861136)] = \\ &= 0,693146 \quad e_r = 1,4 \times 10^{-4}\% \end{aligned}$$




FÓRMULAS DE CUADRATURA COMPUESTAS





REGLAS COMPUESTAS NO ADAPTATIVAS

Regla trapezoidal compuesta



$$\int_a^b f(x) dx \simeq \frac{b-a}{N} \left(\frac{f_0 + f_N}{2} + \sum_{i=1}^{N-1} f_i \right) + O \left[\frac{(b-a)^3}{N^2} f''(\eta) \right].$$


Llamando, $I_N(f)$, al primer sumando de esta ecuación, el error, $E_h [I_N(f)]$, con $h = (b-a)/N$ viene dado por:

$$E_h [I_N(f)] = \left| \int_a^b f(x) dx - I_N(f) \right| = \frac{h^2(b-a)}{12} f''(\eta).$$



REGLAS COMPUESTAS NO ADAPTATIVAS

Regla de Simpson compuesta




$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{3N} \left(f_0 + f_N + 4 \sum_{j=1}^M f_{2j-1} + 2 \sum_{j=1}^{M-1} f_{2j} \right) + O \left[\frac{(b-a)^5}{N^4} f^{(IV)}(\eta) \right].$$



REGLAS COMPUESTAS ADAPTATIVAS

Regla del trapecio adaptativa



$$S_k = \frac{1}{2}S_{k-1} + h_k \sum_{i=1}^{2^{k-1}} f[a + (2i-1)h_k] \quad \text{con} \quad h_k = \frac{b-a}{2^k}; \quad k = 1, 2, \dots$$



EJEMPLO:

Utilizaremos la cuadratura adaptativa para calcular la integral:

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \log 2 = 0,6931471$$

$$*S_0 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4} = 0,75 \quad e_r = 8\%$$

$$*S_1 = \frac{S_0}{2} + h_1 f(a + h_1) = \frac{0,75}{2} + 0,5 \frac{1}{1 + 0,5} = 0,708333 \quad [h_1 = (b - a)/2 = 0,5] \quad e_r = 2\%$$

$$*S_2 = \frac{S_1}{2} + h_2 [f(a + h_2) + f(a + 3h_2)] =$$

$$= \frac{0,708333}{2} + 0,25[f(0,25) + f(0,75)] = 0,697024$$

$$[h_2 = (b - a)/4 = 0,25] \quad e_r = 0,6\%$$

$$*S_3 = \frac{1}{2} S_2^2 + h_3 [f(a + h_3) + f(a + 3h_3) + f(a + 5h_3) + f(a + 7h_3)] =$$

$$= \frac{0,697024}{2} + \frac{1}{8} \left[f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{7}{8}\right) \right] = 0,694122$$

$$[h_3 = (b - a)/8 = 0,125] \quad e_r = 0,1\%$$



FÓRMULA DE EULER-MACLAURIN Y NÚMEROS DE BERNOULLI


$$I = \int_a^b f(x) dx = S_k - \frac{B_2 h_k^2}{2!} [f'(b) - f'(a)] - \dots - \frac{B_{2j} h_k^{2j}}{2!} [f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)],$$

donde, B_i , son los *números de Bernoulli*. Todos los impares son nulos salvo el B_1 .

i	0	1	2	4	6	8	10	12
B_i	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{30}$	$\frac{1}{42}$	$-\frac{1}{30}$	$\frac{5}{66}$	$-\frac{691}{2730}$



MÉTODO DE ROMBERG



$$S_{k,j} = \frac{4^j S_{k,j-1} - S_{k-1,j-1}}{4^j - 1}$$

$$\text{Error: } O\left[\left(\frac{b-a}{2^k}\right)^{2(j+1)}\right]$$



MÉTODO DE ROMBERG

EJEMPLO:

Calcularemos mediante el método de Romberg la integral que ya hemos estimado anteriormente por otros procedimientos:

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \log(1+x) \Big|_0^1 = 0,6931471$$

Para esta integral habíamos calculado:

$$S_{0,0} = 0,75; \quad S_{1,0} = 0,70833; \quad S_{2,0} = 0,697024 \quad \longrightarrow \quad e_r = 0,1\%$$

A partir de ellos podemos construir:

$$S_{1,1} = \frac{4S_{1,0} - S_{0,0}}{3} = 0,694444$$

$$S_{2,1} = \frac{4S_{2,0} - S_{1,0}}{3} = 0,693254$$

$$S_{2,2} = \frac{4^2 S_{2,1} - S_{1,1}}{15} = 0,693175 \quad \longrightarrow \quad e_r = 4,0 \times 10^{-3}\%$$

Vemos que, $S_{2,2}$, coincide en las 4 primeras cifras decimales con el valor exacto de la integral y mejora claramente, $S_{2,0}$, que sólo coincidía en 2 decimales.

INTEGRALES MÚLTIPLES

PLANTEAMIENTO EN 2D:


$$\int \int_S f(x, y) \, dx dy = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx = \int_{x_1}^{x_2} G(x) \, dx$$

con $G(x) = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy.$

TÉCNICAS MONTECARLO

EJEMPLO:

Objetivo: determinar el área de un círculo de radio 1.



$$\frac{\text{área bajo el arco de circunferencia}}{\text{área bajo el cuadrado}} = \frac{N_{\text{in}}}{N} \implies I \simeq \frac{N_{\text{in}}}{N}$$

Porque en este caso sencillo el área del cuadrado es 1.



ESQUEMA

- 1 DERIVACIÓN
- 2 INTEGRACIÓN
- 3 EJERCICIOS

EJERCICIOS

1.- Un circuito eléctrico está formado por una bobina de inductancia L , una resistencia R y un generador que produce una fuerza electromotriz $\varepsilon(t)$. Según la segunda ley de Kirchoff,

$$\varepsilon = L \frac{dI}{dt} + RI$$

donde $I = I(t)$ es la intensidad de corriente.

Se realiza en el laboratorio una tabla de intensidades en distintos instantes de tiempo para un circuito con $L = 0,98 \text{ H}$ y $R = 0,142 \Omega$:

$t \text{ (s)}$	1,0	1,01	1,02	1,03	1,04
$I \text{ (A)}$	3,10	3,12	3,14	3,18	3,24

Calcula el voltaje en todos esos instantes de tiempo.

EJERCICIOS

2.- Se considera la siguiente fórmula de Newton-Cotes para el cálculo numérico de integrales definidas:

$$\int_0^1 f(x) dx \simeq \alpha f(1/4) + \beta f(1/2) + \gamma f(3/4)$$

Determinense los valores de α , β , γ para que dicha fórmula sea exacta para polinomios de grado lo más alto posible. ¿Cuál es el grado de precisión de la fórmula obtenida? Utilícese la misma para calcular el valor de la función *dilogaritmo*:

$$f(x) = - \int_0^x \frac{\log(1-t)}{t} dt,$$

en el punto $x = 1/2$.

EJERCICIOS

3.- Se considera la siguiente fórmula de Newton-Cotes para el cálculo numérico de integrales definidas:

$$\int_0^1 f(x) dx \simeq \frac{2}{3} f(1/4) - \frac{1}{3} f(1/2) + \frac{2}{3} f(3/4)$$

Utilícese esta fórmula para el cálculo de la siguiente integral doble:

$$\int_0^1 dx \int_0^x \frac{\text{sen}(xy)}{xy} dy.$$

EJERCICIOS

4.- Se considera la siguiente fórmula de cuadratura:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \simeq A f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + B f(0) + C f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right). \quad (3)$$

Encuéntrense los valores de los coeficientes A , B y C para los cuales la Ec. (3) es una fórmula de cuadratura Gaussiana de tres puntos. Utilícese la Ec. (3) con los valores de A , B y C calculados anteriormente para calcular un valor aproximado de la integral:

$$\int_0^4 \frac{\sin x}{x} dx$$

EJERCICIOS

5.- Considérese la siguiente fórmula de integración numérica:

$$\int_0^1 f(x)dx \simeq \frac{1}{90} [7f(0) + 32f(1/4) + 12f(1/2) + 32f(3/4) + 7f(1)] \quad (4)$$

- A) Determinése el grado máximo, n_{\max} , de los polinomios $\{P_n(x)\}$ para los cuales la Ec. (4) es una fórmula de integración exacta.
- B) ¿ Es una fórmula de cuadratura Gaussiana? Razóñese la respuesta.
- C) Sabiendo que,

$$\frac{d(\arctan x)}{dx} = \frac{1}{1+x^2},$$

y haciendo uso de la fórmula de cuadratura (4), calcúlese un valor aproximado para el número π . Compárese dicho valor con el valor de π obtenido directamente en la calculadora.

EJERCICIOS

6.- Utilizando la regla de Simpson compuesta, calcula:

$$I = \int_0^2 e^x dx,$$

de modo que la diferencia entre el valor exacto y el aproximado coincidan en las tres primeras cifras decimales.

7.- Utilizando el método de integración de Romberg, calcula $S_{3,3}$ para la integral:

$$I = \int_0^1 x^2 e^{-x} dx.$$

EJERCICIOS

8.- a) Determínese un valor aproximado de $\log 2$, planteando una integral y resolviéndola numéricamente con la *regla del trapecio compuesta* para obtener las aproximaciones, S_k .

$$\log 2 \simeq I = S_k \quad \text{con } k = 0, 1, 2, 3, 4$$

b) Desarrolla esquemáticamente el *método de Romberg* para llegar a una aproximación, $\log 2 \simeq I = S_{4,4}$.

c) Calcula numéricamente dicha aproximación, $S_{4,4}$. ¿Qué error relativo se comete al aproximar el valor de $\log 2$ dado por la calculadora y $S_{4,4}$? (Utilícense 7 cifras significativas en todos los cálculos.)