

Estimaciones agrícolas

Informe semanal

07 de marzo de 2024

INFORME SEMANAL al 07 de marzo de 2024


Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
 - Pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional de precipitaciones y temperatura
- ✓ Evolución de los cultivos al 07/03/2024
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 23/24
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar




Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones más importantes de los últimos siete días se registraron en el NEA, con máximos locales en Corrientes (289mm) y Resistencia (238mm), donde la lluvia acumulada en tres días superó la mediana del mes de marzo, causando daños en la población y el ejido urbano. Lluvias de más de 100mm también se reportaron en zonas aledañas, principalmente en el sur de Chaco, este de Santiago del Estero y norte de Santa Fe. En el NOA los mayores milimetrajés corresponden a Metán (107mm) y Tucumán (90mm). Por otro lado, en el sur de Entre Ríos y Santa Fe se destacan Gualeguaychú (89mm) y Sauce Viejo (73mm), respectivamente, en Buenos Aires Las Flores (53mm) y Dolores (52mm), y en Córdoba, Río Cuarto (50mm). En el resto de dichas provincias, Cuyo, La Pampa y mayor parte de Patagonia los acumulados fueron escasos o nulos.




Precipitaciones acumuladas en la semana

Entre miércoles y jueves se esperan precipitaciones en el NEA y el NOA. Con el avance del sistema frontal entre viernes y sábado podría haber lluvias de diversa intensidad en Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, NEA y NOA. Entre domingo y martes podrían darse eventos de diversa cantidad en el NOA, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y con alguna chance que ocurran lluvias escasas en Santa Cruz y Chubut entre domingo y lunes.

TEMPERATURAS

Las temperaturas medias de la última semana fueron levemente inferiores a las normales en la región costera de Patagonia y levemente superiores en zonas del NEA, NOA y Cuyo, en tanto que se dieron de acuerdo a lo esperado para la época del año en el resto del territorio argentino. Las máximas superaron los 35°C en gran cantidad de localidades del NOA y el NEA, e incluso los 40°C en el extremo norte del país, destacándose Rivadavia (44°C) y Las Lomitas (43°C). Por otro lado, se reportaron heladas agronómicas en zonas cordilleranas y precordilleranas de Patagonia y heladas meteorológicas en sectores aislados, registrándose en Bariloche (-0,8°C) la mínima semanal absoluta.




Anomalía de la temperatura media de la semana

En la semana se esperan temperaturas normales a por debajo de lo normal en el sur, normales en el centro y normales a sobre lo normal en el norte del país. Entre miércoles y jueves se prevé una leve disminución de las temperaturas en el norte, para luego, a partir del viernes y hasta el próximo martes, un aumento paulatino con posibilidad de máximas sobre 35°C en varias localidades del NOA y NEA. En la zona central también se espera que se mantengan temperaturas bajas durante el miércoles, con un leve aumento entre jueves y viernes y luego volver a descender levemente entre sábado y próximo martes debido al ingreso de un sistema frontal desde Patagonia. En la zona, sur en cambio, se mantendrán temperaturas más bajas debido al sistema que actualmente afecta dicha zona y al ingreso entre viernes y sábado de un nuevo sistema frontal.

ESTADO DE LAS RESERVAS HIDRICAS


El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para lotes con SOJA DE PRIMERA. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php. Los cambios más importantes respecto a la última semana se observan en el NEA y el NOA, debido los importantes eventos de lluvia que se dieron en dichas regiones. Conforme a esto, el oeste de Corrientes, Chaco, norte de Santa Fe, norte de Santiago del Estero, Tucumán, oeste de Salta y Jujuy presentan excesos hídricos. En el norte de Chaco y en Formosa, donde no se registraron precipitaciones significativas, se conservan las reservas insuficientes. En Córdoba y sur de Santa Fe desaparecen los excesos hídricos de la semana pasada, manteniendo niveles de humedad adecuados y óptimos, mientras que en Entre Ríos son entre regulares y óptimos, con algunos excesos temporarios en zonas aisladas. La mayor parte de la provincia de Buenos Aires no recibió aportes hídricos significativos durante la última semana y presenta un desecamiento generalizado, predominando los almacenajes regulares y escasos y apareciendo polígonos donde son insuficientes. En el sudoeste bonaerense y en La Pampa predominan ampliamente las condiciones deficitarias.




Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y del INTA e información de suelos del INTA

PRONÓSTICO TRIMESTRAL DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL DE PRECIPITACIONES Y TEMPERATURA

PRECIPITACIONES (marzo-abril-mayo)



TEMPERATURAS (marzo-abril-mayo)





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Las últimas precipitaciones registradas en el NEA, han impactado favorablemente en el cultivo implantado en la provincia de Chaco, que ante la mejora en las condiciones climáticas se presenta recuperado. El cultivo atraviesa etapas que llegan hasta la apertura de cápsulas por lo que se ha iniciado incipientemente la cosecha de algunos lotes muy puntuales.

En la provincia de Santa Fe, nuevamente con registros pluviométricos, el cultivo se encuentra en buen estado y recuperado del estrés hídrico soportado. Los lotes más avanzados se encuentran en la etapa de apertura de cápsulas. Se reporta un importante grado de enmalezamiento.

En la provincia de San Luis, también se reportaron precipitaciones de variado volumen, pero que contribuyen a mantener el buen estado del cultivo.

En Santiago del Estero, continúa avanzando lentamente la cosecha en aquellos lotes realizados bajo riego. Los rendimientos se ubican en los 25 qq/ha de promedio. Los lotes que se realizaron en secano, presentan un buen estado general, recuperados luego de las últimas precipitaciones registradas en la región.

En la provincia de Salta, con las nuevas precipitaciones el cultivo continúa revelando un buen estado general. Los lotes más adelantados, que corresponden a aquellos realizados bajo riego se encuentran en la etapa de llenado.

ARROZ

En la provincia de Corrientes, si bien se registraron importantes precipitaciones en la capital, y en algunas zonas del interior, esto no ha afectado el avance de la cosecha que continúa avanzando.

En la provincia de Entre Ríos, en ámbitos de la delegación Paraná, se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes, sobre todo de aquellos ubicados en la zona del departamento La Paz. Los rendimientos se ubican entre los 75 y 80 qq/ha.

También avanza con buen ritmo la trilla en los departamentos San Salvador y Villaguay, que se encuentran ubicados dentro de la delegación Rosario del Tala. El porcentaje cosechado hasta la fecha representa el 6% sobre el total implantado, y se informa que la calidad y el rendimiento son buenos.

En la zona de Avellaneda, luego de una demora debido a los elevados contenidos de humedad, se han reanudado nuevamente las tareas de recolección.

Hacia el sur, en la zona de la delegación Rafaela, el cultivo todavía permanece en la etapa de llenado, en muy buen estado.

GIRASOL



Ya se ha iniciado la cosecha que comienza a avanzar con mayor ritmo. La superficie cosechada representa a nivel provincial cerca del 8%. A menor escala, la zona más avanzada en la trilla es el centro oeste, y por ejemplo en la zona de Pehuajó se estima finalizar con la misma en los próximos días. Los rendimientos que se están obteniendo son variados, pero en general, en vista del buen aspecto del cultivo, se esperaban mejores valores que los obtenidos y lo que probablemente responda a tal situación sean los efectos de los excesos y faltantes hídricos durante momentos críticos en la definición de rendimiento. También hay que mencionar las granizadas ocurridas, que afectaron una importante superficie, que en algunas zonas alcanza hasta las 40.000 has.

De todas formas, los rendimientos son buenos, y los valores se sitúan entre los 22 y los 35 qq/ha, y la cosecha todavía se encuentra en sus etapas iniciales.

Los restantes lotes en pie, se encuentran en etapas entre llenado y madurez, en buen estado general.



Se ha iniciado la cosecha mayormente en aquellas zonas de siembras tempranas. A nivel provincial, la cosecha se ubica alrededor del 20%, mientras que los lotes restantes se encuentran mayoritariamente en la etapa de madurez. Los rendimientos obtenidos van entre los 20 y los 25 qq/ha.



En la zona de General Pico, la totalidad de la superficie de girasol aún en pie transcurre la etapa fenológica de madurez comercial. Se estima un avance de cosecha del 30% hasta que las lluvias de la semana interrumpieron los trabajos. En cuanto al rendimiento, los mayores valores se ubican en los 30 qq/ha, mientras que la mayor frecuencia de rinde va entre los 22 y los 28 qq/ha.

Hacia el sur, también se avanza en la cosecha, con valores de rendimiento ubicados entre los 12 y los 25 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran en madurez, en buen estado y sin presencia de plagas que lo afecten.



En la zona de Rafaela, ya se ha finalizado la cosecha. Los rendimientos han promediado los 22-23 qq/ha, considerándose esta campaña entre regular a buena.

En Cañada de Gómez, la totalidad de la superficie se encuentra en madurez, y la cosecha avanza con buen ritmo. Los rendimientos obtenidos se ubican en los 18 qq/ha.



Se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes. Los rendimientos se ubican dentro de los promedios zonales y van desde los 24 a 30 qq/ha en aquellos realizados bajo riego, mientras que en los de secano oscilan entre los 16 y 22 qq/ha.

MAÍZ



En el norte provincial, los maíces presentan muy buen aspecto, resultando beneficiados por lluvias de 7 a 50 mm según la zona. Los tempranos ya están terminados y sólo les falta perder agua en los granos para inicial la cosecha, estimándose excelentes rindes. Los tardíos están en llenado de granos observándose variadas situaciones según si fueron afectados en mayor o menor medida por la ola de calor de fines de enero-principios de febrero.

En la región central y en el este, los maíces de siembra temprana evolucionan favorablemente encontrándose en llenado de grano y los más avanzados en madurez fisiológica, mientras que los maíces de siembra tardía y de segunda se encuentran en estado de final de floración y llenado de grano, etapas críticas, bajo condiciones de humedad ajustada.

En la zona del oeste según la lluvia recibida durante el ciclo se pueden ver lotes regulares a buenos, siendo los primeros los que fueron sembrados temprano. La etapa fenológica predominante es de llenado de granos a madurez.

En el sudeste ocurrieron lluvias con mínimos de 5 mm y máximos de 40 mm, siendo los mayores registros en la zona costera. Se suma a esto una baja en la demanda atmosférica a causa de la disminución de las temperaturas luego de las lluvias por lo que en general el contenido de agua disponible es adecuado en la mayor parte de los lotes. El maíz para forraje está en pleno

picado, mientras que el maíz con destino grano está entre inicio y pleno llenado de la espiga entre grano lechoso y pastoso, con buen desarrollo general.



En la delegación Laboulaye durante esta semana sólo se registraron lluvias al sur del departamento General Roca en las localidades de Buchardo (40 mm) y Huinca Renancó (67 mm). El 95% de la superficie del maíz temprano se encuentra entre grano dentado (R5) y madurez fisiológica (R6). Buen aspecto general y sin problemas sanitarios detectados. Comenzó lentamente la cosecha en el departamento Sáenz Peña. La mayoría de los lotes de maíces tardíos y de segunda se encuentra entre grano lechoso y pastoso, en tanto los sembrados en enero están en la etapa crítica de floración. En pleno corte aquellos lotes con destino a ensilado.

En el área de la delegación Marcos Juárez, el grueso de la superficie se encuentra en llenado de granos. La condición del cultivo es buena a muy buena pero hay mucha dispersión en cuanto a los rindes potenciales, observándose en mejores condiciones los sembrados en la primera quincena de octubre y en la zona central.

En la delegación Río Cuarto, los maíces tempranos ya están maduros, esperando la pérdida de humedad de los granos para comenzar la cosecha. Los tardíos están en plena floración y llenado.

Los lotes implantados en la zona de la delegación San Francisco, en general, se encuentran en llenado de grano. Se está realizando un activo monitoreo de cogollero, principalmente en refugios, por alta presencia. Se observan lotes afectados por chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*). Continúan las buenas condiciones climáticas en toda la delegación. Los perfiles del suelo se encuentran cargados y las temperaturas medias no son tan elevadas comparadas con campañas pasadas favoreciendo el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Se está realizando el picado de lotes con destino a forraje.

En la delegación Villa María, durante la última semana, se han producido precipitaciones en algunas zonas rurales, con registros de entre 5 mm y 10 mm. El cultivo se encuentra entre floración y grano lechoso la mayoría de los lotes, en muy buen estado general. Los lotes sembrados temprano están en etapa de grano duro y maduración. Estos últimos lotes se estima no van a presentar muy buen rinde, ya que sufrieron su período crítico con mucho estrés.



El cultivo se desarrolla en etapas de emergencia a vegetativas avanzadas y las lluvias registradas están permitiendo una recuperación aceptable en el estado de los lotes.



Prosiguió la cosecha del maíz temprano con algunas interrupciones por lluvias, alcanzando un avance del 21% en toda la provincia. Los rendimientos obtenidos son buenos a muy buenos con un valor promedio de 71 qq/ha. Los maíces de segunda han sido beneficiados por las lluvias y su condición es muy buena en general atravesando estados vegetativos a reproductivos entre R1 y R3. Se menciona la presencia de chicharrita en muchos lotes con distintos niveles de afectación de Spiroplasma en plantas aisladas.



En la región norte, perteneciente a la delegación General Pico, durante la semana se registraron precipitaciones significativas. La humedad del suelo continua siendo adecuada, particularmente en sector este. La mayor parte de los lotes tempranos con destino a grano transcurren la etapa de madurez comercial con muy pocas expectativas de rendimientos ya que fueron afectados significativamente por el período de sequía registrado durante el mes de enero. Los lotes tardíos destinados a grano se encuentran entre las etapas fenológicas de floración y llenado de grano, presentando una adecuada cantidad y tamaño de hojas y desarrollándose en óptimas condiciones agroclimáticas.

En el área de la delegación Santa Rosa no se registraron precipitaciones. La reserva hídrica del suelo está en condición regular/principio de sequía. Los maíces de primera siembra temprana que están en etapa R5 se encuentran en buenas condiciones con síntomas de estrés hídrico producto de la ola de calor transitada durante enero la cual afectó el potencial de rendimiento. Los maíces de primera tardíos, que se encuentran entre las etapas R2-R3, también se vieron afectados por la intensa y continua ola de calor de enero. El grado de afectación depende mucho del cultivo antecesor, viéndose más perjudicados los que vienen de un campo natural y pasturas que aquellos lotes cuyo manejo es mayormente agrícola. Se siguen observando muchos lotes con malezas de difícil control, Eleusine y Chloris. Los maíces de segunda, en estado VT a R1, también sufrieron el déficit hídrico, pero las lluvias de la segunda quincena de febrero llegaron a tiempo para su recuperación aunque su potencial de rendimiento ya fue disminuido.



Durante la semana se registraron algunas precipitaciones entre 5 y 80 mm en diferentes sectores de la provincia, que ayudan a mantener la humedad edáfica, favoreciendo el estado de los cultivos. De todas maneras, en algunas localidades está haciendo falta abundantes lluvias ya que las mismas no fueron generalizadas en toda la provincia.



Durante la semana nuevamente se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial.

En la delegación Avellaneda, las lluvias fueron desuniformes, de 20 a 140 mm, pero alcanzaron para que la situación de humedad de los suelos pase a adecuada en todos los departamentos. Restan cosechar escasos lotes de maíz de primera en el departamento Vera, demorada por las lluvias. El maíz tardío y el de segunda están mayormente en estado vegetativo. Lo implantado está en buen estado, con notable recuperación después de las lluvias. Se encuentran afectados por Spiroplasma, pero todavía no se pueden evaluar daños.

En el ámbito de la delegación Rafaela las precipitaciones alcanzaron acumulados de entre 5 y 140 mm. Se generalizaron las tareas de cosecha en aquellos lotes donde la humedad permitía el ingreso de maquinarias, con muy buenos rindes, de entre 65 y 100 qq/ha. Los maíces tempranos mayormente se encuentran en madurez, con descenso gradual de humedad en granos. Los de segunda están entre inicios de floración y comienzo de llenado de granos los más avanzados, con una condición buena, evaluándose el progreso de los lotes atacados con Spiroplasma.

En la zona de Cañada de Gómez la mayoría de los maíces de siembra temprana se encuentran en madurez fisiológica. Se comenzaron a cosechar los primeros lotes con muy buenos rendimientos en torno a los 100 q/ha. Asimismo, se continúan picando los primeros lotes para reserva forrajera. Los maíces tardíos o de segunda, casi en su totalidad, están en etapa de llenado de granos. Se observan lotes afectados por Spiroplasma en diferentes grados y dependiendo de la fecha de siembra.

En la delegación Casilda es inminente el comienzo de la cosecha del maíz temprano, una vez que baje aún más el contenido de humedad de los granos. Se estiman buenos rendimientos. El maíz tardío está en diferentes etapas productivas, con lotes en floración y otros en llenado de granos. Las últimas lluvias permitieron recuperar la humedad de los perfiles en momentos de gran demanda por parte del cultivo.

Comenzó la cosecha en el área de la delegación Venado Tuerto pero con mucha humedad y con rendimientos que promedian los 97 qq/ha. Se esperan rindes mejores y dependiendo de la zona.



En la semana se volvieron a registrar precipitaciones en toda la provincia que permiten mejorar sustancialmente el estado de los cultivos. Los promedios estuvieron entre 30 a 80 mm. Los primeros maíces implantados están iniciando la floración.



Durante la semana volvieron a registrarse nuevas e importantes lluvias, que apuntalan al maíz en las actuales etapas de crecimiento, floración e inicio de llenado de granos. Se comienzan a observar lotes con plantas afectadas por *Spiroplasma* en la medida que los planteos con el cereal van alcanzando etapas de llenado de granos.

MANÍ

En la provincia de Córdoba, en general el cultivo se encuentra en diferentes etapas de llenado, en función de las fechas de siembra. Se encuentra en muy buen estado general y muy recuperado luego de las últimas lluvias. Se esperan rendimientos que podrían llegar a superar en algunos casos los promedios zonales. No se informan inconvenientes sanitarios.

En la región del NOA, los niveles de humedad son mayormente adecuadas y por lo tanto el cultivo mostrando una condición adecuada en la mayoría de los casos. Un porcentaje mayoritario se encuentra en floración, mientras que aquellos más adelantados continúan en etapa de llenado.

POROTO

En Jujuy se ha finalizado la siembra de todas las variedades implantadas en la zona.

Ante las nuevas precipitaciones ocurridas en la provincia de Salta, se ha intensificado la siembra de porotos; sobre todo alubia.

SOJA



Nuevamente se han registrado precipitaciones, que han ocurrido en gran parte del territorio provincial, pero de forma no generalizada, y con volúmenes muy dispares. No obstante, en todos los casos afirmativos, contribuyen a mantener la humedad en el perfil.

Las sojas de primera se encuentran mayoritariamente en la etapa de llenado, con buen estado general, y se reporta que han sido afectadas por las adversas condiciones climáticas, en diferente grado, pero se prevé que esto podría incidir en los resultados finales. Se informan ataques persistentes de arañuela roja, que han obligado a repetir controles, así como también presencia de chinches.

En el caso de las sojas de segunda, las elevadas temperaturas ocurridas juntamente con la escasez hídrica repercutieron en mayor medida en este cultivo. Posteriormente, con la mejora de las condiciones climáticas, el cultivo se presenta muy recuperado, pero ya afectado en el desarrollo, y dependiendo de la tecnología aplicada y la ubicación de los lotes, manchoneo y escasa densidad de plantas obtenidas. En general, actualmente, el cultivo presenta buen estado, y se encuentran en etapas entre floración y llenado.



Luego de las últimas precipitaciones registradas el cultivo presenta buen estado general. Las sojas de primera, se encuentran atravesando la etapa de llenado, sin limitaciones hídricas, y en la mayoría de los casos se prevén rendimientos que se ubiquen entre la media y por encima de la misma. No obstante existen situaciones puntuales, en dónde por el emplazamiento de los lotes o por encontrarse en zonas más afectadas por causas del estrés térmico-calórico, el cultivo se encuentra muy deteriorado, pero tales casos no son representativos.

En el caso de las sojas de segunda, ya en la mayoría de los casos, se encuentran recuperadas ante la mejora en las condiciones climáticas. El cultivo presenta buen estado, y fenológicamente atraviesan etapas entre floración y llenado. En el aspecto sanitario, se reporta una disminución en la población de orugas, mientras que en la zona norte, se realizan monitoreos y control en caso de ser necesario, por presencia de chinches y mancha marrón.



Luego de las últimas precipitaciones, el cultivo se encuentra en proceso de recuperación, con un estado que en términos generales es bueno. En su mayoría se encuentran en etapas que van desde vegetativas hasta plena floración, con algunos lotes avanzados, que fueron los más perjudicados, y que si bien recuperados, ya se encuentran afectados en el rendimiento potencial.



En la zona correspondiente a la delegación Paraná, el cultivo de soja, tanto de primera como de segunda, se encuentra en etapas que van desde inicio de floración hasta llenado, en buen estado general, y con buenas perspectivas de rendimiento. Se estima que la cosecha se iniciará en los próximos días.

En la zona de Rosario del Tala, las sojas de primera se encuentran en buen estado, en etapas entre formación de vaina y llenado. Las variedades resistentes a los ataques de orugas han tenido

buena respuesta en la zona. En el caso de las sojas de segunda, se encuentran en recuperación, con el 85% de lo implantado ya en floración.



Solamente se registraron precipitaciones en la zona norte provincial, correspondiente a la delegación General Pico, por lo tanto la humedad en el suelo se mantiene en niveles adecuados. Las sojas de primera implantadas en la región, presentan buen estado general, y se encuentra en etapas que van desde floración hasta fructificación.

Hacia el sur, en ámbitos de la delegación Santa Rosa, no han ocurrido precipitaciones y la humedad edáfica se encuentra en niveles que van entre regular y principio de sequía. Las sojas de primera se presentan en condiciones entre buenas y regulares, en la etapa R5.5, presentando síntomas de recuperación luego de las precipitaciones registradas en el mes de febrero. En el caso de las sojas de segunda, que si bien se hallan moderadamente recuperadas, fueron las más afectadas por las elevadas temperaturas y la falta de humedad, presentan actualmente un estado entre bueno y regular, y se encuentran atravesando etapas entre R2 y R3. Se continúan realizando controles por presencia de plagas como chinche y arañuela.



Nuevamente se registraron precipitaciones de variado milimetraje, que han alcanzado hasta los 80 mm favoreciendo al cultivo implantado. Se ha reportado un importante ataque de arañuelas e isocas, que ha ocurrido también en variedades resistentes,



En la zona de Avellaneda, debido a las precipitaciones ocurridas, se ha informado que el cultivo presenta una leve recuperación en su estado general. Lo tardío en la fecha de siembra ha determinado planteos con muy escaso desarrollo, que en algunos casos, aún recuperadas, podrían impactar en el rendimiento final obteniéndose resultados que podrían no ser viables.

En la zona de Rafaela, contrariamente a lo antes mencionado, las sojas de primera presentan muy buen estrado y se mantienen muy buenas expectativas de rendimiento ante el progreso del cultivo por la mejora en las condiciones climáticas. Las sojas de segunda, presentan buen ritmo de crecimiento, y se encuentran en etapas que van desde floración hasta formación de vainas. Se realizan controles por presencia de malezas e insectos.

En Cañada de Gómez, el cultivo en general, presenta buen estado, con las sojas de segunda manifestando una buena recuperación luego de las lluvias. Se encuentran en diferentes etapas de llenado.

En la zona de Casilda, la soja de primera fenológicamente atraviesa etapas entre R5 y R6, con buena disponibilidad de recursos hídricos. Algunos casos de planteos avanzados se encuentran ingresando en madurez. El estado general del cultivo es entre excelente y bueno, con muy buenas expectativas de rendimiento. Se ha reportado la caída de granizo en la zona de Godeken, con un área afectada que impactará en el potencial de rendimiento. Se realizan monitoreos por presencia de chinches cuyo control aún es acotado. En el caso de la soja de segunda, el cultivo presenta variadas condiciones, ya que existen lotes en activo crecimiento, en etapas entre R4 y R5 y buenas perspectivas, y otros muy castigados con pérdidas de plantas y/o abortos de flores y vainas. No se reporta presencia de plagas y se realizan aplicaciones preventivas para enfermedades de fin de ciclo en los lotes más adelantados.

En Venado Tuerto, la mayoría de las sojas de primera se encuentran en R6. Las expectativas son buenas pero no extraordinarias debido a los daños originados por la escasez hídrica. Se realizan controles por presencia de chinches. En el caso de las sojas de segunda en general presentan buenas condiciones, a la espera de nuevas precipitaciones.



Las sojas de primera y segunda, continúan reflejando la recuperación ante las mejora en la condición hídrica. Los lotes más avanzados se encuentran en etapas reproductivas mientras que los últimos sembrados todavía en crecimiento vegetativo.



En la región, continúan registrándose precipitaciones de forma frecuente en prácticamente todas las zonas productivas.

En la provincia de Jujuy, esta situación permite mantener adecuadas reservas hídricas en el suelo. El cultivo se encuentra buen estado y en etapas fenológicas entre floración y llenado.

Esta Salta, el cultivo que se encuentra atravesando etapas críticas en la definición del rendimiento. Se realizan intensas tareas de control de plagas en función de la protección del cultivo.

SORGO



El cultivo se encuentra entre las fases vegetativas, al sur y comienzo de llenado de granos, al norte de la provincia. Se los observa sanos y en buen estado general.



Las lluvias registradas durante la semana beneficiaron al cultivo, el cual se encuentra, principalmente, en la etapa de llenado de granos, en buenas condiciones.



En el área de la delegación Rosario del Tala, a pesar de los gusanos cogolleros y los repetidos ataques de pulgones, los lotes de sorgo se ven con buen aspecto. Los sembrados tempranamente ya están en etapa de secado de granos.



Prosigue la cosecha en la delegación Avellaneda con rendimientos medios a bajos, actualmente detenida por las lluvias.

En las delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez, los sorgos presentan condiciones buenas a excelentes. Continúan, principalmente, en etapa de llenado de granos y los más adelantados en madurez fisiológica con perspectivas de muy buenos rindes. Se observan ataques de pulgón amarillo que están siendo tratados. Continúa el picado de reservas forrajeras.

En la delegación Casilda, en pocos días más, se dará inicio a la recolección de los planteos más precoces. Se estiman rendimientos dentro de la franja de 60 a 80 qq/ha. La etapa de estrés térmico-hídrico determinó la pérdida de potencial especialmente en áreas de suelos de calidad inferior.



Las lluvias registradas en la semana favorecen el crecimiento del cultivo el cual se encuentra, en su mayoría, en etapa vegetativa, con algunos lotes avanzados en inicio de floración.



El sorgo se encuentra en buenas condiciones transitando, en su mayoría, las etapas de crecimiento y floración con un bajo porcentaje iniciando el llenado de granos. Las reiteradas precipitaciones que se vienen registrando mejoraron sustancialmente su estado.



AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	01/02 %	08/02 %	15/02 %	22/02 %	29/02 %	07/03 %
Bahía Blanca	3.900						6
Bolívar	84.800						14
Bragado	8.600						30
General Madariaga	71.300						1
Junín	3.930						
La Plata	9.000						15
Lincoln	35.000						2
Pehuajó	93.000					13	70
Pergamino	2.780						23
Pigüé	90.000				1	3	3
Salliqueló	155.000						
Tandil	230.000						
Tres Arroyos	257.811						
25 de Mayo	50.767						1
BUENOS AIRES <i>23/24</i>	1.095.888	0	0	0	0	1	8
<i>22/23</i>	1.266.672	0	0	0	0	0	1
Laboulaye	67.923						
Marcos Juárez	41.300					2	34
Río Cuarto	12.500						
San Francisco	30.000			18	31	64	65
Villa María	8.900						
CÓRDOBA <i>23/24</i>	160.623	0	0	3	6	12	21
<i>22/23</i>	152.179	1	4	7	9	12	13
Paraná	11.225	69	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	6.000	40	80	95	100	100	100
ENTRE RÍOS <i>23/24</i>	17.225	59	93	98	100	100	100
<i>22/23</i>	20.090	60	74	79	83	86	87
General Pico	189.500				6	9	30
Santa Rosa	112.000					5	30
LA PAMPA <i>23/24</i>	301.500	0	0	0	4	7	30
<i>22/23</i>	281.900	0	0	0	0	0	4
Avellaneda	145.100	96	99	100	100	100	100
Cañada de Gómez	10.000		1	27	56	57	57
Casilda	8.000						
Rafaela	35.200	48	68	82	98	99	100
Venado Tuerto	800					50	85
SANTA FE <i>23/24</i>	199.100	78	84	89	93	93	94
<i>22/23</i>	388.015	61	80	89	91	97	99
CATAMARCA	50						
CORRIENTES	700	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	81.100	88	97	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	63.320	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	3.100	100	100	100	100	100	100
JUJUY	0						
MISIONES	0						
SALTA	960						
SAN LUIS	80.200						
STGO. ESTERO	2.350						
STGO. ESTERO (Quimilí)	9.510			31	100	100	100
TUCUMÁN	130						
TOTAL PAÍS <i>23/24</i>	2.015.756	15	16	17	19	21	28
<i>22/23</i>	2.465.201	17	21	23	24	25	27

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/03/2024 al 07/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	38	62	-	91	9	-	A
	BOLÍVAR	-	-	2	64	34	14	66	20	-	A
	BRAGADO	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	15	85	44	47	9	-	A
	JUNÍN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	70	30	53	47	-	-	A
	LINCOLN	-	-	3	10	87	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	2	98	31	69	-	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	25	75	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	90	10	-	90	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	-	-	70	30	-	70	25	5	A/PS
	25 DE MAYO	-	-	-	40	60	44	56	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	38	62	20	60	15	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	30	70	-	97	3	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	4	96	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	16	84	-	79	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	34	66	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	6	50	30	14	A
	SANTA ROSA	-	-	-	20	80	-	100	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	33	68	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	33	68	-	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	35	65	-	-	98	2	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	88	12	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	5	25	70	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	52	48	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/03/2024 al 07/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAÍZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	71	29	-	91	9	-	A
	BOLÍVAR	-	-	7	80	13	8	68	24	-	A
	BRAGADO	-	-	10	50	40	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	5	94	1	35	47	18	-	A/R
	JUNÍN	-	-	-	80	20	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	10	85	5	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	9	46	45	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	95	5	10	50	37	3	A/R/PS
	PERGAMINO	-	-	-	64	36	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	10	70	20	-	50	50	-	R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	85	15	-	73	27	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	100	-	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	29	70	1	-	65	27	8	A/R
	25 DE MAYO	-	-	10	70	20	-	94	6	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	30	70	-	22	58	15	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	97	3	5	89	5	1	A
	RÍO CUARTO	-	-	40	45	15	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	35	60	5	-	72	28	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	47	50	3	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	5	20	13	62	3	97	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	8	12	40	40	35	59	6	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	25	55	20	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	9	41	50	-	-	68	32	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	72	15	4	9	12	25	38	25	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	5	35	60	50	28	22	-	A
	CASILDA	-	-	30	5	65	56	44	-	-	A
	RAFAELA	-	37	13	14	36	53	41	6	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	21	79	-	-	-	99	1	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	2	96	2	-	A
CHACO	CHARATA	3	71	25	1	-	28	62	10	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	58	42	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	57	34	9	-	-	100	-	-	E/A/R
MISIONES	POSADAS	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	45	51	4	-	-	91	9	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	9	39	52	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	40	60	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	80	20	-	-	-	80	20	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	50	45	5	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

Desde el 01/03/2024 al 07/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	100	-	-	10	71	19	-	-	84	16	-	-	15	67	18	-	A
	BRAGADO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	20	60	20	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	3	97	-	27	55	18	-	-	4	78	18	-	-	74	26	-	A/R
	JUNÍN	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	10	90	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	20	80	-	30	70	-	-	-	5	60	35	-	10	60	30	-	A
	LINCOLN	-	-	-	100	-	-	89	11	-	-	-	100	-	-	-	86	14	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	10	90	-	3	47	50	-	-	-	50	50	-	-	44	43	13	A/PS
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	88	12	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	-	50	50	-	-	-	19	81	-	-	50	50	-	R
	SALLIQUELÓ	-	-	35	65	-	-	86	14	-	-	-	66	34	-	-	85	15	-	R
	TANDIL	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	30	70	-	-	-	77	23	-	A
TRES ARROYOS	-	-	33	67	-	-	77	23	-	-	2	75	23	-	-	83	17	-	A/PS	
25 DE MAYO	-	-	20	80	-	-	82	18	-	-	-	100	-	-	-	96	4	-	R	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	98	2	15	60	20	5	-	-	53	47	-	15	55	25	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	100	-	5	90	5	0	-	-	-	100	-	-	88	10	2	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-	-	73	17	10	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	13	87	-	-	68	30	2	-	2	53	45	-	-	64	36	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	34	66	-	-	100	-	-	-	-	55	45	-	-	99	1	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	15	85	-	-	100	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	-	5	95	-	30	70	-	-	-	15	85	-	-	10	60	25	5	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	8	92	-	-	10	60	30	-	-	100	-	-	-	-	28	50	22	A
	SANTA ROSA	-	-	32	68	-	-	86	14	-	-	-	95	5	-	-	-	56	44	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	25	41	34	-	-	16	45	39	-	58	27	15	-	-	15	34	51	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	100	-	54	26	20	-	-	-	-	100	-	44	30	26	-	A
	CASILDA	-	-	-	100	-	44	46	10	-	-	-	-	100	-	20	54	26	-	A
	RAFAELA	-	-	-	100	-	51	43	6	-	-	-	6	94	-	45	40	15	-	E
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	80	20	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	32	68	-	-	100	0	-	-	-	30	70	-	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
CHACO	CHARATA	-	70	30	-	-	34	53	10	3	-	72	28	-	-	13	67	16	4	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	88	11	0	-	-	42	38	20	-	89	11	-	-	-	43	37	20	A/R
JUJUY	JUJUY	-	43	49	8	-	-	100	-	-	-	44	48	8	-	-	100	-	-	E/A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	55	45	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/03/2024 al 07/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	12	63	25	-	-	87	13	-	-	14	64	23	-	-	84	16	-	A		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	21	36	43	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	22	58	20	-	-	100	-	-	-	20	59	21	-	-	100	-	-	A/R		
	QUIMILÍ	-	64	36	-	-	-	80	20	-	-	69	31	-	-	-	79	21	-	A/R		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	52	48	-	-	100	-	-	-	-	-	60	40	-	-	100	-	-	A	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina