

Estimaciones agrícolas

Informe semanal

14 de marzo de 2024

INFORME SEMANAL al 14 de marzo de 2024


Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 14/03/2024
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 23/24
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar




Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Se registraron importantes precipitaciones en Buenos Aires debido a un sistema que continua provocando eventos al momento de elaboración de este informe y, en menor medida, en La Pampa, sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones. Hasta las 9hs del miércoles los mayores milimetrajese reportaron en Olavarría (191mm), Bolívar (181mm), Azul (173mm), Ezeiza (167mm), CABA (159mm), La Plata (147mm) y Tandil (131mm), con gran cantidad de otras localidades donde rondaron los 100mm. En Santa Fe se destaca Venado Tuerto (130mm) y en Entre Ríos, Rosario del Tala (97mm). En el NEA se dieron eventos aislados que rondaron los 60mm, principalmente en el este de Corrientes, sur de Chaco y este de Misiones. En el NOA, Cuyo, norte de Córdoba y Patagonia los acumulados fueron, en general, escasos o nulos.




Precipitaciones acumuladas en la semana

Entre miércoles y domingo se esperan precipitaciones y posibilidad de nieve con diversa magnitud en Patagonia. Entre miércoles y jueves se esperan lluvias en Buenos Aires, este de La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y el NOA. Entre viernes y lunes de la próxima semana podrían darse acumulados en el NOA, NEA, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, aunque en estas tres últimas dicha precipitación se concentraría entre viernes y domingo con diversa intensidad.

TEMPERATURAS

Las temperaturas medias de la última semana fueron significativamente superiores a las normales en la zona central, Cuyo, NOA y oeste del NEA, mientras que se dieron de acuerdo a lo esperado para la época del año en el resto del territorio argentino. En San Carlos, Mendoza, las anomalías térmicas alcanzaron los 7°C por encima de la media. Las máximas superaron los 35°C en la mayor parte de la mitad norte del país, e incluso los 40°C en gran cantidad de localidades del NOA y del NEA, destacándose Rivadavia (44,5°C) y Las Lomitas (42,6°C). No se registraron temperaturas negativas y las heladas agronómicas se restringieron a zonas cordilleranas de Patagonia, reportándose en Bariloche (1°C) la mínima semanal absoluta.




Anomalia de la temperatura media de la semana

En la semana se esperan temperaturas normales a por sobre lo normal en el centro y norte del país, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a bajo lo normal. Entre miércoles y martes de la próxima semana se mantendrán temperaturas altas en el NOA y NEA, con posibilidad de máximas sobre 35°C en distintas localidades. Además entre miércoles y domingo podrían darse condiciones de máximas sobre 40°C en las mismas zonas. En la zona centro y sur el pasaje de dos sistemas sucesivos afectarán el comportamiento de las temperaturas en la semana, esperando que entre miércoles y viernes tengan un leve descenso, principalmente en la zona central y entre sábado y lunes tengan un leve aumento para luego volver a descender durante el martes. Para la Patagonia, se espera que a partir del jueves y hasta el próximo martes se mantengan temperaturas bajas.

ESTADO DE LAS RESERVAS HIDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para lotes con SOJA DE PRIMERA. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php. Las precipitaciones de la última semana recargaron significativamente los perfiles hídricos en buena parte del área sojera nacional. Conforme a esto se estiman excesos hídricos en toda la franja central de Buenos Aires, sectores del sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos. En el resto de la zona núcleo predominan los niveles de humedad adecuados y óptimos. El centro-norte de Santa Fe y de Entre Ríos presenta almacenajes óptimos, si bien conserva algunos sectores con reservas excesivas. En el centro-norte de Córdoba y en Corrientes también se estiman reservas adecuadas, al igual que en la mayor parte del sur de Chaco, Santiago del Estero y el resto del NOA, donde la escasez de lluvias de la última semana permitió un retroceso de los excesos hídricos. Por otro lado, en la mayor parte de Formosa, así como en el sudoeste de Buenos Aires y sudeste de La Pampa se mantienen las condiciones deficitarias, con pocas probabilidades de mejoras significativas, teniendo en cuenta el pronóstico de precipitaciones para la próxima semana.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y del INTA e información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Ante la ocurrencia de precipitaciones durante este último período registradas en la provincia de Chaco, el cultivo presenta una recuperación en su estado general, y se encuentra atravesando etapas que van desde floración hasta llenado de cápsulas.

En la provincia de Santa Fe, el cultivo presenta buen estado general, recuperado luego de las precipitaciones. La mayoría de la superficie se encuentra en la etapa de apertura de cápsulas. Se reporta una importante presencia de malezas en algunos lotes, y en lotes tardíos presencia del picudo del algodónero.

En Santiago del Estero, si bien han ocurrido precipitaciones de forma esporádica, y de bajo volumen, éstas permiten mantener el contenido hídrico del suelo, y por consiguiente el buen estado del cultivo, el cual todavía permanece en recuperación, por lo que hay buenas expectativas de rendimiento.

En la provincia de Salta, el cultivo se encuentra entre floración y llenado con los lotes más adelantados en madurez fisiológica. El estado del cultivo es bueno.

ARROZ

En la provincia de Corrientes, no obstante las abundantes precipitaciones registradas en la semana, continúa avanzando a buen ritmo la cosecha.

En la provincia de Entre Ríos, en la zona de la delegación Paraná, avanza la cosecha, con una superficie cosechada del 40% respecto al total implantado. Los rendimientos se ubican entre los 75 y 80 qq/ha.

En la zona de la delegación Rosario del Tala, avanza la cosecha, en situación de exceso hídrico. El 50% de los lotes de la variedad largo fino se encuentra maduro, mientras que el otro 50% necesita asoleamiento.

En la provincia de Santa Fe, en la zona de la delegación Avellaneda, la cosecha de la variedad largo fino, continúa avanzando, los rendimientos son levemente inferiores a los esperados, y se prevé que continúen disminuyendo. La variedad largo ancho, se encuentra en llenado.

En la zona de Rafaela, el cultivo continúa en buen estado general, en la etapa de llenado.

GIRASOL



Se ha generalizado la cosecha a nivel provincial, y ya alcanza el 24% del total implantado. Los rendimientos son muy variados, pero en general, se ubican por debajo de los valores esperados. En la zona del sudeste, los valores promedios se ubican cercanos a los 23 qq/ha. En la zona de Tandil, se han reportado granos con bajo peso y restaría evaluar las pérdidas ocasionadas por los eventos de granizo. Actualmente, ante las malas condiciones climáticas, las labores se encuentran demoradas, y se estima retomar en función de la mejora en las condiciones ambientales.

Hacia el sur-oeste, la permanente falta de humedad durante la evolución del cultivo, ha determinado sobre todo para aquellos lotes realizados en secano, rindes bajos encontrándose valores que van desde los 10 hasta 18 qq/ha.

En la zona centro y centro oeste, la cosecha avanza con buen ritmo, y ya se ha finalizado la cosecha en la zona de la delegación Pehuajó.

En la zona norte, tanto el oeste como el este, se avanza en las tareas de cosecha, exceptuando aquellas zonas donde las últimas precipitaciones han provocado excesos temporarios que impiden el paso de la maquinaria. Los rindes promedio se ubican cercanos a los 26,6 qq/ha.

En la zona de Pergamino, los fuertes vientos registrados en algunos de los partidos que pertenecen a la delegación, han provocado vuelco en algunos lotes, pero que aún tienen posibilidad de cosecha.

Se ha informado que en la zona de Veinticinco de Mayo, en los últimos días ha ocurrido una tormenta de viento y granizo, que ha ocasionado daños que en muchos casos llegan a la totalidad de los lotes afectados, se espera poder dimensionar las pérdidas en los próximos días.



La mayoría de los lotes implantados en la provincia, se encuentran entre R8 y R9, habiéndose iniciado la cosecha en aquellos más avanzados. Los rendimientos varían entre los 20 y 25 qq/ha, y van incrementándose en el transcurso de las labores. Estos valores son considerados muy buenos, y por lo general son mayores a lo esperado.



En la zona de General Pico, se han registrado algunas precipitaciones que si bien no generalizadas, fueron de mediana intensidad, suficiente para que en la zona afectada incida en el avance de cosecha, que se desarrolla en forma lenta y discontinua. Los rendimientos se continúan manteniendo entre los 22 y los 26 qq/ha, con valores excepcionales de 28 qq/ha.

Las precipitaciones también ocurrieron hacia el sur, en ámbitos de la delegación Santa Rosa, que de igual manera, demoran el avance de la cosecha. Los rindes obtenidos se sitúan entre los 12 y 25 qq/ha.



Luego de las últimas precipitaciones ocurridas en la provincia, la cosecha avanza con un ritmo moderado y en función de la condición de piso.



Continúa avanzando la cosecha, con buen ritmo. Los rendimientos hasta la fecha, se mantienen similares a los informados anteriormente, y se ubican entre los 24 y 30 qq/ha, para los lotes realizados bajo riego, mientras que para los de secano varían entre los 16 y 22 qq/ha.

MAÍZ



Comenzaron a cosecharse algunos lotes de maíz temprano en el norte provincial (delegaciones Pergamino y Junín), aunque se espera una mayor pérdida de humedad del grano. Los tardíos siguen con muy buen aspecto y llenando granos con buena disponibilidad de humedad. Se esperan muy buenos rindes.

En el área de las delegaciones Lincoln y Pehuajó los maíces tempranos están en etapa de madurez, en tanto que los tardíos se encuentran, principalmente, en etapa de llenado, beneficiados por las lluvias que se vienen produciendo desde principios de febrero.

También en la zona de las delegaciones Bragado, Veinticinco de Mayo, La Plata y Bolívar ha comenzado la cosecha de los maíces de siembra temprana. Algunos aún tienen valores de humedad del grano altos por lo que su destino es consumo directo para alimentación animal. Los de siembras tardía y de segunda se encuentran en estado de final de floración y llenado de granos.

En la delegación General Madariaga el cultivo se observa en buen estado general atravesando las etapas de grano lechoso y pastoso, en su mayoría.

Las lluvias registradas el día sábado 9 en toda la delegación Salliqueló oscilaron entre los 22 y 64 mm, con los mayores valores localizados en el partido de Salliqueló y los menores en la región sur (Adolfo Alsina y Guaminí). Las reservas hídricas continúan siendo regular a adecuadas. El estado general del maíz temprano es regular a bueno, en tanto que el tardío presenta un mejor aspecto.

También ocurrieron lluvias en el ámbito de las delegaciones Pigüé, Tres Arroyos y Tandil, en el sur bonaerense, que mejoran la situación hídrica del suelo ayudando a la etapa de llenado en que se encuentra el cultivo en su mayor proporción. Una situación particular se presenta en la zona de Coronel Dorrego en donde las lluvias fueron muy escasas, por lo que la situación hídrica del partido se ha tornado crítica.



Las precipitaciones registradas en la delegación Laboulaye variaron entre los 50-60 mm en el norte del departamento Sáenz Peña y en menos de 25 mm en el departamento General Roca. El total de la superficie con maíz temprano se encuentra entre grano dentado (R5) y madurez fisiológica (R6) presentando un buen aspecto general. La cosecha se retrasa a la espera de contar con una humedad adecuada del grano. La mayoría de los lotes con maíz tardío y de segunda se encuentra entre grano lechoso y pastoso, en tanto que los sembrados en enero están en la etapa crítica de floración.

Comenzó la trilla en el ámbito de la delegación Marcos Juárez, estimándose un 8-10% cosechado con promedios que van de 95 a 103 qq/ha. Los lotes tardíos se encuentran en estado de grano pastoso y los de fecha de diciembre o de segunda en grano lechoso. En general las siembras de septiembre y octubre presentan una excelente condición.

En la delegación Río Cuarto, los maíces tempranos ya están maduros, esperando la pérdida de humedad de los granos para comenzar la cosecha. Los tardíos están entre floración y llenado, siendo necesaria la ocurrencia de lluvias.

Los lotes implantados en la zona de la delegación San Francisco, en general, se encuentran en grano lechoso-pastoso. Se observan algunos afectados por chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*). Continúan las buenas condiciones climáticas en toda la delegación. Los perfiles del suelo se encuentran cargados y las temperaturas medias no son tan elevadas comparadas con campañas pasadas favoreciendo el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Se está realizando el picado de lotes con destino a forraje. Durante la semana ocurrieron precipitaciones de 20 a 30 mm reforzando la carga de humedad en el perfil. En zonas puntuales se están evaluando daños por granizo.

En la delegación Villa María el cultivo se encuentra entre floración y grano pastoso, en muy buen estado general. Los lotes sembrados temprano ya se encuentran casi listos para cosechar estimándose que no van a presentar muy buenos rindes ya que sufrieron mucho estrés durante su período crítico.



El maíz en la zona de la delegación Charata avanza en condiciones buenas. Las lluvias registradas han mejorado el estado de los cuadros que se encuentran entre finales de la etapa vegetativa y floración en su mayor proporción mientras que los cuadros tempranos ya avanzan en llenado de granos. Hay presencia importante de chicharrita del maíz con síntomas de Spiroplasma sobre la zona este y norte. Se está llevando a cabo su control sin mucho éxito, pero con descenso de la población.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña el cultivo se desarrolla en etapas vegetativas y algunos lotes más adelantados están próximos a floración. Por las lluvias registradas los lotes presentan una recuperación aceptable. Se evidencia presencia de Spiroplasma tanto de vector como síntomas, pero sin poder definir incidencia por el momento.



Continúa la cosecha del maíz de primera en la delegación Paraná, con algunas interrupciones por lluvias aisladas en la región. Las labores llegaron a cubrir cerca del 50% de la superficie. Los rendimientos obtenidos son buenos a muy buenos con un valor promedio de 74 qq/ha. Los maíces de segunda avanzan hacia el llenado de los granos con buena disponibilidad de humedad en el suelo, también en buenas a muy buenas condiciones. Se observa la presencia de chicharrita en muchos lotes con distintos niveles de afectación de Spiroplasma en plantas aisladas.

En la delegación Rosario del Tala el avance de cosecha del maíz de primera se mantiene en un 16% a raíz de las abundantes lluvias registradas en la semana.



En la región norte (delegación General Pico) se registraron precipitaciones de mediana intensidad y no generalizadas durante dos días en esta semana. La humedad del suelo continua siendo calificada como adecuada. Los lotes tempranos con destino a grano transcurren la etapa de madurez comercial. Los tardíos destinados a grano se encuentran entre las etapas fenológicas de final de floración hasta llenado de grano, presentando una adecuada cantidad y tamaño de

hojas y desarrollándose en óptimas condiciones agroclimáticas con perspectivas de buenos rendimientos.

En el área sur (delegación Santa Rosa) las lluvias registradas durante la semana promediaron los 30 mm. La reserva hídrica del suelo está en condición adecuada/regular. Los maíces de primera siembra temprana que están en etapa R5-R6 con una humedad entre 22% y 23% se encuentran en buenas condiciones con síntomas de estrés hídrico producto de la ola de calor transitada durante enero la cual afectó el potencial de rendimiento. Los maíces de primera tardíos, que se encuentran entre las etapas R2-R3, también se vieron afectados por la intensa y continua ola de calor de enero. El grado de afectación depende mucho del cultivo antecesor, viéndose más perjudicados los que vienen de un campo natural y pasturas que aquellos lotes cuyo manejo es mayormente agrícola. Se siguen observando muchos lotes con malezas de difícil control, Eleusine y Chloris. Los maíces de segunda, en estado VT a R1, también sufrieron el déficit hídrico, pero las lluvias de la segunda quincena de febrero y lo que va de marzo, llegaron a tiempo para su recuperación aunque su potencial de rendimiento ya fue disminuido.



Durante la semana se registraron algunas precipitaciones, entre 5 y 40 mm, en diferentes sectores de la provincia, que ayudan a mantener la humedad edáfica y favorecen el estado de los cultivos. Se están picando lotes para reservas forrajeras. En algunas localidades son necesarias lluvias ya que las mismas no fueron generalizadas en toda la provincia.



En el área de la delegación Avellaneda se registraron precipitaciones escasas y puntuales. Restan cosechar escasos lotes de maíz de primera en el departamento Vera. El maíz tardío y el de segunda están comenzando la floración, mientras que los más avanzados están iniciando el llenado de granos, todos en buen estado, con notable recuperación después de las lluvias. Sin embargo, una parte está muy afectada por Spiroplasma, con pérdida total o destino forrajero, estimándose en un 5-10% del área.

En el ámbito de la delegación Rafaela las precipitaciones alcanzaron acumulados de entre 5 y 70 mm. Continúan lentas las tareas de cosecha debido a las condiciones climáticas de la semana y de la humedad de grano, con muy buenos rindes, entre 65 y 100 qq/ha dependiendo de las zonas. Los maíces tempranos mayormente se encuentran en madurez, con descenso gradual de humedad en granos. Los de segunda están en floración y comenzando el llenado de granos los más avanzados, con una condición regular a buena, evaluándose el progreso de los lotes atacados con Spiroplasma.

En la zona de Cañada de Gómez la mayoría de los maíces de siembra temprana se encuentran en madurez fisiológica. Prosigue la cosecha con muy buenos rendimientos en torno a los 100 q/ha, alcanzando el 5% de la superficie total. Los maíces tardíos o de segunda, en su

totalidad, están en etapa de llenado de granos, favorecidos por las lluvias. Se observan lotes afectados por Spiroplasma en diferentes grados y dependiendo de la fecha de siembra.

Se inició la recolección de los primeros lotes en la delegación Casilda, con un buen promedio de rendimientos cercano a los 100 qq/ha. En estos planteos más precoces no se evidencian tanto los efectos causados por las altas temperaturas y la carencia hídrica de fin de ciclo, debido a que ya estaban avanzados en su estado. El menor peso de los granos y la falta de los mismos en la punta de las espigas se verá en los cuadros más tardíos. La superficie implantada con maíz tardío y de segunda continúa con una evolución favorable como respuesta a las recientes precipitaciones. Finalizó la floración y ya se encuentran en pleno llenado de granos. No se detecta presencia de plagas ni enfermedades.

En la delegación Venado Tuerto continúa la cosecha con niveles altos de humedad en grano y rendimientos buenos a muy buenos.



En la semana se dieron sólo algunos pocos episodios aislados de lluvias y de bajo volumen, aunque se mantuvieron las condiciones húmedas en el ambiente. Los registros marcaron entre 5 a 7 mm, como promedio, con algunos focos muy puntuales de más de 30 mm, permitiendo una sensible mejora en el estado de los cultivos. Los primeros maíces implantados están en floración. Aparecieron los primeros daños por Spiroplasma, que se estima afectan al 50% de los lotes, pero como todavía hay mucho en crecimiento, existe la posibilidad de que sean más. Esto se da en lotes que genéticamente no son resistentes.



En la última semana se registraron precipitaciones en algunas zonas que continúan acompañando a una parte de los cultivos en la definición del rendimiento. La mayoría de los planteos con maíz se encuentran en floración, mientras crece el porcentaje que comienza a cuajar granos. Incluso hay lotes con grano lechoso, mientras que los más adelantados se encuentran próximos a pasar a la etapa de grano pastoso. Se realizan monitoreos permanentes para el seguimiento de chicharritas y de esa manera evitar que el Spiroplasma avance. En la provincia de Jujuy, hasta el momento, sólo se observan focos muy puntuales, en cambio en la provincia de Tucumán, principalmente en la zona sur, hay algunos casos muy graves con pérdidas del 100% en varios casos.

MANÍ

En la provincia de Córdoba, luego de las últimas precipitaciones el cultivo se presenta recuperado y en buen estado general. La mayoría se encuentra en etapas que van desde llenado hasta inicios de madurez en los más adelantados. Se reporta presencia por debajo de los umbrales, de arañuela y viruela. En general, las expectativas para el cultivo son buenas, y se estiman rendimientos por encima de los promedios.

En la región del NOA, el cultivo presenta buen estado general, con la mayoría de los lotes en floración. Se esperan buenos rendimientos para esta campaña.

POROTO

En Jujuy el cultivo implantado se presenta en la etapa de crecimiento, con excepción del poroto mung, que ya ha iniciado la etapa reproductiva. Los adecuados niveles de humedad edáfica, mantienen al cultivo en buenas condiciones.

Si bien se registraron algunas precipitaciones, estas no han impedido el avance en la siembra, y que en la provincia de Salta, prácticamente ha finalizado, restando algunos lotes de variedad alubia.

SOJA



El cultivo de primera ocupación presenta diferentes etapas fenológicas, que dependen del grado de madurez y la fecha de siembra. En la zona norte provincial, se encuentran en su mayoría en la etapa de llenado, y los planteos más adelantados ya iniciando la madurez. Para este cultivo, la mejora en las condiciones hídricas fue sustancial, y en la mayoría de los casos ha logrado compensar la pérdida ocasionada por las elevadas temperaturas y la escasez hídrica.

Aún se reporta presencia de isocas y chinches, por debajo del umbral de daño.

La presencia de fuertes vientos ocurridos hacia finales de la semana pasada, han provocado diferente grado de daño. En la zona de la delegación Veinticinco de Mayo, en los partidos de Saladillo y el partido homónimo, la merma en el rendimiento podría alcanzar hasta el 30%.

Ya hacia el sur, este cultivo comienza a estar algo más retrasado, y transita etapas entre floración y llenado. En todos los casos, no se informan inconvenientes sanitarios, ni por presencia de plagas, enfermedades o malezas.

Para las sojas de segunda ocupación, la recuperación ante la mejora climática, es evidente, aunque en algunos casos no han podido recuperar el porte porque ya se encontraban afectadas en su desarrollo. No obstante, en caso de que las buenas condiciones climáticas acompañen, el

cultivo tiene muchas posibilidades de compensación, por lo que se estima que las mermas podrían no ser tan marcadas.



En general el cultivo de soja temprana o de primera ocupación, ya se encuentra iniciando la etapa de madurez. Ya finalizó la etapa de llenado, y en algunos casos, la escasez hídrica durante esta etapa, no ha permitido alcanzar el máximo potencial, no obstante se esperan buenos rendimientos, y hasta inclusive superar los promedios.

Las sojas tardías o de segunda, fueron las más afectadas por el estrés hídrico y calórico, y dependiendo la zona, ubicación del lote y manejo, se aprecian diferentes grados de afectación. Las últimas precipitaciones recibidas, han impactado positivamente en este cultivo, y se lo observa recuperado, aunque con menor desarrollo. La mayoría de la superficie se encuentra en la etapa de formación y llenado de granos, por lo que la ocurrencia de precipitaciones durante esta etapa es fundamental en la definición del rendimiento.

Respecto al estado sanitario, ya ha disminuido la presión de plagas, y aunque se reporta la presencia de isocas, trips, arañuela y chinches, los ataques no son relevantes.



Las temperaturas extremas que se han registrado durante la semana en la provincia, no han impactado sobre el estado del cultivo, ya que las precipitaciones ocurridas durante este último período, mantienen niveles adecuados de humedad en los perfiles, permitiendo al cultivo continuar su desarrollo. En cuanto al estado fenológico, los plantíos se encuentran en etapas que van desde plena floración hasta formación de vainas en aquellos lotes avanzados. En lo que respecta al estado, en general, presenta buenas condiciones y en muchos casos se encuentran recuperados, aunque se informan casos de sectores o parcelas enteras, que se encontraban en un estado muy avanzado durante la etapa de estrés hídrico y calórico, y que por lo tanto ya demuestran mermas irreversibles.



En la zona de la delegación Paraná, las sojas de primera como de segunda, se encuentran atravesando etapas que van desde floración hasta llenado, la condición de los lotes es buena, y se prevén buenos rendimientos. Se estima iniciar la cosecha de aquellos lotes avanzados en los próximos días.

En la zona de Rosario del Tala, las sojas de primera se hallan con muy buen aspecto, y la mayoría se encuentra en la etapa de llenado. Se reporta una elevada presencia de orugas debido a las condiciones ambientales de elevada temperatura y humedad. Respecto de la soja de segunda, la mayoría de los lotes se presentan en plena floración, y se encuentran muy recuperados.



Las precipitaciones registradas en la zona de General Pico, mantienen niveles adecuados de humedad en el perfil. El cultivo de primera ocupación atraviesa etapas que van desde formación de vainas hasta llenado, sin limitantes. Los lotes de segunda, presentan buenas condiciones beneficiados por las últimas lluvias con la mayoría de la superficie en plena floración.

En la zona de la delegación Santa Rosa, la semana transcurrió con precipitaciones que promediaron los 30 mm, por lo que la reserva hídrica en el suelo se califica como adecuada/regular. Las sojas de primera, se encuentran en R6, en condiciones de buenas a regulares, mientras que las sojas de segunda, que fueron las más afectadas por el estrés hídrico y calórico dado por las adversas condiciones climáticas ocurridas durante enero, se hallan recuperándose, y se encuentran en R4.



Durante la semana se registraron algunas precipitaciones que fueron desde los 5 hasta los 40 mm, lo que contribuye a mantener la humedad y por consiguiente el buen estado del cultivo.



En la zona de Avellaneda, los adecuados niveles de humedad en el perfil, contribuyen a la recuperación de los plantíos, que se encuentran en etapas reproductivas.

En la zona de Rafaela, el cultivo de soja de primera presenta muy buenas condiciones atravesando la etapa de llenado de granos y con buenas expectativas de rendimiento. Las sojas de segunda, atraviesan etapas que van desde floración hasta formación de vainas, con buen ritmo de crecimiento. Se realizan aplicaciones para control de arañuela y trips.

En Cañada de Gómez, las sojas de primera ya se encuentran finalizando la etapa de llenado y comienzan a ingresar en madurez. Las sojas de segunda, ante las precipitaciones recibidas, se encuentran en muy buenas condiciones, y la totalidad de los lotes se hallan en la etapa de llenado. Se realizan controles por importante presencia de chinches.

En la zona de Casilda, las sojas de primera atraviesan etapas que van desde llenado hasta inicios de madurez, dependiendo de la variedad empleada. Los rendimientos esperados se encontrarían entre los 35/40 qq/ha. Las sojas de segunda, presentan muy buena reacción luego de

las últimas lluvias, y se observan recuperadas, atravesando etapas que van desde llenado hasta tamaño máximo de semilla.

En Venado Tuerto, ya las sojas de primera ingresaron en las fases finales del cultivo, y se estima que en los próximos días se inicie la cosecha de los lotes con las variedades más cortas, mientras que los restantes se encuentran en R6/R7. Las de segunda, en llenado, beneficiadas por las precipitaciones.



Durante la semana se registraron precipitaciones aisladas, y de bajo volumen, pero que permiten mantener la humedad en el perfil, y que en general, favorece a la recuperación del cultivo. La mayoría de los lotes se encuentra en floración, con los últimos sembrados aún en etapas vegetativas, mientras que los más avanzados ya en llenado.



Nuevamente se registraron precipitaciones, lo que mantiene adecuados niveles de humedad en los suelos. El cultivo se encuentra en etapas que van desde floración hasta llenado, y se encuentran en buen estado y recuperados de los efectos del estrés hídrico y calórico. Se prevé una buena campaña con buenos rendimientos finales.

SORGO



El cultivo presenta buenas condiciones, en general, entre las fases de floración al sur y llenado de granos a madurez al norte de la provincia. Se los observa sanos y en buen estado general.



Las lluvias registradas durante la semana beneficiaron al cultivo, el cual se encuentra, principalmente, en la etapa de llenado de granos, en buenas condiciones. Se están realizando picado de lotes para destino forraje.



En el área de la delegación Rosario del Tala, con el agua en exceso se observa un incremento de gusanos. Quedan suspendidos los tratamientos hasta que mejoren las condiciones. Se demora el inicio de la cosecha.



Prosigue la cosecha en la delegación Avellaneda con rendimientos medios a bajos.

En las delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez, los sorgos presentan condiciones buenas a excelentes. Continúan, principalmente, en etapa de llenado de granos y los más adelantados en madurez fisiológica con perspectivas de muy buenos rindes.

En la delegación Casilda las lluvias impidieron el inicio de la cosecha de los lotes más precoces. Hacia la zona sur los excesos hídricos complican a los campos bajos donde se haya implantada buena parte del cultivo.




El cultivo se encuentra, en su mayoría, finalizando su etapa vegetativa, con algunos lotes avanzados en floración, en buenas condiciones favorecido por las lluvias de la semana anterior.



El sorgo granífero presenta una alta dispersión en sus etapas fenológicas. Hay un porcentaje importante, de siembra más tardía, que no llega a estados reproductivos pero se encuentra en muy buena situación. Al mismo tiempo, una parte mayoritaria se encuentra en floración, mientras que hay planteos en llenado que alcanzaron la etapa de grano pastoso, todos en una condición aceptable.

MAPA DE DELEGACIONES





AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	08/02 %	15/02 %	22/02 %	29/02 %	07/03 %	14/03 %
CORRIENTES	LA	11.600					8	26
	LF	83.400				2	14	38
T. CORRIENTES		95.000				2	13	37
PARANA	LA	2.200						
	LF	24.520					9	28
T. PARANÁ		26.720					8	26
R. DEL TALA	LA	3.900						
	LF	31.400				5	6	7
T. R.DEL TALA		35.300				4	5	6
T. ENTRE RÍOS		62.020				3	7	15
FORMOSA	LA							
	LF	15.000						
T. FORMOSA		15.000						
AVELLANEDA	LA	1.200						
	LF	10.300			10	15	25	50
T. AVELLANEDA		11.500			9	13	22	45
RAFAELA	LA	300						
	LF	14.000						
T. RAFAELA		14.300						
T. SANTA FE		25.800			4	6	10	20
TOTAL PAÍS	LA	19.200		0	0	0	4	14
	LF	178.620		0	1	3	10	25
TOTAL PAÍS 23/24		197.820	0	0	1	2	10	24
TOTAL PAÍS 22/23		193.780	0	0	1	5	12	24

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	08/02 %	15/02 %	22/02 %	29/02 %	07/03 %	14/03 %
Bahía Blanca	3.900					6	33
Bolívar	84.800					14	34
Bragado	8.600					30	40
General Madariaga	71.300					1	12
Junín	3.930						73
La Plata	9.000					15	45
Lincoln	35.000					2	25
Pehuajó	93.000				13	70	100
Pergamino	2.780					23	78
Pigüé	90.000			1	3	3	20
Salliqueló	155.000						4
Tandil	230.000						18
Tres Arroyos	257.811						16
25 de Mayo	50.767					1	7
BUENOS AIRES <i>23/24</i>	1.095.888	0	0	0	1	8	24
<i>22/23</i>	1.266.672	0	0	0	0	1	5
Laboulaye	67.923						26
Marcos Juárez	41.300				2	34	68
Río Cuarto	12.500						34
San Francisco	30.000		18	31	64	65	74
Villa María	8.900						
CÓRDOBA <i>23/24</i>	160.623	0	3	6	12	21	45
<i>22/23</i>	152.179	4	7	9	12	13	27
Paraná	11.225	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	6.000	80	95	100	100	100	100
ENTRE RÍOS <i>23/24</i>	17.225	93	98	100	100	100	100
<i>22/23</i>	20.090	74	79	83	86	87	91
General Pico	189.500			6	9	30	50
Santa Rosa	112.000				5	30	50
LA PAMPA <i>23/24</i>	301.500	0	0	4	7	30	50
<i>22/23</i>	281.900	0	0	0	0	4	9
Avellaneda	145.100	99	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	10.000	1	27	56	57	57	80
Casilda	8.000						46
Rafaela	35.200	68	82	98	99	100	100
Venado Tuerto	800				50	85	100
SANTA FE <i>23/24</i>	199.100	84	89	93	93	94	97
<i>22/23</i>	388.015	80	89	91	97	99	100
CATAMARCA	50						
CORRIENTES	700	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	81.100	97	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	63.320	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	3.100	100	100	100	100	100	100
JUJUY	0						
MISIONES	0						
SALTA	960						
SAN LUIS	80.200					1	27
STGO. ESTERO	2.350						
STGO. ESTERO (Quimilí)	9.510		31	100	100	100	100
TUCUMÁN	130						
TOTAL PAÍS <i>23/24</i>	2.015.756	16	17	19	21	28	43
<i>22/23</i>	2.465.201	21	23	24	25	27	30

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 08/03/2024 al 14/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	9	91	14	68	18	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	2	98	44	47	9	-	A
	JUNÍN	-	-	-	80	20	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	20	80	54	46	-	-	A
	LINCOLN	-	-	1	7	92	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	31	69	-	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	25	75	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	79	21	-	90	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	-	-	42	58	-	70	25	5	A/PS
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	44	55	1	-	R	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	33	67	20	70	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	0	15	84	-	80	20	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	22	78	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	6	50	30	14	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	46	28	26	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	32	68	-	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	10	90	-	-	98	2	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	27	73	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 08/03/2024 al 14/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	41	59	-	91	9	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	-	87	13	10	75	15	-	A
	BRAGADO	-	-	-	40	60	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	96	4	35	47	18	-	A/R
	JUNÍN	-	-	-	60	40	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	5	85	10	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	4	40	56	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	95	5	10	50	37	3	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	60	40	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	5	75	20	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	75	25	-	73	27	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	87	13	-	96	4	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	-	20	70	10	-	65	27	8	A/R/PS
25 DE MAYO	-	-	5	61	34	-	90	10	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	8	65	27	25	66	6	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	70	30	8	87	4	1	A
	RÍO CUARTO	-	-	40	45	15	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	35	60	5	-	72	28	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	47	50	3	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	5	20	1	74	3	97	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	2	22	26	50	35	59	6	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	20	50	30	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	40	60	-	-	68	32	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	63	21	7	9	12	41	30	17	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	30	70	50	28	22	-	A
	CASILDA	-	-	5	30	65	56	44	-	-	A
	RAFAELA	-	6	34	14	46	53	41	6	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	10	90	-	-	-	99	1	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	2	96	2	-	A
CHACO	CHARATA	-	57	33	10	-	28	62	10	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	58	42	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	30	50	20	-	-	100	-	-	E/A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	31	53	16	-	-	88	11	1	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	27	73	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	4	77	19	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	40	60	-	-	-	80	20	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	27	59	14	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 08/03/2024 al 14/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	2	42	56	-	-	87	13	-	-	2	42	56	-	-	84	16	-	A		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	36	64	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	4	76	20	-	-	100	-	-	-	-	79	21	-	-	100	-	-	A/R		
	QUIMILÍ	-	20	60	20	-	-	80	20	-	-	30	59	11	-	-	79	21	-	A/R		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	32	68	-	-	100	-	-	-	-	37	63	-	-	100	-	-	A		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina