

Estimaciones agrícolas

Informe semanal


21 de marzo de 2024

INFORME SEMANAL al 21 de marzo de 2024

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 21/03/2024
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 23/24
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar



PRECIPITACIONES

Se registraron importantes precipitaciones en la franja este del país, en general, y en el Litoral y norte de Buenos Aires en particular, donde se dieron lluvias y tormentas intensas. Los mayores milimetrajes se reportaron en Entre Ríos y Corrientes, con máximos locales en Rosario del Tala (252mm), Monte Caseros (219mm) y Galeguaychú (207mm), con gran cantidad de otras localidades con acumulados de 100-200mm. En el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires se destacan Rosario (171mm), y Ezeiza (142mm) y La Plata (109mm), respectivamente. En el resto de la provincia de Buenos Aires las precipitaciones fueron muy dispares, en general, de 30-60mm, ampliamente superados de forma local en estaciones como Olavarría (142mm) y Azul (113mm). Eventos similares se registraron en el este de La Pampa, acompañados de granizo, con un máximo en Santa Rosa (69mm), según datos oficiales. Por otro lado, se destacan las precipitaciones reportadas en el NOA, con un máximo puntual en Metán (182mm).




Precipitaciones acumuladas en la semana

No se esperan grandes acumulados durante el resto de la semana en el territorio argentino. Durante el miércoles 20 se espera que continúen los eventos intensos en el noreste de Buenos Aires, Litoral y, en menor medida, en la zona central y el NOA. Durante el jueves, a medida que el sistema se desplaza hacia el norte se prevén lluvias en Corrientes, Misiones y este de Chaco y Formosa. A partir del viernes los acumulados serían escasos o nulos en todo el país.

TEMPERATURAS

Las temperaturas medias de la última semana fueron superiores a las normales en la mitad norte del país, mientras que fueron inferiores en la mitad sur. En el NOA y el NEA las anomalías térmicas rondaron los 6°C por encima de la media, alcanzando los 9°C en Las Lomitas. Además, se superaron los 35°C en la mayor parte de dichas regiones e incluso los 40°C en gran cantidad de localidades de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y este de Salta, destacándose Rivadavia (44,5°C). Por otro lado, se registraron heladas agronómicas en Patagonia y las anomalías térmicas negativas rondaron los 3°C en la provincia de Santa Cruz. Se registraron temperaturas negativas en sectores aislados, reportándose en Río Grande (-4,5°C) la mínima marca térmica de la semana.




Anomalía de la temperatura media de la semana

Para la próxima semana se esperan temperaturas superiores a las normales en el centro y norte del país y normales en el resto del territorio nacional. A partir del miércoles 20, se produjo un descenso marcado de las temperaturas debido al ingreso de una masa de aire frío que alcanzaría el extremo norte del país durante el jueves 21. Entre jueves y sábado se mantendrían las temperaturas templadas, comenzando luego a aumentar nuevamente, conforme el sistema de alta presión se desplace hacia el este y permita nuevamente el ingreso de aire cálido desde el norte. Tanto durante el miércoles 20, como entre el domingo y martes de la semana que viene podrían darse máximas superiores a los 35°C en el norte del país.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para lotes con SOJA DE PRIMERA. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php. Nuevamente se registraron importantes precipitaciones en el área sojera nacional que provocaron recargas significativas y, en algunos sectores, profundizaron los excesos hídricos de la semana pasada. Conforme a esto, la mayor parte del centro y norte de Buenos Aires presenta excesos hídricos o reservas excesivas, salvo algunos sectores donde son óptimas, al igual que en el sudeste. Condiciones similares se observan en el centro y sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba. Prácticamente la totalidad de Entre Ríos y Corrientes se encuentra con excesos hídricos, situación que podría profundizarse debido a los eventos que continúan ocurriendo al momento de la elaboración de este informe. Córdoba mantiene niveles de humedad adecuados, en tanto que en la mayor parte de Santiago del Estero se observa una leve disminución de los mismos. En Chaco y Formosa el desecamiento es más marcado, debido a la escasez de lluvias de las últimas semanas, en tanto que en el NOA, el aporte de las últimas precipitaciones dio lugar a reservas excesivas. Por otro lado, en el norte de La Pampa mejora la situación, predominando los almacenajes adecuados, mientras que en el sudeste, al igual que en el sudoeste bonaerense, se mantienen las condiciones deficitarias.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y del INTA e información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

En la provincia de Chaco el cultivo se desarrolla entre etapas vegetativas a pleno capsulado continuando con la buena recuperación luego de las últimas lluvias registradas.

En la provincia de Santa Fe el cultivo presenta buen estado general, también recuperado luego de las precipitaciones. La mayoría de la superficie se encuentra en la etapa de apertura de cápsulas. Se están aplicando desecantes y maduradores en los lotes con mejor estado para empezar a cosechar dentro de una semana. Se observa alta presencia de malezas en algunos cuadros al este de la delegación Avellaneda lo que afectará la calidad y el rinde potencial. En los lotes tardíos hay presencia de picudo del algodón lo que está ocasionando pérdida de cargas. El síntoma es la claridad de las hojas, no teniendo el color verde-rojizo oscuro que caracteriza al algodón en los últimos estados reproductivos.

En Santiago del Estero la mayor parte del cultivo se desarrolla entre floración y llenado de cápsulas, observándose una muy buena recuperación luego de las lluvias, estando a tiempo de mejorar las expectativas de rinde.

En la provincia de Salta el cultivo continúa evolucionando de la etapa de floración a la de llenado de cápsulas, apuntalado por nuevos registros de lluvias. En cuanto a los lotes más adelantados, se estima que en 3 semanas se podría dar comienzo con su cosecha. Para estos lotes se esperan caídas en el rendimiento cercanas al 10% de lo esperado al comienzo de la campaña debido al efecto de las derivas de herbicidas hormonales.

ARROZ

En la provincia de Corrientes, prosiguió la cosecha hacia el final de semana cuando mermaron las lluvias, alcanzándose un 65% de avance del largo fino y un 58% del largo ancho. Los rindes obtenidos promedian los 70 qq/ha y 50 qq/ha, respectivamente.

También continuó la trilla en la provincia de Entre Ríos, alcanzando cerca del 40% de la superficie recolectada del arroz largo fino en el ámbito de la delegación Paraná y del 16% en la delegación Rosario del Tala. Los rendimientos son muy buenos promediado los 77 qq/ha, aproximadamente. En esta última delegación se inició la cosecha de la variedad largo ancho con un 4% de avance y un rinde promedio inicial de 60 qq/ha.

En la provincia de Santa Fe prosigue la cosecha del arroz largo fino en el departamento San Javier, con rendimientos que promedian los 62 qq/ha con un 55% de avance, aunque se estima que bajará a medida que avance. Los lotes de la variedad largo ancho se encuentran, en su mayoría, en llenado de granos. Comenzó lentamente la trilla del arroz largo fino en el departamento Garay, obteniéndose rindes que oscilan entre los 68 y 77 qq/ha.

GIRASOL



En la región noreste la cosecha se encuentra detenida por las abundantes precipitaciones registradas.

En la delegación Lincoln pudo avanzarse observándose una leve mejoría en los rindes, los que promedian los 27 qq/ha.

En las delegaciones Veinticinco de Mayo y Bolívar la trilla avanzó muy poco debido a las lluvias ocurridas. Los rindes han sido muy dispares, aunque en general, se esperaba que fueran más importantes que los obtenidos hasta el momento. La tendencia a priori se mantendría y seguirían en valores más cercanos al promedio de los últimos años y no al potencial que se esperaba para esta campaña. Los daños relevados en el sur de Saladillo y sudeste de Veinticinco de Mayo son muy importantes, en el caso de este cultivo el grado de afectación de los lotes es del 100%.

Continúa la cosecha en la delegación General Madariaga alcanzando un 80% de la superficie implantada, aproximadamente. A medida que fue avanzando el rendimiento fue cayendo por debajo de lo estimado, rondando un promedio de 22 qq/ha. Si bien restan muchos lotes al oeste de la delegación, probablemente hagan decaer aún más el promedio de rinde.

En la delegación Salliqueló la cosecha tomó buen ritmo luego de las precipitaciones. Se vienen obteniendo buenos rendimientos con promedios de 25-26 qq/ha. El estado general de los lotes en pie es bueno.

También prosiguió la trilla en toda la región sur, que abarcan las delegaciones Tandil, Tres Arroyos, Pigüé, Bahía Blanca, obteniéndose rindes disímiles, promediando los 22, 21, 11 y 17 qq/ha, respectivamente.



La cosecha en toda la provincia ya cubrió la mitad del área implantada. El rinde promedia los 23,5 qq/ha.



Durante la semana se registró un avance de cosecha que alcanzó el 65%, obteniéndose rendimientos que promediaron los 23,7 qq/ha.



En la zona de la delegación Cañada de Gómez la cosecha está por finalizar. Los rindes se ubican alrededor de los 19 qq/ha.

Las abundantes lluvias registradas en la zona de la delegación Casilda impidieron el avance de la cosecha, la cual ya cubrió la mitad de la superficie implantada.



Prosigue la cosecha a medida que se alcanza la humedad comercial, con rendimientos acordes a la zona y a las precipitaciones que ocurrieron durante su ciclo. Bajo riego varían entre los 24 y 30 qq/ha, mientras que en secano oscilan de 16 a 22 qq/ha.

MAÍZ



Durante esta semana se registraron precipitaciones en prácticamente toda la provincia, localizándose los mayores volúmenes en el noreste y zona central, las que no permitieron continuar con las tareas de trilla que habían comenzado incipientemente la semana anterior. Los maíces tempranos ya se encuentran en la etapa de madurez, en tanto que los tardíos y de segunda están, en su mayoría, en la etapa de llenado y la necesidad de agua, en general, ya estaría cubierta con lo acumulado en los últimos dos meses. En el área de la delegación Junín, se observan lotes puntuales de maíz tardío con presencia de la chicharrita *Dalbulus maidis* aunque por ahora no es significativa. No se están realizando controles aún.

En el ámbito de la delegación Bahía Blanca, la situación es diferente ya que siguen sin darse precipitaciones considerables que mejoren la humedad en el perfil, por lo que el estado de los lotes en secano es regular a malo. El estadio fenológico va desde fin de llenado a madurez perdiendo humedad,



En la zona de la delegación Laboulaye llovieron entre 15 y 40 mm en el departamento Sáenz Peña (con mayores registros hacia el este), en tanto que en General Roca las lluvias promediaron los 20 mm. El total de la superficie del maíz temprano se encuentra en R6 (madurez fisiológica) y a la espera de la humedad adecuada para iniciar la cosecha. La mayoría de los lotes de maíz tardío y de segunda está entre grano lechoso y pastoso. Se están picando aquellos lotes con destino a ensilado.

La cosecha del maíz temprano que se había iniciado en el ámbito de la delegación Marcos Juárez fue interrumpida por las lluvias de esta semana. Se estima un 10 - 12% cosechado con rindes que promedian los 95 – 105 qq/ha. Los lotes tardíos se encuentran en estado de grano pastoso duro y los sembrados en diciembre y los de segunda están en etapa de grano lechoso.

En la delegación Río Cuarto, los maíces tempranos ya están maduros, esperando que mejore el tiempo que permita la pérdida de humedad de los granos para comenzar la cosecha. Los tardíos fueron beneficiados por las lluvias permitiendo un adecuado llenado de granos. Se acentúan las enfermedades de tizón y roya.

Los lotes implantados en la zona de la delegación San Francisco, en general, se encuentran en grano lechoso-pastoso. Se observan algunos afectados por chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*). Los días se presentan con alta humedad ambiente y precipitaciones aisladas y muy diversas. Se está realizando el picado de lotes con destino a forraje.

En la delegación Villa María se produjeron lluvias aisladas con escasos milímetros, de entre 2 y 5 mm. El cultivo está atravesando varios estados fenológicos, desde floración hasta maduración. Algunos lotes ya se han trillado y otros se han destinado a forraje. Pero, en términos generales, el maíz está en grano lechoso y grano duro, en buen estado general salvo por la presencia de algunas plagas pero no de alta infección. Hubo presencia de chicharrita, sin alcanzar a generar daños considerables, y presencia de roya y tizón en maíces tardíos.



En el ámbito de la delegación Charata el cultivo avanza entre fines de fase vegetativa a fin de llenado de granos, en condiciones dispares. Las enfermedades manifiestas en su etapa reproductiva sumadas al estrés hídrico determinaron una campaña complicada para el cereal. Hacia el oeste, en el límite con la provincia de Santiago del Estero, las dificultades causadas por *Spiroplasma* son importantes, con mermas generales del 30 al 40%.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña el cultivo se desarrolla entre etapas vegetativas a plena floración. Las últimas lluvias permitieron una recuperación aceptable de los maíces. Se evidencia presencia de *Spiroplasma* tanto de vector como síntomas, pero sin poder definir incidencia por el momento.



Continúa lentamente la cosecha del maíz de primera en la delegación Paraná, persistiendo las interrupciones por lluvias en casi toda la región. Los rendimientos obtenidos son muy buenos a buenos con un valor promedio de 74 qq/ha. Los maíces de segunda avanzan hacia el llenado de los granos, en buenas a muy buenas condiciones. Se observa la presencia de chicharrita en muchos lotes con distintos niveles de afectación de Spiroplasma en plantas aisladas.

En la delegación Rosario del Tala las fuertes lluvias detuvieron el avance de cosecha del maíz de primera que se mantiene en un 17%. La trilla comenzó a finales de febrero con los primeros lotes sembrados en septiembre, y si bien los rindes son muy buenos, 80-90 qq/ha, se está cosechando mucho grano húmedo. Los sembrados en octubre-noviembre están mejor en apariencia, ya que las lluvias acompañaron en momentos cruciales. En cuanto a los más tardíos, son los que más preocupan, ya que la infestación con chicharrita está siendo muy alta, con síntomas característicos como el estriado fino en hojas y espigas de distinto tamaño. Algo mejor está la situación en el sur, departamento Gualeguay por este tema, pero la plaga está difundida por toda la jurisdicción.



En la región norte (delegación General Pico) nuevamente se registraron precipitaciones de mediana intensidad y no generalizadas. La humedad del suelo continúa siendo calificada como adecuada. Los lotes tempranos con destino a grano transcurren la etapa de madurez comercial. Los tardíos destinados a grano se encuentran entre las etapas fenológicas de final de floración hasta llenado de grano, presentando una adecuada cantidad y tamaño de hojas y desarrollándose en óptimas condiciones agroclimáticas con perspectivas de buenos rendimientos.

En el área sur (delegación Santa Rosa) la reserva hídrica del suelo está en condición adecuada/regular. Los maíces de primera siembra temprana, que están en etapa R5-R6 con una humedad entre 20% y 21%, se encuentran en buenas condiciones con síntomas de estrés hídrico producto de la ola de calor transitada durante enero la cual afectó el potencial de rendimiento. Los maíces de primera tardíos, que se encuentran entre las etapas R2-R3, también se vieron afectados por la intensa y continua ola de calor de enero. El grado de afectación depende mucho del cultivo antecesor, viéndose más perjudicados los que vienen de un campo natural y pasturas que aquellos lotes cuyo manejo es mayormente agrícola. Se siguen observando muchos lotes con malezas de difícil control, Eleusine y Chloris. Los maíces de segunda, en estado R1, también sufrieron el déficit hídrico, pero las lluvias de la segunda quincena de febrero y lo que va de marzo, llegaron a tiempo para su recuperación aunque su potencial de rendimiento ya fue disminuido.



Durante la semana se registraron precipitaciones en diferentes sectores de la provincia, de entre 5 y 80 mm, que ayudan a mantener la humedad edáfica y favorecen el estado de los cultivos. Se están picando lotes para reservas forrajeras. En algunas localidades son necesarias lluvias ya que las mismas no fueron generalizadas en toda la provincia.



En el área de la delegación Avellaneda se registraron precipitaciones puntuales e irregulares que oscilaron entre los 2 y 120 mm. El 80% de la superficie del departamento Nueve de Julio no recibió lluvias por lo que la mayor parte se encuentra con déficit hídrico. Por otro lado, hay zonas inundadas en la región este. Finalizó la cosecha de los lotes de maíz de primera. El maíz tardío y el de segunda están comenzando el llenado de granos, en buen estado, con notable recuperación después de las lluvias. Sin embargo, una parte está muy afectada por Spiroplasma, con pérdida total o destino forrajero, estimándose en un 15% del área. Se observa ataque de pulgones, pero no se pueden evaluar pérdidas todavía.

En el ámbito de la delegación Rafaela las precipitaciones alcanzaron acumulados de entre 5 y 70 mm. Las tareas de cosecha son casi nulas o continúan muy lentas debido a las condiciones climáticas de la semana y de la humedad de grano, con buenos rindes, de entre 65 y 100 qq/ha, dependiendo de las zonas. Los maíces tempranos se encuentran en madurez. Los de segunda están en floración y llenado de granos los más avanzados, con una condición regular, buena a muy buena, según el grado de afectación con Spiroplasma.

En la zona de Cañada de Gómez la mayoría de los maíces de siembra temprana se encuentra en madurez fisiológica. Prosigue la cosecha con muy buenos rendimientos en torno a los 100 q/ha, alcanzando el 20% de la superficie total. Los maíces tardíos o de segunda, en su totalidad, están en etapa de llenado de granos, favorecidos por las lluvias. Se observan lotes afectados por Spiroplasma en diferentes grados y dependiendo de la fecha de siembra.

Las abundantes lluvias registradas en toda la delegación Casilda impidieron el avance de la cosecha. Se registraron también algunos vientos fuertes que pueden haber ocasionado quebrado de plantas o caída de espigas. Por el momento, los campos son inaccesibles, de manera que la evaluación de daños se realizará en los próximos días. El volumen precipitado es ampliamente satisfactorio para cumplimentar la demanda de los maíces tardíos, por lo cual el piso de rendimientos está asegurado y se estiman promedios superiores a los 80 qq/ha.

En la delegación Venado Tuerto la cosecha prosiguió hasta la ocurrencia de lluvias. Los rendimientos son buenos a muy buenos, promediando los 98 qq/ha con un 15% recolectado.



En la semana se registraron precipitaciones en toda la provincia con milimetrajes muy variables que fueron desde los 15 a 115 mm permitiendo que los cultivos continúen presentando un buen estado. Los primeros maíces implantados están en floración. En la delegación Quimilí aparecieron los primeros daños por Spiroplasma, que se estima afectan al 5% de los lotes, pero como todavía hay mucho maíz en crecimiento, existe la posibilidad de que sean más. Esto se da en lotes que genéticamente no son resistentes.



Las precipitaciones continúan con mucha frecuencia y alta intensidad en las distintas zonas de la región. En cuanto a las temperaturas siguen muy elevadas, por encima del promedio. Estas condiciones son favorables para el cultivo, el cual, en su mayor porcentaje, transita etapas de floración a llenado con muy buenas perspectivas de rinde, salvo aquellos lotes afectados por Spiroplasma transmitida por la chicharrita, principalmente en la zona sur de la provincia de Tucumán, en donde se presentan algunos casos muy graves con pérdidas del 100% en varios casos.

MANÍ

En la provincia de Córdoba, las últimas precipitaciones favorecen al cultivo que presenta un buen estado general. La mayoría de los lotes se encuentra en etapas que van desde llenado de granos hasta inicios de madurez, los más adelantados. Se reporta presencia por debajo de los umbrales, de viruela y roya. En general, las expectativas para el cultivo son buenas, y se estiman rendimientos por encima de los promedios.

En la región del NOA, el cultivo se encuentra entre etapas de floración y llenado de granos. Las recientes lluvias vuelven a apuntalar al cultivo en el mantenimiento de una condición satisfactoria.

POROTO

En la provincia de Jujuy el cultivo, en sus diferentes variedades, continúa transitando la etapa de crecimiento, con plantas en excelentes condiciones por la humedad que lo acompañó desde la siembra.

En la provincia de Salta los nuevos aportes hídricos permitieron continuar con las labores de implantación del poroto alubia, quedando próximas a su culminación. El resto de los porotos encontraron alivio con las lluvias a una seguidilla de jornadas con altas temperaturas, permitiendo mantener la buena condición que vienen presentando.

SOJA



Las sojas de primera presentan diferentes etapas fenológicas que dependen del grado de madurez y la fecha de siembra. En la zona norte provincial ya comienzan a mostrar los primeros síntomas del final del ciclo, observándose las primeras hojas amarillentas. La mejora en las condiciones hídricas fue sustancial, y en la mayoría de los casos ha logrado compensar la pérdida ocasionada por las elevadas temperaturas y la escasez hídrica de fines de enero-principios de febrero. Hacia el sur de la provincia el cultivo transita, principalmente, la etapa de llenado de grano y su estado general es bueno a muy bueno.

Las sojas de segunda evolucionan satisfactoriamente y también se han recuperado notablemente con las lluvias luego de haber sido afectadas por el estrés hídrico y térmico de la segunda quincena de enero y primeros días de febrero. Su estado ontogénico es de floración y comienzo de llenado de granos.



En general el cultivo de soja temprana o de primera ocupación, ya se encuentra iniciando la etapa de madurez. Se esperan buenos a muy buenos rindes.

Las sojas tardías o de segunda, están en pleno llenado de granos con aceptable estado y buenos rendimientos potenciales.

El cultivo, en gran parte, se ha recuperado de los efectos de las altas temperaturas de enero, y en los últimos 10 días recibieron lluvias que permitieron su recuperación.

En la zona de la delegación San Francisco se están realizando aplicaciones con fungicidas para el control de mancha marrón (Septoria) entre otras enfermedades. También se están aplicando insecticidas para control de chinches e isocas.



El cultivo de soja avanza en su etapa reproductiva, desde plena floración a comienzo de llenado de granos en condiciones regulares a buenas, en zonas puntuales de buen aporte hídrico. Las altas temperaturas han complicado algunos cuadros marcando un estrés importante en el período crítico que podrían determinar mermas en el rendimiento. Los cuadros más retrasados, en

etapas vegetativas a floración, podrían saltar estas condiciones y mejorar su estado general si se registran lluvias y bajan las temperaturas.



ENTRE RÍOS

En la zona de la delegación Paraná, las sojas de primera como de segunda se encuentran atravesando etapas de llenado. La condición general de las mismas es buena, con buenas perspectivas de rendimiento. Se estima iniciar la cosecha de aquellos lotes avanzados en los próximos días.

En la delegación Rosario del Tala las sojas de primera están finalizando la etapa de llenado de grano. Se esperan muy buenos rendimientos aunque se teme por la continuidad del mal tiempo que podría malograr una parte importante de la cosecha. La apariencia del cultivo es muy buena, a pesar de la existencia de chinches y gusanos medidores. Las sojas de segunda están cubriendo los espacios iniciales de la falta de plantas provocada por el estrés hídrico de fines de enero. También presentan muy buen aspecto y no se reportan daños mayores por las fuertes lluvias. A los controles de plagas se les suma la aplicación de fungicidas por presencia de roya favorecida por el clima muy húmedo.



LA PAMPA

En el área de la delegación Santa Rosa la reserva hídrica del suelo está en condición adecuada/regular. El estado fenológico de las sojas de primera es R6/R7 (semilla llena/inicio de madurez) y se encuentran en buenas a regulares condiciones, recuperándose de la ola de calor de enero gracias a las lluvias de febrero y las que se van registrando en marzo. Las sojas de segunda, que fueron las más afectadas por el estrés hídrico y calórico de enero, se encuentran en etapa R5 (inicio formación semillas). Comenzaron a proliferar las plagas como chinche, isoca y arañuela roja común que se están controlando.



SAN LUIS

Durante la semana se registraron algunas precipitaciones que fueron desde los 5 mm hasta los 80 mm, lo que contribuye a mantener la humedad y por consiguiente el buen estado del cultivo, el cual se encuentra entre floración y llenado en el caso de la soja de primera y crecimiento, la soja de segunda. Se observan ataques de arañuelas e isocas que se están controlando.



En la zona de Avellaneda, los adecuados niveles de humedad en el perfil, contribuyen a la recuperación de los plantíos, que se encuentran en etapas reproductivas.

En la zona de Rafaela, los lotes de soja de primera están en buenas a muy buenas condiciones, finalizando el llenado de los granos y los más avanzados comenzando la madurez. Se mantienen muy buenas expectativas de rindes para esta campaña. Se realizan aplicaciones contra enfermedades de fin de ciclo. El buen contexto climático permite una buena tasa de crecimiento en las distintas etapas de la soja de segunda que van de formación de vainas a llenado de granos. Se esperan rindes muy cercanos a los lotes de primera. Se realizan aplicaciones contra chinche.

En Cañada de Gómez, las sojas de primera ya se encuentran finalizando la etapa de llenado y comienzan a ingresar en madurez. Las de segunda, ante las precipitaciones recibidas, se encuentran en muy buenas condiciones, y la totalidad de los lotes se hallan en la etapa de llenado. Se realizan controles por importante presencia de chinches.

En la zona de Casilda, las sojas de primera se encuentran en la fase de madurez fisiológica a comercial por lo que las copiosas lluvias de esta semana ya no resultaron beneficiosas provocando anegamientos. Los rindes estimados son buenos, siempre y cuando no sigan las precipitaciones que pueden ocasionar pérdidas de plantas. Las sojas de segunda, con el reciente aporte hídrico, tienen cubierta la demanda de humedad para el llenado de granos. Como labor de protección, sólo restan por aplicarse los últimos tratamientos de fungicidas en variedades susceptibles a enfermedades foliares.

En Venado Tuerto, comenzaron a cosecharse los primeros lotes de sojas de primera con rendimientos que promedian los 37 qq/ha, debiéndose detener por las lluvias. Las sojas de segunda se encuentran en la etapa de llenado de granos con buena humedad esperándose rendimientos aceptables a buenos.



Durante la semana se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial con milimetrajes muy variables. Las sojas, tanto de primera como de segunda, mejoraron mucho después de las lluvias de fines de febrero y principios de marzo. Habían sufrido mucho la falta de lluvias y las altas temperaturas en enero, pero la mayoría estaban en estado vegetativo, por lo que los daños fueron menores. La mayor parte de los lotes está en floración y en inicio de llenado de granos.



Nuevamente se registraron precipitaciones, las que mantienen adecuados niveles de humedad en los suelos. El cultivo se encuentra en etapas que van desde floración hasta llenado, y se encuentran en buen estado y recuperados de los efectos del estrés hídrico y calórico. Se prevén buenos rendimientos finales.

SORGO



El cultivo presenta buenas condiciones, en general, entre las fases de floración a llenado de granos, al sur y llenado de granos a madurez, al norte de la provincia. Se los observa sanos y en buen estado general.



Las lluvias registradas durante la semana beneficiaron al cultivo, el cual se encuentra, principalmente, en la etapa de llenado de granos, en buenas condiciones. Se está realizando el picado de lotes para destino forrajero. En la zona norte (delegación San Francisco) continúan los monitoreos por encontrarse umbrales considerables de pulgón amarillo.



Comenzaron las tareas de recolección de manera muy incipiente y demoradas por las lluvias ocurridas durante los últimos días. Los lotes vienen panojando bien y ya se encuentra un 30% madurando. A los problemas con pulgón, se le suma la presencia de gusano cogollero.



Prosigue la cosecha en la delegación Avellaneda con rendimientos medios a bajos. Se observan muy desparejos por la etapa de estrés hídrico sufrida en enero y comienzos de febrero y las lluvias irregulares. Los lotes que recibieron humedad están madurando bien, pero están siendo atacados por pájaros. Los lotes que padecieron estrés hídrico están florecidos y madurarán más tarde.

En las delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez, lentamente se inició la cosecha de los lotes más adelantados, con buenos rindes, de entre 50 y 65 qq/ha. Se realizaron, además, las tareas de picado de los lotes destinados a consumo animal. Los cultivos presentan condiciones buenas a excelentes. Continúan en la etapa final de llenado de granos y madurez.

En la delegación Casilda las lluvias complican a los lotes de sorgo en su etapa de madurez, ya que la mayor parte del cultivo está en zonas bajas o con escurrimiento dificultoso. Es apresurado estimar las pérdidas pero probablemente haya una disminución del área apta para recolectar.



El cultivo se encuentra, en su mayoría, en floración, con algunos lotes avanzados en llenado, en buenas condiciones favorecido por las lluvias de la semana anterior.



El cultivo atraviesa etapas que van del crecimiento vegetativo hasta el llenado de granos. Las lluvias que tuvieron lugar durante el pasado fin de semana volvieron a beneficiar al cereal, que ya venía mostrándose mayoritariamente en muy buena condición.

A detailed map of Argentina showing its provinces and the city of Buenos Aires. The map is color-coded by province, with various shades of blue and green. Major cities are labeled, and the map includes the surrounding waters and the Falkland Islands.



AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	15/02 %	22/02 %	29/02 %	07/03 %	14/03 %	21/03 %
CORRIENTES	LA	11.600				8	26	58
	LF	83.400			2	14	38	65
T. CORRIENTES		95.000			2	13	37	64
R. S. Peña	LA	0						
	LF	5.900						
T. CHACO		5.900						
PARANA	LA	2.200						
	LF	24.520				9	28	40
T. PARANÁ		26.720				8	26	37
R. DEL TALA	LA	3.900						4
	LF	31.400			5	6	7	16
T. R.DEL TALA		35.300			4	5	6	15
T. ENTRE RÍOS		62.020			3	7	15	24
FORMOSA	LA	0						
	LF	15.000						
T. FORMOSA		15.000						
AVELLANEDA	LA	1.200						
	LF	10.300		10	15	25	50	55
T. AVELLANEDA		11.500		9	13	22	45	49
RAFAELA	LA	300						
	LF	14.000						35
T. RAFAELA		14.300						34
T. SANTA FE		25.800		4	6	10	20	41
TOTAL PAÍS	LA	19.200	0	0	0	4	14	31
	LF	184.520	0	1	3	10	25	42
TOTAL PAÍS 23/24		203.720	0	1	2	10	24	41
TOTAL PAÍS 22/23		193.780	0	1	5	12	24	39

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	15/02 %	22/02 %	29/02 %	07/03 %	14/03 %	21/03 %
Bahía Blanca	3.900				6	33	65
Bolívar	84.800				14	34	59
Bragado	8.600				30	40	40
General Madariaga	71.300				1	12	80
Junín	3.930					73	73
La Plata	9.000				15	45	80
Lincoln	35.000				2	25	45
Pehuajó	93.000			13	70	100	100
Pergamino	2.780				23	78	78
Pigüé	90.000		1	3	3	20	50
Salliqueló	155.000					4	22
Tandil	230.000					18	37
Tres Arroyos	257.811					16	34
25 de Mayo	50.767				1	7	14
BUENOS AIRES 23/24	1.095.888	0	0	1	8	24	45
22/23	1.266.672	0	0	0	1	5	19
Laboulaye	67.923					26	26
Marcos Juárez	36.400			2	34	68	71
Río Cuarto	12.500					34	70
San Francisco	30.070	18	31	64	65	74	75
Villa María	9.000						22
CÓRDOBA 23/24	155.893	3	6	12	21	45	50
22/23	152.179	7	9	12	13	27	49
Paraná	11.225	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	6.000	95	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 23/24	17.225	98	100	100	100	100	100
22/23	20.090	79	83	86	87	91	94
General Pico	189.500		6	9	30	50	62
Santa Rosa	112.000			5	30	50	70
LA PAMPA 23/24	301.500	0	4	7	30	50	65
22/23	281.900	0	0	0	4	9	17
Avellaneda	145.100	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	10.000	27	56	57	57	80	90
Casilda	8.000					46	46
Rafaela	35.200	82	98	99	100	100	100
Venado Tuerto	800			50	85	100	100
SANTA FE 23/24	199.100	89	93	93	94	97	97
22/23	388.015	89	91	97	99	100	100
CATAMARCA	50						
CORRIENTES	700	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	81.100	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	63.320	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	3.100	100	100	100	100	100	100
JUJUY	0						
MISIONES	0						
SALTA	960						
SAN LUIS	80.200				1	27	34
STGO. ESTERO	2.350						
STGO. ESTERO (Quimilí)	9.510	31	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	110						
TOTAL PAÍS 23/24	2.011.006	17	19	21	28	43	58
22/23	2.465.201	23	24	25	27	30	41

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 15/03/2024 al 21/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	-	2	98	14	68	18	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	2	73	25	-	A
	JUNÍN	-	-	-	25	75	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	5	95	54	46	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	4	96	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	22	78	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	45	55	-	90	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	17	83	-	70	25	5	A/R/PS
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	44	55	1	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	28	72	20	70	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	10	87	3	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	14	86	-	80	20	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	6	50	30	14	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	46	28	26	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	32	68	-	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	5	95	-	-	98	2	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	17	83	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	6	76	18	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 15/03/2024 al 21/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	25	75	-	91	9	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	-	85	15	10	75	15	-	A
	BRAGADO	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	78	22	9	67	24	-	A
	JUNÍN	-	-	-	40	60	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	5	80	15	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	29	71	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	95	5	10	50	37	3	A
	PERGAMINO	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	5	75	20	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	60	40	-	73	27	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	77	23	-	96	4	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	7	80	13	-	65	27	8	A/R/PS
25 DE MAYO	-	-	2	54	44	-	90	10	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	8	60	32	25	66	6	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	43	57	8	87	4	1	A
	RÍO CUARTO	-	-	20	63	17	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	28	67	5	-	72	28	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	39	50	11	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	1	20	4	75	3	97	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	17	28	55	35	48	10	7	E
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	20	50	30	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	29	71	-	-	68	32	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	32	34	25	9	12	41	30	17	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	30	70	50	28	22	-	A
	CASILDA	-	-	-	35	65	56	44	-	-	E
	RAFAELA	-	-	14	36	50	53	41	6	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	100	-	-	-	99	1	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	2	96	2	-	A
CHACO	CHARATA	-	28	46	26	-	19	50	24	7	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	93	7	-	-	-	58	42	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	10	60	30	-	-	100	-	-	E/A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	15	85	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	11	55	34	-	-	88	11	1	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	22	78	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	2	46	52	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	30	60	10	-	-	80	20	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	2	80	18	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 15/03/2024 al 21/03/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera									SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
SALTA	SALTA	-	-	31	69	-	-	87	13	-	-	-	31	69	-	-	84	16	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	31	69	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	51	49	-	-	100	-	-	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	59	41	-	-	80	20	-	-	-	60	40	-	-	79	21	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	12	88	-	-	100	-	-	-	-	17	83	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca



Ministerio de Economía
Argentina