

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

19 de septiembre de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 19 de septiembre de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 19/09/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Arroz, Girasol, Maíz)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Maíz)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días las lluvias fueron escasas y sólo tuvieron acumulados de relevancia en Misiones y Corrientes, destacando los registros de Bernardo de Irigoyen (36mm) y Paso de Los Libres (19mm). El resto del país, incluyendo Entre Ríos y algunos sectores costeros de Santa Cruz y Tierra del Fuego presentó registros de hasta 10mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 11/09/2024 al 17/09/2024

El avance del sistema de baja presión generada en la zona centro-norte del país, ocasionará lluvias entre jueves y viernes en La Pampa, Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y el NEA. Entre jueves y martes de la próxima semana se esperan precipitaciones en zonas cordilleranas de Patagonia y Cuyo, con posibilidad de acumulados de nieve en el mismo sector. Entre lunes y martes de la próxima semana podrían darse lluvias de forma aislada en algunos sectores del norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y también el NEA.



TEMPERATURAS

El mapa de anomalía de temperatura media de los últimos días muestra valores mayoritariamente normales o por sobre lo normal en todo el país. Se observaron registros de máximas sobre los 35°C en Las Lomitas en Formosa, Orán en Salta y en Catamarca. Se destaca la ocurrencia de heladas meteorológicas en la semana en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, siendo los registros principales los de Coronel Suárez (-1,7°C), Tandil (-1,1°C), Mar del Plata (-0,8°C) y Los Toldos (-0,5°C).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 11/09/2024 al 17/09/2024


En la semana se esperan temperaturas medias por encima de lo normal en el centro y norte del país, mientras que en el sur, se esperan temperaturas normales y por debajo de lo normal. En el norte del país, se esperan altas temperaturas durante el jueves, con un descenso durante el viernes debido al avance de un sistema de baja presión generado en el centro-norte del país. A partir del sábado se espera que vuelvan a aumentar las temperaturas hasta el próximo martes con un leve descenso en algunos sectores del NOA. Varias localidades del NEA y NOA podrían registrar máximas sobre 35°C. En la zona central también se prevé un descenso de las temperaturas entre jueves y viernes al menos en el centro-norte, mientras que el centro-sur de Argentina mantendrá temperaturas más bajas entre el viernes y el lunes de la próxima semana, con posibilidad de heladas agronómicas en algunos sectores serranos de Buenos Aires. Para la Patagonia, además del descenso generado por el sistema de baja presión, se prevé el ingreso de un sistema frontal durante el fin de semana, lo que mantendrá las temperaturas bajas entre el jueves y martes de la próxima semana.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Debido a las escasas precipitaciones en la semana se observa un secamiento generalizado en La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Algunos sectores del sur de Corrientes, norte, centro y este de Buenos Aires mantienen reservas regulares a adecuadas con algunos suelos puntualmente con reservas óptimas al este y noreste de Buenos Aires. Podría haber un mejoramiento en las condiciones en función de las lluvias previstas entre jueves y viernes en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la región del NOA los planteos con cártamo se encuentran, mayormente, en floración con algunos cuadros más adelantados que empezaron a llenar granos. El estado de los lotes con la oleaginosa, por lo general, continúa siendo bueno.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires, la mayor parte del cultivo se realiza en la región centro-norte y este, la más favorecida por las lluvias, por lo que se lo observa en muy buenas condiciones con un contenido de humedad adecuado durante todo el ciclo transcurrido. La principal etapa fenológica en la que se encuentra es la de floración.

En Córdoba también se encuentra en dicha fase pero presenta un retraso en el crecimiento por el déficit hídrico que afecta a la provincia.

En la provincia de Entre Ríos se observan sectores con un stand de plantas regular debido al bajo contenido hídrico de los suelos. De todas maneras, por el momento, el cultivo, en general, presenta un buen aspecto y sanidad, en plena floración.

CEBADA



En general, el cultivo presenta un adecuado desarrollo, principalmente en las zonas beneficiadas por las lluvias de fines de agosto-principios de septiembre, correspondiente a la región centro-noreste-este y sur. Los partidos menos beneficiados fueron los de la región noroeste los que presentan una humedad edáfica limitante para el desarrollo de los lotes. Los mismos se encuentran en etapa de macollaje a encañazón en el norte provincial, en tanto que hacia el sur aún están en macollaje. No presentan problemas sanitarios.





La condición de déficit hídrico que afecta a la mayor parte de la provincia determina un retraso en el desarrollo del cultivo, el cual se encuentra en etapa de encañazón.



El cultivo evoluciona normalmente, en etapas fenológicas de macollaje y comienzos de encañazón.



Los lotes de cebada se encuentran un poco afectados por la falta de precipitaciones, estimándose una reducción en su rendimiento potencial. Comienza a observarse incidencia de mancha en red en la zona central, la cual se mantiene contenida debido a la baja humedad ambiental.



La situación de este cereal es similar a la del trigo. Los pocos lotes de cebada que se siembran en esta provincia están iniciando la floración con necesidad de lluvias para poder obtener buenos resultados.

GARBANZO

En el centro-norte de la provincia de Córdoba, región en donde se realiza este cultivo, los lotes se encuentran en plena floración, en buenas condiciones sanitarias. En lotes puntuales se visualiza amarillamiento de brotes por efecto de la sequía, que sigue afectando a la zona, y las heladas del mes de agosto.



En la región del NOA, el cultivo también se encuentra en floración pero con un porcentaje importante de lotes que ya está formando los cascabullos o vainas. La condición del cultivo es aceptable, sobre todo en los casos en que se cuenta con la posibilidad de riego artificial.

En la provincia de Santiago del Estero los lotes van empeorando su condición por la ausencia prolongada de lluvias, además de haber sido perjudicados por las heladas del mes de agosto.

LINO

El lino implantado en la provincia de Entre Ríos presenta buen aspecto, encontrándose en etapa vegetativa, mayoritariamente.

TRIGO



Las precipitaciones de fines de agosto en la región noreste-este recargaron los perfiles permitiendo la recuperación del cultivo de la situación de estrés que lo venía afectando en sus primeras etapas de crecimiento por la falta de agua y los días fríos y con heladas. Su estado es muy bueno, observándose un canopeo voluminoso y con buen estado sanitario. En estos días se han aprovechado los días sin lluvias para completar planteos de refertilizaciones nitrogenadas.

En la región centro, sudeste y sudoeste provincial, se mantienen las condiciones adecuadas de agua útil en los perfiles edáficos y el cultivo presenta un buen estado general. De todas maneras sería conveniente que ocurran precipitaciones debido al aumento de la temperatura y a la mayor demanda del cultivo en las próximas etapas.

En la región noroeste, en donde las lluvias fueron menores, el estado del cultivo es bueno a regular, observándose un mejor desarrollo de los trigos ciclo largo a diferencia de los cortos que fueron más afectados por la falta de humedad edáfica y las bajas temperaturas en el momento de su emergencia e inicio de desarrollo.

En cuanto a la etapa fenológica, en la zona norte los primeros trigos sembrados están iniciando la etapa de encañazón, en tanto que los últimos se encuentran en etapa de macollaje. En la zona centro-sur, se observan en pleno macollaje.

En general, el estado sanitario es muy bueno y no se observan problemas generalizados de plagas o enfermedades.





La falta de lluvias sigue complicando el estado del cultivo, el cual presenta escaso desarrollo por la insuficiente humedad y las heladas del mes de agosto. Sólo se observan lotes en muy buenas condiciones en la zona central de los departamentos Unión y Marcos Juárez, más beneficiados por las lluvias.

La etapa fenológica en la zona sur es pleno macollaje con algunos lotes iniciando la etapa de encañado, mientras que en el norte están en encañazón con algunos lotes emitiendo la hoja bandera. Se observa un acortamiento del ciclo por las condiciones climáticas. El inminente inicio de las etapas críticas reproductivas hace que sea necesaria la pronta ocurrencia de precipitaciones.

No se reportan problemas de plagas importantes, sólo la presencia de pulgón en bajo porcentaje en algunos lotes al norte de la provincia. Tampoco se observan altos niveles de enfermedades de hoja.



El cultivo se encuentra en etapas de floración a formación de granos, en estado general regular a malo. La ausencia de lluvias adecuadas determina una situación de déficit hídrico en gran parte de la provincia, con importantes pérdidas en el rendimiento potencial.



La mayoría de los lotes se encuentran en la etapa de encañazón, observándose los primeros lotes con la hoja bandera emitida y con algunas espigas emergiendo. El estado del cultivo se mantiene como bueno en su mayoría, aunque en zonas con mayor escasez de agua presenta menor crecimiento. No se reportan complicaciones por presencia de plagas ni enfermedades.





En el norte provincial, el estado general de los lotes es bueno, presentando buen desarrollo radicular. La mayor parte de la superficie transita la etapa fenológica de macollaje y los más adelantados ya iniciaron el período de encañazón.

En la región sur, menos beneficiada por las lluvias, el cultivo se encuentra en etapa de crecimiento en estado regular, ya que la humedad en el suelo está en un estado de sequía a escasez hídrica.



En la zona norte, delegación Avellaneda, el cultivo se encuentra en la etapa de floración, con algunos lotes, más adelantados, llenando granos. El estado es regular a malo, debido a las condiciones de escasez de humedad, siendo más grave la situación en la región oeste.

En la zona central, la situación es similar, con ausencia de precipitaciones de manera prolongada, lo que está afectando el rendimiento potencial del cultivo, el cual se encuentra en etapa de encañazón. Se evidencian síntomas de estrés hídrico, comenzando a incrementarse los cuadros en estado regular y malo. Se observa la presencia de chinches y de roya anaranjada en materiales susceptibles.

En la delegación Casilda los trigos presentan una buena evolución, en el estado de encañazón. Hacia el sector oeste se observa alguna sintomatología de estrés hídrico, con un menor desarrollo foliar, pero aún conservando una buena proyección de rendimiento potencial. Si bien no se ha manifestado presencia masiva de síntomas de enfermedades, se detectaron algunos lotes con incipiente aparición de roya, mancha amarilla y bacteriosis por lo cual ya se han iniciado las aplicaciones de fungicidas, especialmente en variedades susceptibles.

En el ámbito de la delegación Venado Tuerto el cultivo se encuentra en encañazón con aspecto regular y poco desarrollo, a la espera de lluvias para que los rindes no sigan disminuyendo.





Nuevamente sin precipitaciones durante la semana, lo que prolonga la condición de sequía en toda la provincia; además se dieron altas temperaturas afectando aún más al cultivo el cual presenta síntomas de estrés hídrico. La mayoría de los lotes se encuentra en plena floración con algunos iniciando el llenado de granos, lo que complica aún más la situación. Los cuadros bajo riego presentan muy buenas condiciones.



El tiempo continúa seco con temperaturas más elevadas de lo habitual deteriorando el estado del cultivo el cual presenta poco crecimiento y acortamiento de los ciclos de desarrollo, sobre todo los planteos realizados a secano. Los lotes realizados bajo riego presentan mayor desarrollo cubriendo los surcos. La etapa fenológica va desde floración hasta llenado de granos variando de acuerdo al ciclo del cultivo.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ARROZ

Se inició la siembra del arroz largo fino en el departamento San Javier, al norte de la provincia de Santa Fe.

GIRASOL



Prosiguió la siembra en la zona de la delegación Marcos Juárez, principalmente en zona de cañada, es decir, en lotes marginales con humedad regular a adecuada.





La siembra del cultivo se aproxima al 70 % de la intención en toda la provincia, a la espera de nuevas precipitaciones. Los lotes más avanzados se encuentran en la etapa de diferenciación de hojas, en estado regular a bueno. La disponibilidad de agua es limitada y la falta de lluvias podría afectar el desarrollo del cultivo.



Pese a la merma de humedad en el suelo continua la siembra del girasol, habiéndose cubierto la mitad de la superficie estimada final.



La siembra, que se venía realizando en la región centro-norte de la provincia, se encuentra detenida debido a la falta de humedad en la cama de siembra. Se observan emergencias lentas, pero con buen stand de plantas logrado, sin inconvenientes de plagas ni enfermedades, aunque algunos de los últimos lotes implantados presentan manchoneado debido a la humedad muy ajustada.



En la delegación Quimilí la siembra del girasol está paralizada por falta de humedad en la capa superficial de siembra. Se estima que, de ocurrir precipitaciones en los próximos días, la superficie podría aumentar, ya que en los departamentos del sur existe la posibilidad de sembrar más tardíamente.



MAÍZ



Se informa el inicio, de manera incipiente, de la siembra de los maíces tempranos en el ámbito de la delegación Bragado, en los lotes que recibieron precipitaciones a fines de agosto. Se estima que la superficie a sembrar con este cereal será igual o levemente superior a la campaña anterior, a pesar del pronóstico climático de menores precipitaciones y el temor a la difusión de la chicharrita en esta zona.



En la última semana avanzó la siembra del maíz en la zona centro y sur de la delegación Marcos Juárez, en lotes con buena humedad o a mayor profundidad en los lotes con menor contenido en la capa superficial. En la delegación Marcos Juárez se estima una disminución del 8% en la superficie final destinada al cereal, la cual puede ser mayor si la ausencia de precipitaciones dificulta la siembra en esta fecha, ya que en este año no se sembrará maíz de segunda o en fechas tardías de noviembre-diciembre por el riesgo de la presencia de chicharrita.



Se estima una caída del orden del 20% en la superficie a implantar con maíz en toda la provincia, con respecto a la campaña anterior, dependiendo todavía del clima. A la fecha se encuentra sembrado un 70% del área estimada, siendo casi nulo el interés por el maíz de segunda o tardío. Ya hay lotes emergidos, con una, dos o tres hojas. Se hicieron fertilizaciones nitrogenadas aplicando urea al voleo en presiembra, y fósforo al momento de la siembra. Se hizo control de maíces guachos y de momento la población de adultos de chicharrita es muy baja o inexistente.





La siembra en la región norte se encuentra prácticamente detenida a la espera de precipitaciones para poder continuar.

En el área de la delegación Cañada de Gómez continúa la siembra de este cultivo con la humedad en la cama de siembra muy justa.

En la delegación Casilda la siembra avanzó considerablemente en los suelos que presentan un adecuado nivel de cobertura vegetal, en tanto que, en zonas de lluvias débiles a fines de agosto y lotes con remoción, se espera una nueva recarga para poder finalizar las labores de implantación. El ascenso actual de las temperaturas diurnas favorece la etapa de germinación y emergencia, por lo cual ya comienzan a verse algunos lotes nacidos, con un buen stand inicial de plantas. El nivel tecnológico aplicado al cultivo es el habitual para la zona tanto en la elección de híbridos como en la dotación de fertilizantes.

Comenzó la siembra en la zona de la delegación Venado Tuerto también en aquellos lotes con buena cobertura y humedad justa para la implantación; los cuales son escasos ya que en la mayoría falta humedad.


Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

MAÍZ

Con la cosecha de los últimos lotes en el ámbito de las delegaciones La Plata, Tandil y Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, se da por concluida la misma en todo el país.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	15/08	22/08	29/08	05/09	12/09	19/09
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100
Bolívar	246.000	100	100	100	100	100	100
Bragado	202.496	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	156.300	98	100	100	100	100	100
Junín	200.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	58.300	97	97	98	99	99	100
Lincoln	331.000	99	99	100	100	100	100
Pehuajó	386.200	100	100	100	100	100	100
Pergamino	197.790	100	100	100	100	100	100
Pigüé	148.000	85	87	90	98	100	100
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	320.073	82	88	93	95	98	100
Tres Arroyos	394.969	90	95	96	98	99	100
25 de Mayo	178.952	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES <i>23/24</i>	3.090.580	96	97	98	99	99,7	100
<i>22/23</i>	2.928.935	95	96	98	99	100	100
Laboulaye	534.520	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	510.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	784.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	753.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	606.500	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA <i>23/24</i>	3.188.920	100	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	3.064.224	99	100	100	100	100	100
Paraná	169.200	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	399.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS <i>23/24</i>	568.200	100	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	489.280	100	100	100	100	100	100
General Pico	468.700	95	98	99	100	100	100
Santa Rosa	310.400	89	93	95	100	100	100
LA PAMPA <i>23/24</i>	779.100	93	96	98	100	100	100
<i>22/23</i>	680.400	94	95	99	100	100	100
Avellaneda	173.400	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	247.561	100	100	100	100	100	100
Casilda	201.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	361.500	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	255.919	100	100	100	100	100	100
SANTA FE <i>23/24</i>	1.239.380	100	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	1.261.512	100	100	100	100	100	100
CATAMARCA	15.850	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	122.200	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	46.100	100	100	100	100	100	100
JUJUY	13.388	100	100	100	100	100	100
MISIONES	36.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	408.990	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	497.800	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	198.500	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	88.820	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS <i>23/24</i>	11.099.728	98	99	99	99,7	99,9	100
<i>22/23</i>	10.533.195	97	98	99,5	99,8	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	15/08 %	22/08 %	29/08 %	05/09 %	12/09 %	19/09 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	84.800						
Bragado	8.200						
General Madariaga	77.500						
Junín	4.000						
La Plata	12.500						
Lincoln	38.900						
Pehuajó	94.800						
Pergamino	2.000						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	155.000						
Tandil	190.000						
Tres Arroyos	245.995						
25 de Mayo	52.411						
BUENOS AIRES 24/25	1.061.706	0	0	0	0	0	0
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	53.872						
Marcos Juárez	20.000					12	23
Río Cuarto	12.500						
San Francisco	35.000						
Villa María	7.800						
CÓRDOBA 24/25	129.172	0	0	0	0	2	4
23/24	130.430	0	0	0	0	0	0,5
Paraná	5.400				19	54	73
Rosario del Tala	12.000				15	35	40
ENTRE RÍOS 24/25	17.400	0	0	0	16	40	50
23/24	9.850	0	0	0	10	17	37
General Pico	132.500						
Santa Rosa	94.000						
LA PAMPA 24/25	226.500	0	0	0	0	0	0
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	181.800	38	50	59	59	59	59
Cañada de Gómez	15.000					9	23
Casilda	5.000						
Rafaela	78.050				56	61	61
Venado Tuerto	1.500						
SANTA FE 24/25	281.350	25	33	39	55	57	56
23/24	210.300	33	45	60	67	78	78
CATAMARCA	200						
CORRIENTES	700			50	88	89	95
CHACO (Charata)	138.000	14	42	52	65	74	79
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	99.500	9	17	31	36	36	60
FORMOSA	2.020						50
SALTA	600						
SAN LUIS	74.000						
STGO. ESTERO	3.000						
STGO. ESTERO (Quimilí)	24.230	23	30	30	30	32	32
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 24/25	2.058.628	5	9	11	14	15	17
23/24	1.857.963	4	6	8	9	12	13

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/09/2024 al 12/09/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	82	18	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	80	20	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	9	66	20	5	A/R/PS
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	85	15	-	R
	RÍO CUARTO	-	89	11	-	-	-	66	34	-	A/R/PS
	SAN FRANCISCO	-	61	39	-	-	7	71	22	-	A/R/PS
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	-	75	25	-	R/PS
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	66	28	6	-	-	100	-	-	R/PS
	ROSARIO DEL TALA	-	85	15	-	-	-	70	30	-	A/R/PS
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	-	92	8	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	4	71	25	-	-	18	41	41	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	46	33	21	-	A/R/PS
	CASILDA	-	100	-	-	-	23	67	10	-	A
	RAFAELA	-	95	5	-	-	-	87	12	1	A/R/PS/S
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	40	60	-	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	34	66	-	-	12	60	28	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	63	37	-	-	8	50	42	A/R/PS
JUJUY	JUJUY	-	32	50	18	-	-	100	-	-	A/PS
SALTA	SALTA	-	10	58	32	-	-	100	-	-	A/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	1	78	21	-	-	80	20	-	A/R/PS
	QUIMILÍ	-	20	80	-	-	-	41	46	13	R/PS/S
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	37	62	-	-	-	100	-	-	PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

