

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

26 de septiembre de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 26 de septiembre de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 26/09/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Arroz, Girasol, Maíz)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se registraron lluvias importantes en Concordia (71mm) y Colón (30mm) en Entre Ríos; Monte Caseros (65mm), Paso de los Libres (35mm) e Ituzaingó (28mm) en Corrientes; Posadas (59mm) e Iguazú (27mm) en Misiones. Además, en Patagonia se destacan los acumulados de Bariloche (54mm), El Bolsón (49mm) y Esquel (26mm). Por último, también se registraron precipitaciones en Benito Juárez (52mm), Coronel Suárez (41mm), Bahía Blanca (29mm), Pigüé (28mm) en el sur de Buenos Aires.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 18/09/2024 al 24/09/2024

El avance de un sistema frontal en el país va a ocasionar lluvias de diversa intensidad durante el jueves en el norte de San Luis, este de La Rioja, Córdoba, NOA, NEA, norte de Entre Ríos y Santa Fe. Entre viernes y hasta el próximo lunes se espera posibilidad de precipitaciones y nieve en zonas cordilleranas de Patagonia y también Mendoza. El avance de un nuevo sistema frontal entre domingo y lunes ocasionará acumulados de lluvia en Chubut, Río Negro, este de La Pampa, centro y sur de Buenos Aires entre domingo y martes de la próxima semana.



TEMPERATURAS

El mapa de anomalía de temperaturas muestra valores medios normales y por debajo de lo normal en el sur, mientras que en norte y centro de Argentina las temperaturas medias fueron significativamente superiores a lo normal. En esta región se destacan las máximas sobre 40°C en Rivadavia (Salta), Las Lomitas (Formosa), P. Roque Sáenz Peña (Chaco), Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Además, se destacan las temperaturas máximas sobre 35°C en San Juan, Villa María del Río Seco en Córdoba que registró 38°C y Villa Reynolds (35°C) en San Luis.




Anomalía de la temperatura media de la semana del 18/09/2024 al 24/09/2024

En la semana se esperan temperaturas medias por sobre lo normal en el centro y norte del país, mientras que, en el sur, se esperan temperaturas medias por debajo de lo normal. Entre jueves y viernes debido a un sistema frontal, se espera que las temperaturas se mantengan bajas en el sur y centro-sur del país. A partir del sábado y hasta el próximo martes se espera que las temperaturas vayan en aumento en la zona central, NOA y NEA, en estas dos últimas se podrían dar condiciones para temperaturas máximas que superen los 35°C entre sábado y martes de la próxima semana e incluso superen los 40°C en localidades de Salta, Tucumán y Catamarca durante el martes de la próxima semana.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Debido a las escasas precipitaciones la situación del centro del país es preocupante. El déficit hídrico alcanza la totalidad de la provincia de Santa Fe, y se amplía en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa mantienen condiciones críticas por varias semanas consecutivas con precipitaciones mínimas o nulas. Entre Ríos presenta valores de reservas escasas y de sequía, a excepción de su región noreste, que se encuentra en mejor condición, así como el resto del litoral. La provincia de Buenos Aires ha mejorado sus reservas a causa de las precipitaciones recibidas. La región triguera del sur se encuentra en muy buenas condiciones de humedad.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la región del NOA se registraron altas temperaturas, inusuales para la época, provocando una importante sequedad ambiental. Sin embargo, la gran capacidad exploratoria radicular del cultivo, determina que continúe presentando un buen estado general. La mayoría de los lotes se encuentra en la etapa de floración, mientras que los más adelantados ya están en la etapa de llenado.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires, el cultivo implantado presenta un muy buen estado general, con un excelente desarrollo, encontrándose en la etapa de floración.

En Córdoba, las bajas temperaturas han provocado retrasos en el crecimiento, determinando que el cultivo se encuentre en la etapa de elongación de tallo.

En la provincia de Entre Ríos, los lotes implantados presentan, en su mayoría, buen estado general y se encuentran atravesando etapas entre floración y formación de silicuas.

CEBADA



En general, el estado del cultivo es bueno, ya que las últimas precipitaciones que se han registrado en prácticamente toda la provincia, han resultado beneficiosas. El volumen de estas lluvias fue muy variado, y los mayores valores se registraron hacia el sur y suroeste provincial. Por el contrario, en el noroeste y centro-oeste, las precipitaciones fueron menores desde la implantación y es en donde el cultivo presenta menor desarrollo con un estado general entre bueno y regular.





CÓRDOBA

No se registraron precipitaciones durante la semana informada. Las temperaturas comienzan a subir, y en consecuencia la humedad en el perfil disminuye. Las reservas se mantienen en niveles regulares, y se estima que, de no mediar precipitaciones en el corto plazo, comenzarían a perderse lotes. El estado general del cultivo es bueno a regular, aunque debido a la escasez hídrica y las bajas temperaturas se presentan poco desarrollados, atravesando etapas que van entre encañazón y principio de floración para los más adelantados.



ENTRE RÍOS

El cultivo presenta buen estado general y fenológicamente se encuentra en la etapa de espigazón.



LA PAMPA

El aumento de las temperaturas y la escasa humedad en el perfil, impactan en estado cultivo que, en general, es regular. Se estima que podría haber una merma significativa en los rendimientos de no ocurrir precipitaciones sustanciales en el corto plazo.



SANTA FE

La ausencia de precipitaciones comienza a evidenciarse en el estado del cultivo que se encuentra entre bueno y regular. Se observa la presencia de mancha de red, que no prospera debido a la baja humedad ambiental. Los lotes más adelantados ya se encuentran en plena espigazón.





Si bien se registraron algunas precipitaciones, las mismas fueron escasas e insuficientes para revertir la condición de escasez hídrica. Los lotes implantados presentan un estado general regular, y se encuentran en etapas entre floración y llenado. Es imperante la ocurrencia de lluvias en el corto plazo.

GARBANZO

En el centro-norte de la provincia de Córdoba, el cultivo se encuentra en plena floración. En general, presenta un buen estado general y sanitario, aunque en lotes puntuales se observan amarillamientos por efecto de la escasez hídrica y las heladas ocurridas en agosto.

En la región del NOA, el cultivo atraviesa etapas que van desde floración hasta comienzos de llenado. Los lotes realizados en secano presentan un estado regular ya que la escasez hídrica condiciona la potencialidad del cultivo y acelera el ciclo. Por otro lado, aquellos realizados bajo riego, presentan muy buen estado general.

En la provincia de Santiago del Estero, si bien se han registrado algunas precipitaciones leves, las mismas resultaron escasas y no llegaron a impactar en el estado del cultivo, que continúa deteriorándose.

LINO

Los lotes implantados en la zona de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, presentan un estado bueno a regular, estos últimos debido a la escasez hídrica que ha provocado una baja densidad de plantas. Los más avanzados ya poseen el botón floral en el tallo principal, mientras que los restantes se encuentran en ramificación.



TRIGO



En el noreste provincial los trigos presentan un muy buen aspecto comenzando a emitir la hoja bandera. Los registros de lluvia de esta semana, si bien fueron bajos, permiten mantener el desarrollo óptimo del cultivo.

Hacia la región del noroeste, el contenido de humedad de los suelos va decreciendo por lo que se estima una disminución en los máximos rindes potenciales, aunque, por el momento, no se observa una merma en los rindes promedio por déficit hídrico. De todas maneras, en algunas zonas, la prolongada ausencia de lluvias afectó al cultivo en sus primeras etapas presentando una altura que apenas llega a los 20 cm. Todos los lotes se encuentran encañados con grandes diferencias de desarrollo de acuerdo a la humedad disponible en cada área.

En la región centro-este, sudeste y sudoeste provincial, se registraron precipitaciones que permiten mantener las condiciones adecuadas de agua útil en los perfiles edáficos, favoreciendo el desarrollo del cultivo. Algunos lotes se han refertilizado y la mayoría continúa en macollaje, con los más adelantados en inicios de elongación del tallo.



Continúa la falta de lluvias en toda la provincia lo que complica el estado del cultivo, el cual presenta escaso desarrollo por la insuficiente humedad y las heladas del mes de agosto, estimándose una disminución en los rindes potenciales.

La etapa fenológica en la zona sur es encañazón, en su mayor superficie, mientras que en el norte están iniciando la espigazón.



Las condiciones climáticas de la semana, caracterizadas por la ausencia de lluvias y temperaturas altas, han incrementado el estrés hídrico en el cultivo, el cual se encuentra en su fase de desarrollo reproductivo, disminuyendo las expectativas de rendimiento.





ENTRE RÍOS

La mayoría de los lotes atraviesan etapas entre encañazón, espigazón y floración, con algunos lotes más adelantados, en la zona norte, iniciando el llenado de granos. El cultivo se mantiene en buen estado, en su mayoría, aunque en zonas más limitadas por la escasez de agua, los lotes se observan con menor crecimiento y demorados en su desarrollo, lo cual afectaría el rendimiento. No se reportan complicaciones por presencia de plagas ni enfermedades.



LA PAMPA

El aumento de las temperaturas sumado a la ausencia de humedad en el suelo y de lluvias significativas, están afectando el desarrollo del cultivo, el cual se encuentra en las etapas fenológica de fin de macollaje y encañazón. La condición y aspecto general de los lotes es regular. Si las condiciones agroclimáticas, fundamentalmente precipitaciones, no se revierten en las próximas semanas las expectativas de rendimientos para la actual campaña disminuirán significativamente.



SANTA FE

En la zona norte, delegación Avellaneda, el cultivo se encuentra en la etapa de floración, con algunos lotes, más adelantados, llenando granos. El estado es malo debido a las condiciones de escasez de humedad, siendo más grave la situación en la región oeste.

En la zona central, al finalizar la semana, ocurrieron precipitaciones de escasos milimetrajes que trajeron cierto alivio al cultivo. Los trigos transitan los estados fenológicos de encañazón a floración, período crítico en la definición de rendimiento. No se evidencian daños ni afectaciones graves por problemas sanitarios.

En la delegación Casilda los lotes más adelantados están en el estadio de espiga embuchada, en tanto que el resto de la superficie avanza en la etapa de encañazón. Los planteos que tuvieron una buena incorporación del fertilizante nitrogenado post lluvias de fines de agosto se observan con una mejor proyección productiva. Dado el incremento de la demanda hídrica que manifiesta el cultivo ya comienza a ser necesario un nuevo aporte de precipitaciones. Se observaron algunas pústulas de roya en variedades susceptibles y síntomas leves de mancha amarilla en otras variedades.



En el ámbito de la delegación Venado Tuerto el cultivo sigue desmejorando su aspecto por la falta de lluvias. Se esperan bajos rendimientos.



En la semana se registraron leves lluvias o lloviznas en el noreste provincial, que no cambiaron la situación de sequía imperante, la cual está generando un gran estrés en el cultivo. La mayoría de los lotes se encuentra con floración avanzada, con algunos, más adelantados, iniciando la etapa de llenado de granos, por lo que, la falta de lluvias sigue empeorando su condición.



La semana se presentó con temperaturas elevadas y viento seco acentuando la condición de déficit hídrico, deteriorando el estado de los lotes a seco y disminuyendo el rendimiento potencial del cultivo, el cual se encuentra en las etapas críticas de floración a llenado de granos.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ARROZ

En la provincia de Entre Ríos se han sembrado algunos pocos lotes de la variedad largo fino. Se estima que la superficie para esta campaña podría superar levemente a la de la pasada.

Continúa avanzando la siembra de la variedad largo fino, en el departamento San Javier, perteneciente a la delegación Avellaneda.



GIRASOL



En la zona de Marcos Juárez, la siembra prácticamente se encuentra detenida por la falta de humedad edáfica. Los primeros lotes sembrados presentan dificultades en la emergencia.



La ausencia de precipitaciones adecuadas y generalizadas en la provincia determina que las labores de siembra se desarrollen lentamente a la espera de nuevos aportes hídricos. Actualmente, la superficie implantada representa el 74% del total estimado. Solamente en la zona sur, que corresponde a la delegación Charata, se reportaron actividades. Los primeros lotes implantados presentan buen estado general, y se encuentran en crecimiento en la etapa de diferenciación foliar.



En la zona de Paraná, ya ha finalizado la siembra, mientras que continúan desarrollándose las labores en el área de Rosario del Tala. Se estima que para esta campaña la superficie podría incrementarse por efecto de la presencia del vector causante del achaparramiento que determina una disminución en la superficie del maíz.



La escasa humedad por la ausencia de precipitaciones ha detenido el avance de las labores de siembra en toda la provincia. En la zona centro-norte, que comprende a las delegaciones Avellaneda y Rafaela, la superficie sembrada, aproximadamente, representa el 65% de lo estimado.



Se estima que, de ocurrir precipitaciones en el corto plazo, podría sembrarse hasta finales de octubre inclusive. Los primeros lotes sembrados han logrado un buen stand de plantas, sin presencia de plagas o enfermedades, aunque con un bajo ritmo de emergencia.



En la delegación Quimilí, las escasas lluvias ocurridas no reportan cambios en el estado hídrico de los suelos, que se mantiene escaso. Actualmente, la siembra se encuentra detenida, a la espera de precipitaciones relevantes en el corto plazo, para cumplir con la superficie estimada.

MAÍZ



Prosigue la siembra de los maíces tempranos en la zona de la delegación Bragado, beneficiada por las lluvias del día jueves 19/9 que permitieron mejorar la humedad los primeros centímetros del perfil edáfico.

Durante la semana se inició la implantación de los primeros lotes de maíz en el área de las delegaciones Pergamino, Junín, Lincoln, Pehuajó y La Plata.



En el ámbito de la delegación Marcos Juárez la siembra se encuentra detenida a la espera de lluvias que permitan mejorar el contenido de humedad edáfica en los primeros centímetros. Lo implantado en la semana del 8 al 13 de este mes está emergiendo con dificultad por causa de la temperatura y a que, en algunos lotes, la profundidad de siembra fue mayor a lo normal.





Durante el día lunes 23 se registraron lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia, permitiendo continuar con las siembras en las zonas más beneficiadas de la región norte. El escenario proyectado de Niña para los meses de diciembre y enero, más la falta de humedad en estos momentos para la siembra, acentuarían la caída del área.

En la región sur, ante la ausencia de precipitaciones, el avance de siembra se mantiene en un 85%, cifra avanzada para la fecha, ya que los productores sembraron de manera temprana por disponibilidad de agua y para evitar la mayor incidencia de la chicharrita.



La siembra del maíz de primera época en la región norte se encuentra prácticamente detenida a la espera de precipitaciones para poder continuar. Los primeros lotes implantados no emergieron todavía, en algunos casos, debido a la escasez de humedad. Con respecto al maíz tardío, hay una expectativa de siembra de sólo el 30-40% con respecto a la superficie del año pasado, debido a los daños ocasionados por la chicharrita.


En el área de la delegación Cañada de Gómez continúa la siembra de este cultivo en lugares puntuales, con la humedad en la cama de siembra muy justa.

En la delegación Casilda, los primeros lotes emergidos presentan dos hojas desplegadas. Se observa un buen stand de plantas. La siembra ha manifestado un gran avance pero actualmente se halla detenida a la espera de una recomposición de humedad en los primeros centímetros del perfil de suelo. Las coberturas con maíces tardíos y de segunda comienzan a ser consideradas nuevamente aunque con suma moderación. Todo dependerá de la evolución de la población de chicharrita, que al momento no presenta niveles importantes en la zona.

En el ámbito de la delegación Venado Tuerto la siembra prosiguió en los pocos lotes que tienen humedad.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	22/08 %	29/08 %	05/09 %	12/09 %	19/09 %	26/09 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	84.800						
Bragado	8.200						
General Madariaga	77.500						
Junín	4.000						
La Plata	12.500						
Lincoln	38.900						
Pehuajó	94.800						
Pergamino	2.000						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	155.000						
Tandil	190.000						
Tres Arroyos	245.995						
25 de Mayo	52.411						
BUENOS AIRES 24/25	1.061.706	0	0	0	0	0	0
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	53.872				12	23	24
Marcos Juárez	20.000						
Río Cuarto	12.500						
San Francisco	35.000						
Villa María	7.800						
CÓRDOBA 24/25	129.172	0	0	0	2	4	4
23/24	130.430	0	0	0	0	0	0,5
Paraná	5.400			19	54	73	100
Rosario del Tala	12.000			15	35	40	48
ENTRE RÍOS 24/25	17.400	0	0	16	40	50	64
23/24	9.850	0	0	10	17	37	54
General Pico	132.500						
Santa Rosa	94.000						
LA PAMPA 24/25	226.500	0	0	0	0	0	0
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	181.800	50	59	59	59	59	59
Cañada de Gómez	15.000				9	23	67
Casilda	5.000						
Rafaela	78.050			56	61	61	68
Venado Tuerto	1.500						
SANTA FE 24/25	281.350	33	39	55	57	56	61
23/24	210.300	45	60	67	78	78	83
CATAMARCA	200						
CORRIENTES	700		50	88	89	95	100
CHACO (Charata)	138.000	42	52	65	74	79	83
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	99.500	17	31	36	36	60	60
FORMOSA	2.020					50	60
SALTA	600						
SAN LUIS	74.000						
STGO. ESTERO	3.000						
STGO. ESTERO (Quimilí)	24.230	30	30	30	32	32	32
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 24/25	2.058.628	9	11	14	15	17	18
23/24	1.857.963	6	8	9	12	13	14

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	22/08 %	29/08 %	05/09 %	12/09 %	19/09 %	26/09 %
Bahía Blanca	20.500						
Bolívar	246.000						
Bragado	205.000					1	10
General Madariaga	156.300						
Junín	208.000						15
La Plata	57.000						1
Lincoln	330.000						3
Pehuajó	366.500						5
Pergamino	200.000						1
Pigüé	148.000						
Salliqueló	250.000						
Tandil	345.000						
Tres Arroyos	394.969						
25 de Mayo	172.952						
BUENOS AIRES 24/25	3.100.221	0	0	0	0	0,1	3
23/24	3.090.580	0	0	0	0	1	3
Laboulaye	534.520						
Marcos Juárez	434.000				8	20	20
Río Cuarto	664.520						
San Francisco	572.000						
Villa María	442.000						
CÓRDOBA 24/25	2.647.040	0	0	0	1	3	3
23/24	3.188.920	0	0	0	1	5	10
Paraná	134.600			5	16	34	58
Rosario del Tala	300.000			20	55	85	85
ENTRE RÍOS 24/25	434.600	0	0	15	43	69	77
23/24	568.200	0	3	6	16	35	53
General Pico	468.700						
Santa Rosa	310.400						
LA PAMPA 24/25	779.100	0	0	0	0	0	0
23/24	779.100	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	55.200	3	4	4	6	6	6
Cañada de Gómez	155.000			2	11	23	46
Casilda	120.000				28	68	80
Rafaela	293.300			14	24	24	25
Venado Tuerto	210.000					1	3
SANTA FE 24/25	833.500	0	0	6	15	23	30
23/24	1.239.380	1	1	4	13	21	27
CATAMARCA	7.800						
CORRIENTES	10.000	55	81	81	81	81	81
CHACO (Charata)	84.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	106.000						
FORMOSA	46.100						
JUJUY	13.388						
MISSIONES	31.510				5	10	15
SALTA	368.091						
SAN LUIS	348.500						
STGO. ESTERO	168.725						
STGO. ESTERO (Quimilí)	502.200						
TUCUMÁN	72.830						
TOTAL PAÍS 24/25	9.553.605	0	0	1	4	6	8
23/24	11.099.728	0	0	1	3	6	9

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 20/09/2024 al 26/09/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	54	46	-	R/PS/S
	PERGAMINO	-	79	21	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	80	20	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	9	66	20	5	R/PS/S
	MARCOS JUÁREZ	-	83	17	-	-	-	85	15	-	R
	RÍO CUARTO	-	88	12	-	-	-	56	29	15	A/R/PS
	SAN FRANCISCO	-	22	58	20	-	7	71	22	-	A/R/PS
	VILLA MARÍA	-	80	20	-	-	-	75	25	-	R/PS/S
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	37	40	23	-	-	100	-	-	A/R/PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	80	20	-	-	-	60	40	-	A/R/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	30	70	-	PS/S
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	-	92	8	R/PS/S
SANTA FE	AVELLANEDA	-	2	33	65	-	-	16	24	60	A/R/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	77	23	-	-	46	33	21	-	A/R/PS
	CASILDA	-	100	-	-	-	23	67	10	-	A
	RAFAELA	-	95	5	-	-	-	68	26	6	A/R/PS/S
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	50	50	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	10	90	-	-	9	55	36	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	43	57	-	-	1	50	49	A/R/PS
JUJUY	JUJUY	-	-	60	40	-	-	100	-	-	R
SALTA	SALTA	-	-	32	68	-	-	100	-	-	A/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	70	30	-	-	80	20	-	A/R/PS/S
	QUIMILÍ	-	13	70	17	-	-	35	42	23	R/PS/S
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

