

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

3 de octubre de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 3 de octubre de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 3/10/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Arroz, Girasol, Maíz)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días llegaron a acumularse 50mm o más solo en el noreste del país: 79mm en Posadas, 53mm en Paso de los Libres y 50mm en Ituzaingó. En el mapa se observa un máximo secundario que corresponde a los 44mm de Bariloche y 42mm de El Bolsón. En la franja central del país las precipitaciones resultaron nuevamente escasas o nulas en general. Se destacan los acumulados de 34mm en Concordia y 21mm en Tres Arroyos.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 25/09/2024 al 01/10/2024

Durante el jueves se esperan lluvias de diversa intensidad en Misiones. Entre domingo y martes de la próxima semana, con el avance desde el oeste de un sistema de baja presión segregada, se espera la ocurrencia de precipitaciones con distinta magnitud en NOA y NEA y también en Mendoza y su zona cordillerana que podría tener posibilidad de nevadas, y también podrían haber acumulados de precipitación en San Luis, centro y sur de Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires.



TEMPERATURAS

Los últimos días se caracterizaron por temperaturas muy elevadas en el norte del país, con máximas que superaron los 40°C en la mayor parte del NOA y del NEA, además de Córdoba. La máxima más alta registrada fue de 44.5°C en Rivadavia (Salta). El mapa de anomalía de la temperatura media de los últimos 7 días muestra entre 2°C y 4°C por encima de lo normal en la mitad norte del país. Por otro lado, en el sur de Patagonia se verificó la situación opuesta.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 25/09/2024 al 01/10/2024


En la semana se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en casi todo el país. El pasaje de un sistema frontal entre miércoles y jueves ocasionará que durante el jueves puedan darse condiciones para heladas agronómicas en el sur de Córdoba, La Pampa y centro y sur de Buenos Aires. A partir del viernes y hasta el martes próximo, se espera que las temperaturas vayan aumentando de forma paulatina en todo el país, aunque de forma más importante en el centro-oeste, NEA y NOA. Para el NOA se espera que algunas localidades registren temperaturas máximas sobre 35°C entre el sábado y lunes de la próxima semana.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Sin precipitaciones en el centro del país, la situación de sequía para trigo se ve agravándose semana a semana. Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, el noreste de La Pampa y el noroeste de Buenos Aires mantienen la clasificación de sequía. En Entre Ríos, la zona productiva principal, sobre el sudoeste de la provincia, también se estima actualmente en estado de reservas deficitarias, lo mismo que el noroeste de Buenos Aires. En el centro-norte de Buenos Aires, las reservas hídricas han pasado a escasas en forma generalizada. El núcleo triguero del sur y sudeste bonaerense sigue manteniendo áreas con almacenaje adecuado, alternando con zonas con reservas regulares y su situación es mejor que la del resto del área triguera.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la región del NOA, permanece la situación de déficit hídrico por ausencia de precipitaciones. El cultivo implantado continúa en su evolución transcurriendo la etapa de llenado, y a pesar de la situación de escasez hídrica, por ahora, mantiene buen estado general.

COLZA

En Córdoba, las bajas temperaturas han provocado retrasos en el crecimiento, determinando que el cultivo se encuentre demorado en sus etapas evolutivas. En general, se encuentra en buen estado.

En la provincia de Entre Ríos, los lotes implantados presentan en su mayoría buen estado general y se encuentran finalizando la floración, con gran parte de los lotes en la etapa de fructificación (formación de silicuas) y llenado de grano.

CEBADA



Durante la semana informada se han registrado algunas precipitaciones muy puntuales que, en general, no modificaron el estado hídrico de los suelos. La mayor demanda ambiental y del cultivo hacen necesarias nuevas lluvias con volúmenes relevantes. En general, el estado del cultivo es bueno, y gran parte de la superficie sembrada ya se encuentra ingresando en las etapas reproductivas. Sin embargo, el desarrollo y el aspecto general, responden al contenido de humedad. La zona oeste y centro oeste, la zona más afectada por la escasez hídrica, es donde se informan planteos con menor desarrollo.





La ausencia de precipitaciones de forma prolongada, impactan en el estado del cultivo. El mismo presenta un aspecto regular a bueno y se encuentra en etapas fenológicas reproductivas algo retrasado en el desarrollo debido a la escasez hídrica durante todo el ciclo y las bajas temperaturas durante la época invernal.



Durante la semana informada se registraron algunas precipitaciones, con máximos de 50 mm. Sin embargo, la situación de escasez hídrica se mantiene, y continúa siendo necesaria la ocurrencia de nuevas lluvias. Los lotes implantados se encuentran evolucionando normalmente, atravesando etapas entre espigazón e inicios de llenado de grano.



Solamente se han registrado precipitaciones de pocos milímetros en la zona sur de la provincia, los que no modificaron la situación de escasez hídrica generalizada. Se estima que ya se encuentra afectado el rendimiento potencial. Los lotes presentan un estado general regular y poco desarrollo.



Sin registros pluviométricos, continua el deterioro de los lotes implantados. Los más avanzados se encuentran en plena espigazón y los más retrasados emergiendo la espiga. Comienza a verse incidencia de mancha en red pero que no prospera debido a la baja humedad ambiental.





Ocurrieron algunas precipitaciones en la zona oeste provincial, las cuales mitigaron levemente el efecto de la sequía imperante en la región. En general, el cultivo implantado presenta un estado regular, afectado por la escasez hídrica. La etapa fenológica predominante es la de espigazón.

GARBANZO

En el centro-norte de la provincia de Córdoba, el cultivo se encuentra en pleno llenado. Su estado, en general, es bueno aunque ya se observan lotes con amarillamiento por efecto de la escasez hídrica.

En la región del NOA, el cultivo atraviesa etapas que van desde floración hasta comienzos de llenado. Los lotes realizados en secano manifiestan síntomas de estrés hídrico, sobre todo aquellos de siembra tardía, que evidencian un impacto en la floración por aborto de estructuras reproductivas. Los realizados bajo riego presentan muy buen estado general.

En la provincia de Santiago del Estero, el cultivo empeora progresivamente debido a la escasez hídrica.

LINO

En la zona de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, los lotes más avanzados se encuentran desarrollando el botón floral en el tallo principal, con algunos ya en floración. Los restantes se encuentran en ramificación. La escasez hídrica ha provocado retrasos en el desarrollo del cultivo. Su estado es bueno a regular, producto de la falta de agua sufrida, el stand de plantas es regular y se ven lotes enmalezados. Se espera poder alcanzar unos de 8 qq/ha de promedio.



TRIGO



En el centro-noreste-este provincial los trigos aún presentan un buen aspecto y los más adelantados se encuentran emitiendo la hoja bandera. Por el momento, disponen de buena humedad y provisión de nutrientes, pero sería beneficiosa la ocurrencia de lluvias ya que los requerimientos a partir de ahora son mayores y la evapotranspiración también aumenta por el incremento de las temperaturas.

En la región del noroeste, la ausencia de lluvias agrava el déficit de humedad. El cultivo se encuentra encañado con pocos macollos y hojas basales amarillas y secas. Son pocos los lotes en buenas condiciones y se presentan en áreas de mayor retención hídrica y que han recibido las escasas precipitaciones ocurridas desde la implantación del cultivo.

En el sudeste se han reportado nuevas precipitaciones oscilando entre los 4 y 35 mm, las cuales permiten reponer parcialmente el contenido de agua superficial en los perfiles. Los lotes de trigo evolucionan favorablemente y se encuentran entre macollaje y encañazón. Se ha reportado alguna incidencia de royas y manchas foliares por lo que, de acuerdo al resultado de los monitoreos, se harán controles con funguicidas.

En el sudoeste también se registraron lluvias pero de menor milimetraje. De todas maneras, ayudan a mejorar la condición de humedad del suelo y han permitido la incorporación de los fertilizantes aplicados en las últimas labores. Los trigos se encuentran en encañazón en su gran mayoría, y en fin de macollaje los sembrados más tarde. No obstante, se necesitan lluvias en las próximas semanas para continuar recargando el perfil, ya que los cultivos están comenzando a transitar etapas de alta demanda hídrica.



La persistente ausencia de lluvias en toda la provincia sigue complicando el estado del cultivo el cual presenta distintos grados de síntomas de estrés hídrico, como menor altura, amarillamiento de hojas, estimándose una disminución en los rindes potenciales y pérdida de superficie. El cultivo se encuentra mayormente en encañazón y entrando en espigazón, los más adelantados.





En la zona de la delegación Charata se registraron lluvias del orden de los 20mm, aunque resultan tardías ya que los rendimientos del cereal están prácticamente definidos. Se espera que los primeros lotes entren en cosecha con un promedio estimado por debajo de los 10 qq/ha. Sin embargo, en cuadros puntuales que recibieron aportes de lluvias en agosto, se podrían obtener rendimientos por encima de esos valores.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz el cultivo se encuentra en etapas de formación a llenado de granos con un estado general regular a malo. Continúa el déficit hídrico en gran parte del área a lo que se suman temperaturas muy elevadas. Se estiman importantes pérdidas de lotes a lo que se suman las pérdidas de rendimiento.



En el norte provincial la mayoría de los lotes se encuentran entre las etapas de espigazón y llenado, en tanto que en el sur un 50% de los lotes aún están en etapa de crecimiento, un 40% en floración y un 10% en llenado de grano. El estado del cultivo se mantiene bueno, en su mayoría, aunque ya son muchas las zonas donde, por la escasez de agua, los lotes se observan con menor crecimiento y demorados en su desarrollo. No se reportan complicaciones por presencia de plagas ni enfermedades.



En la región norte no ocurrieron precipitaciones aumentando el porcentaje de lotes en estado regular a malo, siendo el valor en estado bueno del 30%. Fenológicamente, la mayor parte de la superficie transcurre la etapa final de encañazón, en la cual se definen importantes componentes del rendimiento, por lo que ya se estima una reducción en los rendimientos. Se observan manchones amarillos en lotes producto del estrés hídrico.

En el sur provincial se registraron precipitaciones de escasos milímetros en los departamentos de Guatraché, Hucal y Utracán con un promedio de 2 mm, por lo que la reserva hídrica del suelo continúa en condición de escasa/sequía, siendo más complicada la situación en los departamentos del norte. Tanto los trigos de ciclo largo e intermedio como los de ciclo corto se encuentran en etapa de crecimiento, muy atrasados en su desarrollo, en estado regular.





Durante la semana no se registraron precipitaciones en la provincia. Los días fueron muy calurosos y con fuertes ráfagas de viento, afectando el avance de las pulverizaciones. Sigue haciendo falta lluvias para mejorar la humedad de los perfiles y, por consiguiente, el estado del cultivo el cual presenta una condición regular a mala. Los cultivos de trigo bajo riego se encuentran en buen estado.



En la zona norte, delegación Avellaneda, el cultivo está en pleno llenado de granos, algo arrebatados por las temperaturas registradas. El estado de los lotes es bueno a regular en la región este, en donde se registraron algunas lluvias entre 7 y 40mm, y regular a malo en el oeste, debido a las condiciones de escasez de humedad.

En el centro provincial la baja humedad relativa, altas temperaturas y sin precipitaciones, a excepción del departamento San Justo que tuvo lluvias de hasta 12mm, a lo que se sumaron vientos intensos, provocaron que el cultivo transite los estados fenológicos de espiga embuchada, floración y formación de granos, en condiciones de estrés hídrico, determinando un aumento en el porcentaje de cuadros en estado regular y malo, junto con una merma de rendimiento. No se evidencian daños ni afectaciones por problemas sanitarios.

En los departamentos del sur, los lotes más avanzados han comenzado a espigar, mientras que el resto del área implantada se halla en las etapas de espiga embuchada y emisión de hoja bandera. Se observan síntomas de estrés hídrico y se estima una merma en el potencial de rendimiento, con afectación de la supervivencia de macollos y un área foliar inferior a la deseada para estas etapas reproductivas.



En la semana se registraron algunas lluvias que oscilaron entre los 2 y 20mm, que disminuyeron un poco el estrés hídrico reinante, favoreciendo a los trigos que están en llenado. De todas maneras, aún se necesitan mayores registros para revertir la situación del cultivo, el cual se encuentra, en su mayoría, en estado regular a malo.





Continúan registrándose altas temperaturas y déficit hídrico por la falta de precipitaciones de importancia. Dadas estas condiciones, se observa el acortamiento acelerado de las etapas de llenado de grano y maduración, como consecuencia de esto, muchos lotes no serán cosechados por los bajos rindes. Los trigos de ciclo corto realizados con riego también iniciaron su fase de maduración.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ARROZ

En la provincia de Entre Ríos, las precipitaciones ocurridas en los departamentos de San Salvador, Colón y algunas zonas de Villaguay, favorecieron el avance de las labores de siembra de lotes de variedades largo fino.

En la zona norte de la provincia de Santa Fe, la siembra está prácticamente detenida debido a la escasez de humedad en el perfil edáfico. Se está regando para que emerja lo que se sembró y agregar humedad al suelo para poder continuar con la siembra.

Hacia la región centro, en áreas de la delegación Rafaela, se ha iniciado la siembra de la variedad largo fino. Actualmente la altura de los ríos es crítica lo que podría provocar inconvenientes en el riego de no recuperar los niveles normales.

GIRASOL



Se ha iniciado la siembra en la provincia, comenzándose a implantar los primeros lotes en la zona de la delegación Veinticinco de Mayo. Las condiciones de humedad son suficientes y las temperaturas medias ofrecen un contexto propicio para el inicio del cultivo.





En la zona de Marcos Juárez, la siembra está detenida por la escasez hídrica. La superficie ya sembrada está emergiendo con dificultades.



Si bien se registraron algunas precipitaciones, continúa presente la escasez hídrica en los suelos. Se estima una menor superficie definitiva a la estimada inicialmente, debido a la imposibilidad de realizar las labores. Los primeros lotes sembrados presentan un estado regular, en la etapa de diferenciación foliar.



Se estima que la siembra podría concluir en los próximos días, con la finalización de trabajos en la zona de Rosario del Tala.



En la zona norte, correspondiente a la delegación Avellaneda, la falta de humedad ha provocado la emergencia despereja de los primeros lotes sembrados. La siembra se encuentra condicionada a la ocurrencia de precipitaciones, siendo la ventana de siembra hasta mediados de octubre.

En Rafaela, solamente se ha completado la siembra en el departamento San Justo, en las zonas restantes la siembra se encuentra detenida por falta de humedad. Se reportan buenos stands de plantas obtenidos pero con baja tasa de emergencia. No se informan inconvenientes sanitarios ni presencia de plagas.

En la zona centro sur, que abarca a la delegación Cañada de Gómez, la siembra tampoco avanza a causa de la falta de humedad. Los lotes emergidos presentan buen estado general.





En la delegación Quimilí, la escasez de humedad en la cama de siembra determina un impedimento para el avance de la siembra. La ventana de siembra comienza a cerrarse y solamente podría incrementarse la superficie si en los próximos días ocurren precipitaciones de relativa importancia.

MAÍZ



Continúa la siembra de los maíces tempranos en la región norte de la provincia, en tanto que comenzó en el ámbito de las delegaciones General Madariaga y Veinticinco de Mayo. Se espera la ocurrencia de lluvias para asegurar su implantación y proseguir con las labores, principalmente en el noroeste provincial.



Prosiguió la siembra en el área de la delegación Marcos Juárez, a pesar de la ausencia de lluvias y comenzó en la delegación Río Cuarto, en lotes bajo riego. La siembra en la provincia se encuentra atrasada por la falta de humedad en perfil.

La emergencia de los lotes implantados en la zona de Marcos Juárez es despareja, observándose diferencias de tamaño entre plantas. El cultivo, en general, se encuentra con 2 hojas. Se esperan lluvias para continuar con la implantación.






En la delegación Paraná no se ha podido completar la superficie estimada inicialmente para el maíz temprano. La falta de humedad en la cama de siembra ha sido una de las limitantes para la concreción del área. Esta condición también ha provocado nacimientos irregulares y menor cantidad de plantas logradas.



Prácticamente detenida la siembra de los maíces de primera época, a la espera de precipitaciones para poder continuar. Los lotes emergidos se encuentran en buen estado excepto en zonas compactadas o con áreas de humedad superficial irregular, especialmente en los últimos lotes implantados.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	29/08 %	05/09 %	12/09 %	19/09 %	26/09 %	03/10 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	84.800						
Bragado	8.200						
General Madariaga	77.500						
Junín	4.000						
La Plata	12.500						
Lincoln	38.900						
Pehuajó	94.800						
Pergamino	2.000						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	155.000						
Tandil	190.000						
Tres Arroyos	245.995						
25 de Mayo	52.411						5
BUENOS AIRES 24/25	1.061.706	0	0	0	0	0	0,3
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	1
Laboulaye	53.872						
Marcos Juárez	20.000			12	23	24	41
Río Cuarto	12.500						
San Francisco	35.000						
Villa María	7.800						
CÓRDOBA 24/25	129.172	0	0	2	4	4	6
23/24	130.430	0	0	0	0	0	4
Paraná	5.400		19	54	73	100	100
Rosario del Tala	12.000		15	35	40	48	80
ENTRE RÍOS 24/25	17.400	0	16	40	50	64	86
23/24	9.850	0	10	17	37	54	89
General Pico	132.500						
Santa Rosa	94.000						
LA PAMPA 24/25	226.500	0	0	0	0	0	0
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	181.800	59	59	59	59	59	79
Cañada de Gómez	15.000			9	23	67	67
Casilda	5.000						
Rafaela	78.050		56	61	61	68	72
Venado Tuerto	1.500						
SANTA FE 24/25	281.350	39	55	57	56	61	75
23/24	210.300	60	67	78	78	83	83
CATAMARCA	200						
CORRIENTES	700	50	88	89	95	100	100
CHACO (Charata)	138.000	52	65	74	79	83	83
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	99.500	31	36	36	60	60	60
FORMOSA	2.020				50	60	60
SALTA	600						
SAN LUIS	74.000						
STGO. ESTERO	3.000						
STGO. ESTERO (Quimilí)	24.230	30	30	32	32	32	32
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 24/25	2.058.628	11	14	15	17	18	20
23/24	1.857.963	8	9	12	13	14	17

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	29/08 %	05/09 %	12/09 %	19/09 %	26/09 %	03/10 %
Bahía Blanca	20.500						
Bolívar	246.000						
Bragado	205.000				1	10	15
General Madariaga	156.300						1
Junín	208.000					15	26
La Plata	57.000					1	3
Lincoln	330.000					3	9
Pehuajó	366.500					5	8
Pergamino	200.000					1	18
Pigüé	148.000						
Salliqueló	250.000						
Tandil	345.000						
Tres Arroyos	394.969						
25 de Mayo	172.952						3
BUENOS AIRES 24/25	3.100.221	0	0	0	0	3	6
23/24	3.090.580	0	0	0	1	3	6
Laboulaye	534.520						
Marcos Juárez	434.000			8	20	20	31
Río Cuarto	664.520						1
San Francisco	572.000						
Villa María	442.000						
CÓRDOBA 24/25	2.647.040	0	0	1	3	3	5
23/24	3.188.920	0	0	1	5	10	13
Paraná	134.600		5	16	34	58	69
Rosario del Tala	300.000		20	55	85	85	87
ENTRE RÍOS 24/25	434.600	0	15	43	69	77	81
23/24	568.200	3	6	16	35	53	65
General Pico	468.700						
Santa Rosa	310.400						
LA PAMPA 24/25	779.100	0	0	0	0	0	0
23/24	779.100	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	55.200	4	4	6	6	6	7
Cañada de Gómez	155.000		2	11	23	46	46
Casilda	120.000			28	68	80	80
Rafaela	293.300		14	24	24	25	32
Venado Tuerto	210.000				1	3	5
SANTA FE 24/25	833.500	0	6	15	23	30	33
23/24	1.239.380	1	4	13	21	27	29
CATAMARCA	7.800						
CORRIENTES	10.000	81	81	81	81	81	82
CHACO (Charata)	84.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	106.000						
FORMOSA	46.100						
JUJUY	13.388						
MISSIONES	31.510			5	10	15	25
SALTA	368.091						
SAN LUIS	348.500						
STGO. ESTERO	168.725						
STGO. ESTERO (Quimilí)	502.200						
TUCUMÁN	72.830						
TOTAL PAÍS 24/25	9.553.605	0	1	4	6	8	10
23/24	11.099.728	0	1	3	6	9	12

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/09/2024 al 03/10/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	95	5	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	54	46	-	R/PS/S
	PERGAMINO	-	15	85	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	80	20	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	88	12	-	-	9	66	20	5	R/PS/S
	MARCOS JUÁREZ	-	-	100	-	-	-	46	48	6	R/PS/S
	RÍO CUARTO	-	83	17	-	-	-	47	29	24	A/R/PS
	SAN FRANCISCO	-	9	62	29	-	7	71	22	-	A/R/PS
	VILLA MARÍA	-	70	30	-	-	-	75	25	-	A/R/PS/S
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	16	54	30	-	-	87	13	-	R/PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	50	40	10	-	-	60	40	-	A/R/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	30	70	-	PS/S
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	-	92	8	R/PS/S
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	5	95	-	-	20	35	45	A/R/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	48	52	-	-	46	33	21	-	A/R/PS
	CASILDA	-	100	-	-	-	15	65	20	-	A/R/PS
	RAFAELA	-	57	43	-	-	-	56	35	9	PS/S
	VENADO TUERTO	-	90	10	-	-	-	50	50	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	50	50	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	84	16	-	-	89	11	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	-	74	26	-	9	55	36	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	8	92	-	-	1	31	68	A/R/PS/S
JUJUY	JUJUY	-	-	-	80	20	-	100	-	-	R
SALTA	SALTA	-	-	10	80	10	-	100	-	-	A/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	61	39	-	-	80	20	-	A/R/PS/S
	QUIMILÍ	-	-	10	90	-	-	35	42	23	R/PS/S
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	50	50	-	-	100	-	-	PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

