

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

10 de octubre de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 10 de octubre de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 10/10/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Arroz, Girasol, Maíz)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de arroz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se acumularon más de 80mm en estaciones de la provincia de Mendoza (San Martín 103mm, San Rafael 85mm). A estos máximos les siguen los de la provincia de La Rioja (Chamical 71mm, La Rioja 70mm). Después de varios meses sin lluvias significativas, se registraron en Córdoba algunos valores superiores a 30mm (Villa Dolores 57mm, Hernando 42mm, Villa María del Río Seco 42mm, Córdoba 33mm). En Buenos Aires, La Pampa y Patagonia predominaron ampliamente las áreas sin precipitaciones.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 02/10/2024 al 08/10/2024

Durante el jueves y el viernes se esperan lluvias en el NOA y NEA. Se prevén algunos acumulados en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, este de La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires debido al avance de un sistema frontal entre los días viernes y domingo. Entre viernes, sábado y lunes podrían registrarse precipitaciones en algunas localidades del norte de Santa Cruz, oeste de Chubut, Neuquén y Río Negro, donde en zonas cordilleranas podrían darse algunos acumulados de nieve.



TEMPERATURAS

Los últimos 7 días se caracterizaron por temperaturas levemente superiores a las normales, con excepción del sudeste bonaerense y el este de Patagonia. En el extremo norte del país se registraron máximas superiores a 40°C, con un valor máximo en Las Lomitas (Formosa) de 42.8°C. Se registraron heladas en Patagonia (-5°C en Maquinchao - Río Negro) y en la mitad sur de Buenos Aires (-2.4°C Coronel Suárez - Buenos Aires).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 02/10/2024 al 08/10/2024


En la semana se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal en todo el país. Entre jueves y viernes se prevé un aumento de las temperaturas en todo el país debido al avance de un sistema de baja presión segregada que avanza en el norte. A partir del sábado y hasta el domingo el avance de un sistema frontal en Patagonia y zona central ocasionará a su paso una leve disminución de las temperaturas. A partir del lunes y hasta el martes próximo se esperan temperaturas con un leve aumento. En la zona norte, las temperaturas entre sábado y martes de la próxima semana se mantendrán cálidas y podrían darse condiciones para máximas sobre 35°C en varias localidades del NOA y NEA entre sábado y lunes.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAÍZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se ven mejoradas las condiciones hídricas para lotes destinados a maíz temprano del norte de Córdoba y centro de Santa Fe, que muestran ahora niveles regulares de humedad en el primer metro de suelo. En el sur de Córdoba las precipitaciones fueron menores (Laboulaye 9mm) y se mantiene la clasificación de déficit hídrico. En Entre Ríos, la zona maicera principal presenta almacenajes adecuados a regulares, lo mismo que la mayor parte de la zona núcleo. En el sur de Buenos Aires no se ha llegado aún a la fecha media de primera implantación, por lo que no se incluye en la clasificación.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la región del NOA, dadas las características del cultivo, a pesar de la escasez hídrica, el cultivo mantiene buenas condiciones. Una gran proporción de los lotes ya ha ingresado a la etapa de madurez, y se estima que los próximos días pueda darse inicio a la cosecha.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires, el cultivo implantado se encuentra en inicios de fructificación, con buen estado general.

En Córdoba, si bien retrasado en la evolución, los lotes implantados ya se encuentran en plena floración, manteniendo un buen estado general.

En la provincia de Entre Ríos, el cultivo atraviesa etapas que van desde la formación de silicuas hasta el llenado de granos. La escasez hídrica generalizada en la región, podría afectar los rendimientos potenciales.

CEBADA



Se registraron precipitaciones de escasos milimetraje en general, y con excepción de la región del sudeste provincial, en donde todavía las reservas se mantienen en niveles adecuados, son necesarias nuevas precipitaciones. Los niveles de humedad son ajustados y en la mayoría de los lotes implantados comienza a aumentar la demanda hídrica por parte del cultivo que se encuentra ingresando a etapas de definición del rendimiento. La mayoría de los planteos se encuentra en encañazón, con los lotes más adelantados en la etapa de floración. En términos generales, todavía presentan buena condición, en su aspecto y sanitario, aunque se reportan lotes en la zona de la delegación Pehuajó, que, ante el escaso volumen vegetativo debido a la escasez hídrica, han pasado a ser pastoreados directamente en vez de ser utilizados como silaje.





Se registraron precipitaciones de variada intensidad en prácticamente todo el ámbito provincial, que son muy bien recibidas ya que la prolongada sequía ha impactado fuertemente en el cultivo, que se presenta con escaso desarrollo y con retraso en el proceso evolutivo. En términos generales, se encuentran entre encañazón e inicios de floración en buen estado general, sin presencia de plagas o enfermedades.



Han ocurrido precipitaciones en todo el ámbito provincial, pero con mayores volúmenes en la zona que abarca a la delegación Paraná. En este caso ha sido suficiente para recomponer la disponibilidad hídrica y mejorar la condición de los lotes.

En la zona de Rosario del Tala, las precipitaciones, si bien persistentes, han alcanzado un volumen cercano a los 15 mm. El cultivo presenta buen estado en general con la mayoría de los lotes ya en la etapa de llenado.



Las precipitaciones ocurridas en la zona sur provincial, que se corresponde con el área abarcada por la delegación Santa Rosa, fueron en forma de llovizna, y solamente en el departamento Catrilo, mientras que los demás departamentos no se registraron lluvias. La mayoría de los lotes implantados se ubican en un área con humedad edáfica calificada como escasa/sequía, y por lo tanto el cultivo se encuentra muy atrasado en el desarrollo, y presenta un estado entre regular y malo.



Han ocurrido precipitaciones generalizadas en todo el ámbito provincial. El volumen registrado, fue variable. Si bien se han alcanzado milimetraje de importancia, en algunas zonas resultan insuficientes para recuperar el estado hídrico de los suelos ante la extensa sequía acontecida. Los lotes implantados se encuentran afectados por la escasez hídrica. El cultivo se encuentra en llenado.





Durante la semana informada, no se registraron precipitaciones. Las lluvias de la semana anterior no fueron suficientes y la humedad edáfica continúa descendiendo, lo que califica a la misma en principio de sequía /sequía. El cultivo se encuentra afectado por la falta de humedad, y presenta un estado general regular, atravesando etapas entre espigazón y llenado.

GARBANZO

En el centro-norte de la provincia de Córdoba, el cultivo se encuentra en pleno llenado. La ocurrencia de precipitaciones, mejora las perspectivas de rendimiento.

En la provincia de Jujuy, más del 50% de los lotes implantados ya ha ingresado a la madurez, y en algunos casos se han comenzado a aplicar desecantes para iniciar las labores de cosecha que se estiman comenzar la semana entrante. Los rendimientos esperados son aceptables, en la mayoría de los casos.

En Salta, ya se ha iniciado la cosecha, sobre todo en los lotes realizados en seco. Se estima que las tareas de recolección se intensifiquen los próximos días.

LINO

En la zona de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, la mayoría de los lotes se encuentra en floración. El estado del cultivo está entre bueno y regular. Las plantas poseen un escaso desarrollo y se observa presencia de roya, cuyo control resulta complicado por la presencia de fuertes vientos.

TRIGO



En el centro-noreste-este provincial, a pesar de la ausencia de precipitaciones, los trigos continúan con buen aspecto en encañazón y los más adelantados, en la región norte, emitiendo espiga. Por el momento, disponen de buena humedad y provisión de nutrientes, pero sería beneficiosa la ocurrencia de lluvias por el aumento de la demanda de agua en las próximas etapas de desarrollo y por el incremento de las temperaturas.



En la región del noroeste, la ausencia de lluvias y el aumento de temperaturas agravan el déficit de humedad. El cultivo se encuentra encañado con pocos macollos y hojas basales amarillas y secas. Los más avanzados presentan la hoja bandera con poca altura. Son pocos los lotes en buenas condiciones y se presentan en áreas de mayor retención hídrica y que han recibido las escasas precipitaciones ocurridas desde la implantación del cultivo.

En el sudeste se han reportado nuevas precipitaciones oscilando entre los 1 y 20 mm, las cuales permiten reponer parcialmente el contenido de agua superficial de los suelos. El cultivo se encuentra entre pleno macollaje y avanzando la encañazón los lotes más tempranos, con buen estado general.

En el sudoeste no han ocurrido lluvias, manteniéndose las reservas en estado adecuado a regular. La condición del cultivo es regular a buena. Según fecha de siembra se encuentra entre fin del macollaje y plena encañazón. Algunos cuadros presentan una altura menor a la media tradicional.



Después de varios meses sin lluvias significativas, se registraron algunos valores superiores a 30mm en el norte provincial, mientras que en los departamentos del sur (Sáenz Peña y General Roca) los registros oscilaron entre los 8 y 15mm de promedio. En el área de Río Cuarto los valores variaron entre los 15 y 25mm y en la zona de la delegación Villa María, entre 10 y 80mm. Dichos registros trajeron alivio a la condición del cultivo, el cual, en su mayoría, se encuentra en etapa de floración, con algunos lotes aún en etapa de encañado y espigazón. Si bien los rindes ya fueron afectados, las lluvias pueden mejorar las condiciones generales del cereal temporariamente, y evitar la pérdida de lotes, siendo necesarias nuevas precipitaciones para detener la caída de los rindes.



El cultivo se desarrolla en etapas de llenado de granos a maduración en estado general de regular a malo. Durante el fin de la semana se registraron lluvias tardías, entre 8 y 20mm sin beneficios significativos en estos momentos para el cereal. Con la cosecha próxima a iniciar, se estima que los rendimientos estarán muy por debajo de la media, debido al estrés hídrico marcado durante el ciclo del cultivo.





Durante el día lunes 7 se registraron lluvias con buenos valores en amplias zonas de la delegación Paraná, suficientes, en muchos casos, para recuperar la disponibilidad de agua y en consecuencia mejorar la condición de los lotes. La mayor parte del cultivo atraviesa etapas de llenado de grano. No se reportan complicaciones por presencia de plagas ni enfermedades.

Hacia la zona sur, los registros pluviométricos fueron menores (de 7 a 15 mm), por lo que la situación sigue siendo muy deficitaria en términos de humedad de suelo. La sequía es generalizada, llegando en zonas puntuales a ser severa. Con vientos cálidos y baja humedad relativa, los cultivos presentan síntomas de estrés hídrico como hojas basales amarillentas y espigas pequeñas o medianas. Un 40% se encuentra llenando grano, es decir en período crítico, por lo que el rinde se vería disminuido respecto a la campaña anterior, por falta de agua.



En la región norte las lluvias registradas fueron de bajos valores por lo que el cultivo se encuentra en estado regular en su mayor parte. Fenológicamente, la mayor parte de la superficie transcurre la etapa final de encañazón, en la cual se definen importantes componentes del rendimiento, por lo que ya se estima una reducción en los rendimientos. Se observan manchones amarillos en lotes producto del estrés hídrico.

En el sur provincial prácticamente no hubo registros de lluvias, por lo que la reserva hídrica del suelo continúa en condición de escasa/sequía. Tanto los trigos de ciclo largo e intermedio como los de ciclo corto se encuentran en etapa de crecimiento, muy atrasados en su desarrollo, en estado regular a malo.



El día lunes 7 se registraron lluvias con milimetrajes que fueron desde los 5 hasta los 25 mm, las que permitieron recuperar la humedad de los suelos y mejorar el estado del cultivo.





SANTA FE

Durante la presente semana ocurrieron precipitaciones en el área de la delegación Avellaneda que variaron entre los 2 y 35 mm. El cultivo está en pleno llenado de granos, algo arrebatados por las elevadas temperaturas de la semana pasada. El estado es bueno a malo, debido a las condiciones de escasez de humedad. Bueno a regular en el este, regular a malo en el oeste. La cosecha comenzaría en la tercera o cuarta semana de octubre. Se estiman rindes de 12 a 16 qq/ha en la zona este, en tanto que en el oeste los trigos están seriamente comprometidos, estimándose pérdida de lotes enteros o por manchones para la cosecha y valores de rindes que oscilan entre los 3 a 30 qq/ha, con un promedio de 13 qq/ha.

En la delegación Rafaela también se registraron precipitaciones con acumulados de 10 a 60 mm después de varias semanas sin lluvias, beneficiando al cultivo, el cual se encuentra entre emergencia de espiga a formación y llenado de granos. Existe una gran variabilidad en el estado que presentan los trigos, siendo bueno un porcentaje cercano a la mitad y el resto se divide entre regular y malo. Las plantas presentan menor porte, pérdida de hojas basales y los cuadros más adelantados menor cantidad de granos por espiga. Como consecuencia de las condiciones en que se desarrolla la campaña, se realizan tareas de picado y confección de heno para consumo animal, principalmente en la cuenca lechera. La superficie destinada a forraje sería similar o levemente inferior a la campaña pasada, aunque podría incrementarse de no efectivizarse nuevas precipitaciones.

En el ámbito de la delegación Cañada de Gómez, la casi totalidad de los lotes se encuentra en floración. Ya se estima una disminución del rinde por la falta adecuada de precipitaciones.

En la zona sur, las lloviznas y lluvias débiles recibidas el día lunes 7 no alcanzan para cumplir adecuadamente con la demanda hídrica del cultivo, el cual se encuentra en espigazón, en estado regular, estimándose menores rindes.

SANTIAGO
DEL ESTERO

En la semana se registraron algunas lluvias que disminuyeron un poco el estrés hídrico reinante, favoreciendo a los trigos que están en llenado. De todas maneras, aún se necesitan mayores registros para revertir la situación del cultivo, el cual se encuentra, en su mayoría, en estado regular a malo.





La semana se presentó con temperaturas elevadas y con ausencia de precipitaciones, aunque al finalizar la misma se produjeron lloviznas de variada intensidad con picos de 18 mm, siendo un alivio para los planteos más tardíos. El cultivo continúa avanzando en su etapa de maduración, comenzando la cosecha de los ciclos cortos. Los rendimientos que se van obteniendo no condicen con las expectativas al momento de la siembra, cuando los perfiles presentaban una adecuada disponibilidad hídrica para las primeras etapas de implantación, obteniéndose valores promedio de 10 qq/ha.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ARROZ

En la provincia de Corrientes, se han registrado algunas precipitaciones, que si bien fueron dispares en la distribución, han complicado el inicio de la siembra por falta de piso, sobre todo en la zona este donde se registran retrasos en el inicio de labores.

En la provincia de Entre Ríos, las precipitaciones ocurridas, fueron de diferente intensidad, y más abundantes en el norte provincial, que corresponde a la delegación Paraná, permitiendo el inicio de la siembra con la variedad largo fino.

Hacia el sur en la zona de la delegación Rosario del Tala, se avanza lentamente con la siembra, comenzando también la implantación de la variedad largo ancho.

En la zona centro norte de la provincia de Santa Fe, se han registrado lluvias durante el inicio de la semana, alcanzando hasta 60 mm en algunas zonas. Esta situación resulta favorable, y proporciona alivio ante la situación de escasez hídrica generalizada, permitiendo un importante avance en la superficie sembrada, sobre todo con la variedad largo fino, ya que la variedad largo ancho, todavía no se ha comenzado a sembrar.



GIRASOL



Avanza lentamente la siembra en la provincia, incorporándose una escasa superficie en las zonas de las delegaciones Bragado, La Plata y Veinticinco de Mayo.



En la zona de Marcos Juárez, la siembra está detenida por la escasez hídrica. La superficie ya sembrada está emergiendo con dificultades. Se estima que luego de las lluvias ocurridas la siembra pueda retomarse en algunas zonas.



Las precipitaciones ocurridas hacia finales de la semana pasada, que, si bien no fueron importantes, contribuyen a mejorar la condición del cultivo. En general el estado es bueno, pero manifiesta la sequía. En lo que respecta al estado fenológico, todavía se encuentra en etapas vegetativas, diferenciando hojas, y se espera la ocurrencia de nuevas precipitaciones para atravesar la etapa reproductiva sin inconvenientes.



Las precipitaciones ocurridas han permitido avanzar con la siembra, y así completar la superficie estimada en la zona de Rosario del Tala. La mayoría de los lotes implantados se encuentra en etapas iniciales.





Han ocurrido precipitaciones en prácticamente todo el ámbito provincial.

En la zona norte, que abarca la delegación Avellaneda, se estima que, dada la escasez hídrica, no se cumpliría la estimación inicial de siembra. En el departamento Nueve de Julio, podría continuar sembrándose hasta mediados de octubre mientras continúen registrándose lluvias.

En Rafaela, las precipitaciones ocurridas traen alivio a los cultivos que en su totalidad se encontraban en estrés. Se observaron emergencias lentas y desperejas en los últimos lotes sembrados, sumados al ataque de palomas, que provocó manchones de pérdidas de plantas. No se reportan otros inconvenientes por plagas ni enfermedades. Se espera que en los próximos días se reanuden las siembras y se pueda completar la intención de siembra inicial debido a que los productores a diferencia de la campaña anterior mantuvieron la decisión de implantar el girasol sin la devolución de semillas.

En Cañada de Gómez, lentamente se reanuda la siembra. Los lotes emergidos se encuentran en buen estado, sin presencia de plagas o enfermedades.



En la delegación Quimilí, la siembra se encuentra paralizada. Se estima que, de ocurrir precipitaciones relevantes en los próximos días, la superficie implantada podría incrementarse, sumándose áreas de los departamentos al sur de la delegación, ya que, en esa zona, todavía es factible la siembra en fechas tardías.

MAÍZ



Prosiguió la siembra de los maíces tempranos en la región centro-norte de la provincia. Se espera la ocurrencia de lluvias para asegurar su implantación y proseguir con las labores, principalmente en el noroeste provincial, en donde aún no se ven maíces emergidos por la escasa humedad con la que se sembraron.





En la zona de la delegación Marcos Juárez el día lunes 7 ocurrieron precipitaciones de 8 a 12mm con picos, en algunas zonas, de 20mm. A la fecha se estima un 34% de la superficie de intención implantada. La emergencia es bastante buena para las condiciones que se presentan, si bien hay lotes con malos nacimientos, además de observarse plantas de diferentes tamaños por la emergencia despereja. El cultivo, en general, presenta 2 hojas. Las lluvias fueron muy irregulares por lo que, en algunas zonas retomaran la siembra mientras que en otras no fueron suficientes por lo que habrá que esperar nuevas precipitaciones.

También en la zona de la delegación Río Cuarto se registraron lluvias de 10 a 30 mm permitiendo proseguir con la siembra.



En la delegación Paraná, las lluvias de este lunes 7 permitieron recuperar la disponibilidad de agua en el perfil favoreciendo al cultivo en sus primeras etapas vegetativas como así también permitirá sembrar algunos lotes que se mantenían en suspenso.

En la zona de la delegación Rosario del Tala, los registros pluviométricos fueron menores (de 7 a 15 mm) para proseguir con la siembra, aunque la situación sigue siendo muy deficitaria en términos de humedad de suelo. La sequía es generalizada, llegando en zonas puntuales a ser severa.



En la zona de la delegación Avellaneda los lotes de maíz temprano que están en estado vegetativo mejoraron su estado luego de las lluvias del día lunes. En el departamento Nueve de Julio no se sembró maíz temprano.




En el área de la delegación Rafaela los cuadros presentaban estrés hídrico severo, con pérdida de plantas en los más afectados. Con las lluvias ocurridas se estima una buena reacción de los cultivos y un crecimiento adecuado. Existe incertidumbre en cuanto a continuar con la siembra o esperar a diciembre e implantar otra especie, debido a que el maíz temprano está fuera de la ventana óptima de siembra. Se estima una reducción de la superficie destinada al cultivo de 20 a 30% dependiendo de la zona, que podría incrementarse por la sequía.

En la región sur el cultivo evoluciona en sus primeras fases vegetativas con diferentes niveles de crecimiento, según se haya implantado en suelos con cobertura o laboreados. Se esperan lluvias para continuar con la siembra.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LASIEMBRA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	05/09	12/09	19/09	26/09	03/10	10/10
			%	%	%	%	%	%
CORRIENTES	LA	14.800						5
	LF	95.050						31
T. CORRIENTES		109.850						27
R. S. Peña		6.000						
T. CHACO		6.000						
PARANA	LA	2.200						
	LF	24.520						9
T. PARANÁ		26.720						8
R. DEL TALA	LA	4.800						10
	LF	32.300				2	5	23
T. R.DEL TALA		37.100				2	4	21
T. ENTRE RÍOS		63.820				1	3	16
FORMOSA		12.500						
T. FORMOSA		12.500						
AVELLANEDA	LA	1.500						
	LF	12.100			5	15	16	40
T. AVELLANEDA		13.600			4	13	14	36
RAFAELA	LA	400						
	LF	15.500					20	30
T. RAFAELA		15.900					20	29
T. SANTA FE		29.500			2	6	17	32
TOTAL PAÍS	LA	23.700						5
	LF	197.970				1	3	25
TOTAL PAÍS	24/25	221.670				1	3	22
	23/24	202.450			1	18	41	68

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	05/09 %	12/09 %	19/09 %	26/09 %	03/10 %	10/10 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	84.800						
Bragado	8.200						10
General Madariaga	77.500						
Junín	4.000						
La Plata	12.500						1
Lincoln	38.900						
Pehuajó	94.800						
Pergamino	2.000						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	155.000						
Tandil	190.000						
Tres Arroyos	245.995						
25 de Mayo	52.411					5	8
BUENOS AIRES 24/25	1.061.706	0	0	0	0	0	0,5
23/24	1.050.314	0	0	0	0	1	3
Laboulaye	53.872						
Marcos Juárez	20.000		12	23	24	41	42
Río Cuarto	12.500						
San Francisco	35.000						
Villa María	7.800						
CÓRDOBA 24/25	129.172	0	2	4	4	6	7
23/24	130.430	0	0	0	0	4	7
Paraná	5.400	19	54	73	100	100	100
Rosario del Tala	12.000	15	35	40	48	80	100
ENTRE RÍOS 24/25	17.400	16	41	50	64	86	100
23/24	9.850	10	17	37	54	89	100
General Pico	132.500						
Santa Rosa	94.000						
LA PAMPA 24/25	226.500	0	0	0	0	0	0
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	181.800	59	59	59	59	79	90
Cañada de Gómez	15.000		9	23	67	67	67
Casilda	5.000						
Rafaela	78.050	56	61	61	68	72	76
Venado Tuerto	1.500						
SANTA FE 24/25	281.350	54	56	56	61	75	83
23/24	210.300	67	78	78	83	83	94
CATAMARCA	200						
CORRIENTES	700	88	89	95	100	100	100
CHACO (Charata)	138.000	65	74	79	83	83	83
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	99.500	36	36	60	60	60	60
FORMOSA	2.020			50	60	60	60
SALTA	600						
SAN LUIS	74.000						
STGO. ESTERO	3.000						
STGO. ESTERO (Quimilí)	24.230	30	32	32	32	32	32
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 24/25	2.058.628	14	15	17	18	20	22
23/24	1.857.963	9	12	13	14	17	20

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	05/09 %	12/09 %	19/09 %	26/09 %	03/10 %	10/10 %
Bahía Blanca	20.500						
Bolívar	246.000						
Bragado	205.000			1	10	15	25
General Madariaga	156.300					1	3
Junín	208.000				15	26	31
La Plata	57.000				1	3	6
Lincoln	330.000				3	9	15
Pehuajó	366.500				5	8	19
Pergamino	200.000				1	18	68
Pigüé	148.000						
Salliqueló	250.000						
Tandil	345.000						
Tres Arroyos	394.969						
25 de Mayo	172.952					3	6
BUENOS AIRES 24/25	3.100.221	0	0	0	3	6	13
23/24	3.090.580	0	0	1	3	6	13
Laboulaye	534.520						
Marcos Juárez	434.000		8	20	20	31	34
Río Cuarto	664.520					1	9
San Francisco	572.000						
Villa María	442.000						
CÓRDOBA 24/25	2.647.040	0	1	3	3	5	8
23/24	3.188.920	0	1	5	10	13	14
Paraná	134.600	5	16	34	58	69	74
Rosario del Tala	300.000	20	55	85	85	87	88
ENTRE RÍOS 24/25	434.600	15	43	69	77	81	84
23/24	568.200	6	16	35	53	65	74
General Pico	468.700						
Santa Rosa	310.400						
LA PAMPA 24/25	779.100	0	0	0	0	0	0
23/24	779.100	0	0	0	0	0	2
Avellaneda	55.200	4	6	6	6	7	7
Cañada de Gómez	155.000	2	11	23	46	46	47
Casilda	120.000		28	68	80	80	80
Rafaela	293.300	14	24	24	25	32	33
Venado Tuerto	210.000			1	3	5	5
SANTA FE 24/25	833.500	6	15	23	30	33	34
23/24	1.239.380	4	13	21	27	29	29
CATAMARCA	7.800						
CORRIENTES	10.000	81	81	81	81	82	82
CHACO (Charata)	84.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	106.000						
FORMOSA	46.100						
JUJUY	13.388						
MISIONES	31.510		5	10	15	25	30
SALTA	368.091						
SAN LUIS	348.500						
STGO. ESTERO	168.725						
STGO. ESTERO (Quimilí)	502.200						
TUCUMÁN	72.830						
TOTAL PAÍS 24/25	9.553.605	1	4	6	8	10	13
23/24	11.099.728	1	3	6	9	12	15

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/10/2024 AL 10/10/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	82	18	-	A/R
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	95	5	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	37	45	18	R/PS/S
	PERGAMINO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	70	30	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	80	20	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	88	12	-	-	5	63	27	5	R/PS/S
	MARCOS JUÁREZ	-	-	100	-	-	-	49	45	6	R/PS
	RÍO CUARTO	-	58	42	-	-	-	47	29	24	A/R
	SAN FRANCISCO	-	-	57	43	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	46	54	-	-	-	75	25	-	A/R/PS
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	2	49	49	-	-	87	13	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	10	50	40	-	-	60	40	-	A/R/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	30	70	-	PS/S
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	-	83	17	R/PS/S
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	3	97	-	-	20	35	45	A/R/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	17	83	-	-	20	59	21	-	A/R/PS
	CASILDA	-	10	90	-	-	10	62	22	6	R/PS
	RAFAELA	-	20	65	15	-	-	50	38	12	A/R/PS/S
	VENADO TUERTO	-	50	50	-	-	-	50	50	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	20	80	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	84	16	-	89	11	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	-	58	42	-	6	55	39	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	100	-	-	1	31	68	A/R/PS/S
JUJUY	JUJUY	-	-	-	20	80	-	100	-	-	R
SALTA	SALTA	-	-	5	58	37	-	86	14	-	A/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	51	49	-	A/R/PS
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	53	47	-	-	80	20	-	A/R/PS/S
	QUIMILÍ	-	-	-	26	74	-	35	42	23	R/PS/S
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	20	80	-	-	100	-	-	PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

